

à M: Age:

Domicile: Angine Erythémato-pultacée

ORDONNANCE

①- Amoxicilline cp 1g _____ QSP 10jrs
01 cp 03x/jr

②- Doloprane cp 1g _____ 01 bte

③- Solupred cp 20mg _____ 01 bte
01mg/kg le matin (une seule cure)

④- Hexaspray pulv _____ 01 fle
01 pulv 03x/jr

NB:

S'il existe des signes de Dysphagie grave,
on donne Augmentin sachet 1g _____ QSP 10
1 sachet 03x/jr.

à M:

Domicile:

Parotidite Aigue

ORDONNANCE

①- Augmentin Sachet 0.1g — QSP 10jrs

0.1 sachet 03 x 1jr
ou Ciprolon

②- Spasfon - Lyac cp — 0.1 bte

1 0.1 cp 03 x 1jr



(↓ des spasmes, favorise L (lithique))

Echog

a M:

Age:

Domicile:

Cellulite Dentaire

ORDONNANCE

① - Augmentin sirop 100mg — QSP 10jrs
07 doses poils x 03/jr

② - flaugyl sirop 04% — QSP 10jrs
01 dose 03 x /jr

. Doliprane sirop 2,4% — 01 flc
01 dose cho, 06 H

Omnicef sirop 200mg

Délivrée par le Docteur : _____

à M: _____ Age: _____

Domicile: Traumatisme des Os de la face

ORDONNANCE

①- Voltrex cp 50mg _____ QSP 05 jr
01 cp 02 x 1jr

②- Lomac gel 20mg _____ 01 blé
01 gel le soir

③- Codoliprane cp _____ 01 blé
01 cp x 03/jr

NB : Manger de la soupe pdt une semaine

a M:

Domicile:

Vertiges

ORDONNANCE

↳ Traitement de la crise:

① - Tanganil cp 500mg — QSP 05 j
01 cp 3x/jr

↳ A la Sortie (TRT de fond):

② - Betaserc cp (16mg - 24mg) — QSP 05 j
01 cp 2x/jr Au milieu des Repas.

* Si problème Gastrique:

③ - Lomac gel 20mg — 01 ble
1 gel le soir

à M:

Domicile: Ganglions Inflammatoires

ORDONNANCE

① - Augmentin sachet 01g ——— GSP 10
01 sachet 03 x 1jr

② - Doliprane cp 01g ——— 01 bte
01 cp 03 x 1jr

*
- Âge > 10 ans
- Contexte fébrile
- Douleuruse } Inflammatoire

* On demande un bilan:

- VS / CRP / FHS
- IDR à la tuberculine
- VIH / HBV / HCV / Syphilis

* Lettre pour Echographie

* Si persistance ou Augmentation de volume
→ Cytoponction + Biopsie

à M: Age:

Domicile: Epistaxis

ORDONNANCE

CAT

- ① - Mouchage + Compression bidigitale (10min)
- ② - Mèche Ant, Coton xylocaïne / dicynone
- ③ - Tulle gras + xylo / dicynone → Report à domicile + **RDR** pour démêchage dans 48H
- ④ - Une Couverture ATB est

⑤ - De petite abondance =

- ① - Hebermi pmd — 0.1 tube
0.1 app 2x/jr
- ② - HEC pmd — 0.1 tube
0.1 app 2x/jr
- ③ - Mebo pmd — 0.1 tube
0.1 app 0.2x/jr

} Pour cicatrisation
Rapide et éviter
la formation des
croûtes et éviter
la Récidive de
l'hémorragie

⑥ - De Grande abondance =

- ① - Dicynone ^{500mg} cp 250mg — 0.1 ble {1500mg/jr}
0.2cp x 3/jr
- ② - Dicynone inf 250mg — 0.1 ble
1.5l IM le matin

à M:

Age: 11

Domicile:

Rhinite Allergique

ORDONNANCE

① - **Rhinocort pulv** [Ⓢ] QSP 2 mois
 02 pulv le matin dans chq narine pdt 1 mois
 puis 01 pulv / j (Entretien)

② - **Telfast cp 180mg** QSP 2 mois
 1cp le soir

③ ou - **Nasonex** > 3ans
Nasacort > 6ans
Beconase > 2ans } CTE locaux

④ ou - **Telfast cp 180/120mg**
Ebesta cp 10mg
Terlor cp 10mg
Arditine cp 0.5mg
Dexor cp 0.5mg } Anti histami-
 niques

Motifs de Consultation

- / Anosmie
- Rhinorrhée / Eternuement
- Obst Nasale / Larmoiement
- Picotement / Toux

Examen

Rhinoscopie:

- Cornet violacé / HPT
- Muqueuse Nasale congestive

à M:
Domicile: Deviation de la Cloison Nasale

ORDONNANCE

TRT chirurgicale: Septoplastie > 18 ans

. Nasocort pulv _____ QSP 03 mois

02 pulv le matin

Motif de Consultation:

. obstruction Nasale

Sinuosite $\rightarrow$ Dentaire

ORDONNANCE

- ① - Nasacort pulv _____ 01 ble.
02 pulv le matin dans chq narine
- ② - Telfast cp 180mg _____ 01 ble
1cp le soir
- ③ - Solupred cp 20mg _____ QSP
03 à 04 cp le matin
- ④ - Augmentin Sachet 1g _____ QSP 10j
01 sachet 03x/jr.

B - Sipersistance de la fièvre $\Rightarrow$ Revir dans

motif de Consultation:

• fièvre - OB Nasale - Rhinorrhée - Jetage Post
Dir au niveau des sinus.

2 des Sinus de face = Comblement des sinus

Si Sinusite frontale ou Résistante au TRT =
 $\rightarrow$ TDM des Sinus.

Domicile: Rhinite Allergique

ORDONNANCE

1- Nasonex pulv _____ QSP 02 mois
- > 12 ans : 02 pulv / j } le matin dans cho
- 3 - 11 ans : 01 pulv / j } Narine

2- Zyrtec goutte _____ QSP 02 mois
- 6 - 12 ans : 10 gouttes 02 x / jr
- 2 - 6 ans : 05 gouttes 02 x / jr

ou : Airodiline Sirop = Deslor = Clari
1 cain le soir

Sérum Salé 09/00 500cc _____ 1 flc
01 Lavage 03 x / jr

Seringue (1cc) _____ n° 1

Domicile:

Angine Erythémateuse

Age:

ORDONNANCE

①- Hexaspray pulv _____ 0.1 flc
0.2 pulv 0.3 x 1 jr
(Antiseptique)

②- Dolcprane cp 1g _____ 0.1 bte
0.1 cp 0.3 x 1 jr

- Clinique:
- Écoulement Nasal
 - Congestion
 - Anosmie

• Nasoscopie = polypes

* Si Surinfection: (C3G)

Végétations Adénoïdes

ORDONNANCE

①- Nasonex pulv ——— QSP 03 mois

02 pulv /j le matin

②- Telfast cp 180mg ——— QSP 03 mois

01 cp le soir

③- Zyrtec goutte ——— QSP 03 mois

2-6ans

05 gouttes 02x/jr

6-12ans

10 gouttes 02x/jr

On les met dans une cuillère d'eau
puis Avaler

④- Deslor sirop ——— QSP 03 mois

< 6ans : 02 ml le soir

> 6ans : 05 ml le soir

⑤- Clarythine sirop ——— QSP 02 mois

1cârn à mesure le soir

⑥- Auroclithine sirop ——— QSP 02 mois

1cârn à mesure le soir

لا تتركوا ابدًا
PORTÉE DES ENFANTS

a M:

Domicile:

Polypose Nasale

ORDONNANCE

- ① - Rhinocort pulv _____ QSP 03 mois
01 pulv 02 pulv x 02/jr } dans cho
ou 02 pulv /jr le matin } narine.
- ② - Telfast cp 180mg _____ QSP 03 mois
1cp le soir
- ③ - Zyrtec goutte _____ QSP 03 mois
10 gouttes le soir
- ou
- Ebasta cp 10mg (100ml)

NB -

Asthme

+
polypose nasale

+
Allergie à l'Aspirine

} Sd de VIDAL

Schupred per Os 1mg/Kg

Si polypes sont visibles à la Rhinos
→ CFC voir avec Ant


Domicile:

Furuncul

ORDONNANCE

①- Fucidine pmd _____ 0.1 tube
0.1 app 0.2 x 1 jr

Anti-staph



pmd
cp 200mg
sirop

②- Doliprane cp 1g _____ 0.1 ble
0.1 cp 0.3 x 1 jr

Domicile: Furoncle surinfecté

ORDONNANCE

- ① - Ciprolon cp ^{750mg} 500mg ——— QSP 10jrs
01 cp 02x/jr si cp 750mg
01 cp 03/jr si cp 500mg
- ② - fusidine cp 250mg ——— QSP 10jrs
02 cp 03x/jr

plus :

- Echographie

- RDV de contrôle 48h
- Changement de pansement

à M:

Domicile:

Bouchon de Cerumen

ORDONNANCE

Adulte

① - Oritylse Cerulyse Gouttes — QSP 05 jrs
03 gttes x 03/jr dans l'oreille atteinte

Enfant

① - Eau Oxygénée — QSP 05 jrs
03 gttes x 02/jr

② - A - Cerumen Gouttes — QSP 05 jrs
04 gttes x 04/jr

MB

< 8ans

— pas de lavage

Avec RDV pr lavage après 05 jrs

Ou , Oritylse gtt

a M:

Age:

Domicile:

Eczéma Au Niveau du CAE

ORDONNANCE

①- Leta cort pmd _____ 01 tube

01 app 02 x / jr

②- Diprosone solution _____ 01 flc

02 gouttes 02 x / jr

à M:

Domicile: Corps Etranger dans les FN

ORDONNANCE

Gestes:

↳ Lavage

↳ Extraction Instrumentale

①. Serum Salé 9% ——— 01 flc 500cc
01 Lavage 03x/jr

②. Seringue (10cc) ——— N° 01

↳ Couverture ATB en cas de lésion:

①. Amoxicilline sirop 250 ——— QSP 10jrs
1câp 03x/jr

ourof
②. Niframycine goutte ——— QSP 10jrs
01 goutte 02x/jr dans chq narine

8 bébé — 2ans — 1gt — 3x4x/jr
10 — 3ans — 1gt — 3x4x/jr

à M: Age:

Domicile: Bouchon Mycosique

ORDONNANCE

① Pevaryl Lait Gouttes — QSP 21j
02 gouttes 02x/jr

② Telfast cp 180mg — QSP 08j
01cp le soir

ou

- Auricularum gouttes — QSP 15jrs
10jrs
05 gouttes 02x/jr
02g 03x/jr

CZ si perforation

NB:

On peut faire un Lavage ou Aspiration
pour enlever le Bouchon

à M: Age:
Domicile: Otite Moyenne Aigüe

ORDONNANCE

① Augmentin sirop (50mg/Kg/j) — QSP 10
1 càm x 03/jr

② Doliprane Suppo (15mg/Kg/dose)
1 suppo en cas de Dr ou fièvre / 100-150
200-300

③ Sérum Salé 0.9% 500cc — 1 flc
01 lavage 03 x/jr (Narine)

④ Otocine doett — QSP 10jrs
Si otite 1/2 doette x 02/jr
Si otite pas bnt

RDV de Contrôle 48H

* Si Allergie = Erythro-sulfa conazole

* Augmentin sirop — QSP 10jrs
01 dose / poids x 03/jr

Age:
à M:
Domicile: Otalgie Isolée + Otoscopie Normale

ORDONNANCE

① Otipax Goutte ————— 01 flc
QSP 7

03 gouttes 02x/jr dans
l'oreille Atteinte

ou

② Panotile Goutte ————— 01 bte

03 gouttes 02x/jr

CE si
perforation

a M:

Domicile: Bouchon Surinfecté

ORDONNANCE

Enfant:

① - Clamoxyl sirop $\frac{125}{250}{500}$ — QSP 10jrs

1 cãm x 03/jr

• 0 - 5 kg	→	125 mg	x 02/jr	} dose de 50 mg/kg
• 5 - 10 kg	→	250 mg	x 02/jr	
• 10 - 15 kg	→	250 mg	x 03/jr	
• 15 - 20 kg	→	500 mg	x 02/jr	
• 20 - 30 kg	→	500 mg	x 03/jr	

Sirop 500 mg — 1 cãm / 10 kg

Sirop 250 mg — 1 cãm / 5 kg

à M:

Age:

Domicile: Traumatisme des OPR

⇒ R^z des OPR

ORDONNANCE

* Adulte:

① - Ancefal (Kéforal) 500mg — QSP 10j
02 cp 2 x/j

② - Voltrex cp 50mg — QSP 05 jrs
1cp x 02/j Au milieu des repas

ou

- Voltaren cp 50mg — QSP 05 jrs
1cp x 02/j

③ - Lomac gel 20mg — QSP 1 bte
1gl le soir

* Enfant:

- Nifluril supp 200mg — QSP 05 jrs
400mg
700mg
01 supp le soir

a M:

Domicile:

Paralyse faciale Périphérique

Age:

ORDONNANCE

[15-20]

- ① Solupred cp 20mg _____ QSP 10jrs
④ - 03 à 04 cp le matin (1mg/kg/jr)
⑤ - Celestène glte _____ QSP 05jrs
10 gltes x poids le matin
[ou cp de 05mg 4x Solupred
dilués dans l'eau]
- ② - Lomax gel 200mg _____ 01 bte
01 gl le soir
- ③ - Neurovit cp _____ 01 bte
02 cp 02x/jr
- ④ - Siccocfluid glte _____ 01 fle
04 gltes 03x/jr [Larmes Artif]
- ⑤ - Vastarel cp 35mg _____ 01 bte
01 cp 02x/jr
- ⑥ - Pansement Oculaire _____ N°1
[La nuit] pr l'œil du côté paralysé

Domicile: En cas de Suture

ORDONNANCE

125 - 250 - 500

1/jr

① - Amoxicilline sirop 50mg — QSP 10jrs

1câin 2 ou 3 x 1/jr

Selon le poids

- Doliprane Supp (15 mg / kg / dose)

01 Supp en cas de Dlr ou fièvre
Chq 6 H.

à M:
Domicile: Péri Conalrile

ORDONNANCE

①- Omnicef gell 300mg ——— ASP 07
01 gell 02x1jr

ou Ciprolox cp 500mg ——— ASP 10j
01 cp 03x1j

ou

RDV de Contrôle dans 48H

Risque de Nécrose

à M: Age:
Domicile: Corps Etranger Intra-turiculaire

ORDONNANCE

CAT

- ①- Lavage Auriculaire à l'eau tiède
(objet solide)
- ②- On met quelques Gouttes d'Eau oxygénée
pour tuer l'insecte puis le lavage.
- ③- On peut utiliser la micropinette pour
l'extraction d'un objet ou une insecte
proche du Pavillon.

MB = Si lésion de CAE:

- ①. Polydexa goutte ——— 0.5l 07jrs
03 gouttes 02x/jr
- ②. Doliprane cp 1g ——— 0.1 bls
0.1cp 03x/jr

Domicile: Kyste Sēbacē Surinfectē

ORDONNANCE

① - Kēforal cp 500mg ——— QSP 10jrs
02 cp 02x/jr

ou = - fucidine cp 250mg ——— QSP 10jrs
02cp 03x/jr

CAT = . Extraction de tout le pus
• Désinfection
• pansement 15/2

α pyostaline

A M:

Domicile: En cas de Suture

Z/ Visa ge: **ORDONNANCE**

① - Ciprolox cp 500mg — QSP 10jrs
ou 01 cp 03x/jr

• Kéforal cp 500mg — QSP 10jrs
lexan 02 cp 02x/jr
lexinal

ou fucloline cp 250mg — QSP 10jrs
02 cp 03x/jr

② - Doliprane cp 1g — QSP 016E
01 cp 03x/jr

⑦ Endo buccale:

- Amoxicilline cp 01g — QSP 10jrs
01 cp 03x/jr

- Doliprane cp 01g — Q 016E
01 cp 03/jr

à M:

Domicile:

Otite Externe

ORDONNANCE

- ① - Otofa gouttes _____ QSP 10jrs
ou 05 gtt x 03 / jr
- ② - Polydexa gouttes _____ QSP 10jrs
05 gtt x 02 / jr (A) (E) 3e M
- ③ - Boliprane cp 1g _____ 1 Lte
1 cp x 03 / jr

→ Si notion de perforation:

• Otocine dosette _____ QSP 10jrs

(A) 01 dosette x 2 / j

(E) $\frac{1}{2}$ dosette x 02 / jr

→ Si CAE Stenose:

• pop oto - wick _____ N° 1

RDV pr

après 48 H

à M:

Domicile:

Plaie Du Pavillon Après Suture

ORDONNANCE

- ① - Ciprolon cp 500mg ——— QSP 10jrs
01cp 03 x 1jr
ou Kéforal cp 500mg (02cp 02x1jr)
- ② - Doliprane cp 1g ——— 01ble
01cp 03 x 1jr
- ③ - Otocine dosette ——— QSP 10jrs
01 dosette 02 x 1jr
- ④ - Mcbo pmd ——— 01 tube
01 App à chq changement de pansement
- { . Changement de pansement 1j/2 avec pmd
• Ablation de fil au 10^{ème} jr.

{ - VAT / SAT
- si morsure VAR

d IV:

Domicile: Orite Externe Surinfectée

ORDONNANCE

Si Orite Externe Rebelle au TRT ou chez les diabétiques (Récidive → Glycémie à jeun)

① - Polydexa goutte — QSP 10jrs
03 gtt x 2/jr

② - Kéforal 500mg — QSP 10jrs
2cp x 02/jr

⑤ - Kéforal sirup 250mg / 125mg
50mg/kg/jr

③ - Codo leprane cp — 1ble
1cp x 03/jr

ou
• Ancefal cp 500 — QSP 10jrs
02cp x 2/jr

• Ciprolon cp 500 — QSP 10jrs
01cp x 3/jr

⑥ - Ciprolon sirup 125 / 25mg
(CE < 12 ans)

White Externe chez enfant;

TRT sympto.

(Doliprane)

Plus =

- Lettre de Rééducation des ~~TF~~
de Laface
- EMG après 21^{ème} jour
- Impédancemétrie / Audiométrie

MDT	Précautions d'emploi	CI	Femme Enceinte Allaitant	Type pays	Prix
- Rhinocort Suspension pr pulv fl (120 doses) > 6 ans Source : en fte d'expos à l'Allergie --- • MDT d'action lente n'est pas adapté au TRT de Rhinite Aiguë • Seules prises régulières et prolongées obtenir l'amélioration	Cte avec activité anti-inf marquée sur les muqueuses • Stimulation puis fragilisation de la muqueuse N N'est pas Reconnu • Ulcération Nasale • Récemment opéré du nez ou sinus • Vérifier l'état des muqueuses (Irritation ou Sécheresse Anormale) • Dose ↑ + longue période ⇒ effets généraux (enfant → suivi de la croissance)	• Troubles de coagulation • Saignement du nez • Herpes buccal ou ophtalmique Effets II° : • Fréquent : Irritation + Assèchement + Saignement du nez • peu fréquent : Crampes musculaires • Rares : perforation de la cloison Nasale, modifications de la voix Allergie - ↑ tension intraoculaire • fréquence Indéterminée : Glaucome - Cataracte - Candidose du nez pharynx ↳ Interruption	pas de Risque de Malfo (A)	Princip France Après Mouchage soignés	329 (R)
Telfast cp 120 - 180 mg ↑ Rhinite allergique Allergie > 12 ans (En l'absence d'asthme) 1cp/jr	• Anti Histami Anti Allergique d'action prolongée ≠ aux autres antihist, pas d'effets sédatifs ou Atropiniques. à la posologie Recommandée	• Précautions effet mal connu • IR, I Hep, prudence • Malcardiaq déconseillé		Princip Angleterre (R)	30 (R)

Les TRT antihistaminiques
peuvent fausser les résultats
des tests cutanés d'Allergie
Recommander d'arrêter
la prise du MDT qlg jrs
(2H) entre la prise telfast et
parcours digestifs
(sels d'alum. + Mg²⁺)