

peni	Peni V (ospen - orapen) 0.05MUI/kg/j (50 000 UI/kg/	sirop	0.25 MUI	01cam x3/j	10 jours
	Amoxicilline (clamoxyl- amoxypen) 50mg/kg/j	sirop	125mg < 8kg 250 mg (8 – 16 kg) 500 mg (16 – 38 kg)	01 cam x3/j	8 jours
		cp	500 g > 38 kg	1cp x 3/j	
cillines	Amoxicilline +Ac Clavulaniq (Augmentin) (50-80) mg/kg/j	sirop	100mg ----NR < 15 kg Enfant (15 – 25 kg)	01ddp x3/j	10 jours
		sachet	500 mg (25- 38 kg) 1g > 38 kg (enfant > 12 ans)	01 sachet x 3/j	
Cephalo sporines	C1G : Cefalexine (cefacet -Keforal - lexinal) 50-100 mg/kg/j	sirop	125 mg (0-2 ans) 250 mg (2 – 7 ans) 500 mg (7 – 15 ans)	01 cam x 3 / j	10 jours
	C2G : Cefuroxime (Zinnat) 5 ml = 1 cac	Sirop 125 m	< 9 kg 9 – 18 kg > 18 kg	½ cac x2/j 1 cac x2/j 1 cac x 3/j (7.5x2)	
	C3G : Cefdinir (Omnicef) 7 mg /kg/j 5 ml = 1 cac	Sirop	40 ml : < 9 kg 9 – 18 kg 9 – 27 kg 80 ml : > 27 kg	½ cac x2/j 1 cac x2/j 1 cac x 3/j (7.5x2) 1 cac x 3/j	
	C3G: Cefixime (Oroken) (04-08) mg/kg /j	sirop	40 mg < 10 kg 100 mg (10 – 40 kg)	01ddp x 2/j	
		cp	200 mg > 40 kg	01 cp x 2/j	
Macrolides DDP	Clarithromycine (Zeclar) 50mg/kg/j	sirop	25 mg < 20 kg 50 mg (20-40 kg)	01 ddp x2/j	8 jours
		cp	500 mg > 40kg	01cp x 2/j	
	Josamycine (josacine) 50mg/kg/j	sirop	125 mg < 8kg 250 mg (8—16 kg) 500 mg (16 – 40kg)	01ddp x 2/j	05 jours
		cp	500mg > 40 kg	01cp x 2/j	
	Azithromycine (Zithromax – Zomax) 15 ml = 200 22.5ml=300	Sirop 15ml 22.5ml	3 mois – 3 ans (10 mg/kg/j) 3-8 ans 15 – 25 kg 5 ml/j 8-11 ans 26-35 kg 7.5 ml/j 12-14 ans 36 – 45 kg 10 ml/j	01 ddp/j	3 jours
	Erythromycine (Erybesan) 30-50 mg/kg/j 5 ml contient 200 mg	Sirop 200 mg	5 – 10 ans 20-35 kg > 35 kg	5 mlx3/j 10mlx3/j	10 jours
Sulfamides	Bactrim 30 mg/kg/j 1cac/10 kg 1 cac = 1cc	Sirop 240	½ cac < 6 mois 1cac (6 mois – 2 ans) 2 cac (2ans -6 ans) 3 cac (6 ans – 12 ans)	x 2/j	10 jours
		Cp 480	1 cp > 13 ans	x2/j	
Autres	Metronidazole (flagyl) (10mg/kg) 30 mg/kg/j	Sirop cp	125 mg 250 mg > 13 ans	01 cam x 3/j 01 cp x 3/j	07 jours
	Acide Fusidique (Fucidine) 40 – 60 mg/kg/j 5 ml contient 250 mg	Sirop 250 m pmd	Infc cutané a staph (furoncle)	01 ddp x 3/j	

A I N S Max 5 jours	Ibuprofene (sapofene - advil -antalfen- algifen) 20-30mg/kg chaque 6 h	Sirop >2ans	20 mg	01ddp x 2/j	1 bte
	Ac Niflumique (Nifluril)) 6mois	suppo	200 mg (6 mois - 30 mois) 400 mg/10kg (30 mois- 13 ans)	01supp x 2/j 01 supp x 3/j	
		Gelule	250 mg > 13 ans	1 gelule x 2/j	
ANTALGIQUES	Paracetamol (doliprane - efferalgan) 60mg/kg/j chaque 6h Soit 15mg/kg tout les 06 h* 10 mg/kg tout les 04 h	Sirop	Poids / 10 = nbre de Cam	01 cam/10kgx4/j	1 flc
		Supp ou sachet	100 mg < 6 kg 100 mg (6 - 8 kg) 150 mg (8 - 11 kg) 200 mg (12- 15 kg) 300 mg (16 - 28 kg) 500 mg > 29 kg	1/2 supp x 4/j 01 supp x 4/j	1 bte
			500 mg > 29 kg	01 cp x 4/j	
		cp	500 mg > 29 kg	01 cp x 4/j	
	Asperine (aspegic) 60kg/kg/j a éviter chez enfant ((3 ans	Sachet	100 mg 250 mg 500 mg	01 ddp x 4/j	1bte
	Perfelgan (10-15mg/kg/j) 1.5 cc / kg	IV	250 mg - 500 mg	Poids+ 1/2 poids cc	1flc
Corticoides Pendant 5 j (HHC 5mg/kg)	Bethamethazone(celestone)	goutte	10 goutte/kg/j Si poids < 15 kg	01 prise/j matin	1flc
	Prednisolone (Solupred)	Cp 5m 20 mg	1mg/kg/j Si poids > 15 kg	01 prise /j matin	1 bte
	Prednisolone (physiolone) (Cortial)	sirop	0.2 -0.5 ml/kg/j	01 prise /j matin 01 ddp/j	1flc
	Methyleprednisolone (Solumedrol) (Medrol)	IM cp	20 - 40 - 80 (01mg/kg/j) 04 mg - 16 mg (0.5 mg/kg/j)	Enfant)) 6 ans	1 bte
	Prednisone (Cortancyl)	cp	05 mg - 20 mg (0.5 mg/kg/j)	Enfant)) 6 ans	1bte
	Dexamethazon(desacrovix)	Cp/inj	0.5 mg (0.5 mg/kg/j)	+++++	1bte
A N T I S P A S M O D I Q U E S	Trimbutine (Debridat) 01mg/kg/j 1cac = 5ml	Sirop 250	< 6 mois 6 mois - 1 an 1 an - 5 ans > 5 ans	1/2 cac x 2/j 1 cac x 2/j 1 cac x 3/j 2 cac x 3/j	01 flc
		sachet	> 5 ans	1 sachet / j	01 bte
		Cp	(100 mg/200 mg) pr enfant > 12 ans	1 cp x 2/j	
	Spasfon	Cp /inj	(80 mg/160mg) pr enfant > 12 ans	1cp x 3/j	
	Stop Colic Stop gaz	sirop	Nné < 1 mois 1 - 6 mois 6 mois - 1 ans > 1 ans	1/2 cac x 3/j 1 cac x 3/j 2 cac x 3/j (2 a3) cac x 3/j	1 flc
	Bedelix	Sachet	< 2ans (2 - 5 ans) (5 - 10 ans)	1/2 sachet x 2/j 1/2 sachet x 3/j 01 sachet x 2/j	01 bte
	Gaz bébé	Goutte	< 2 ans 2- 6 ans > 6 ans	5 goutte / j 10 goutte/j 20 goutte/j	01 flc
	Baby gaz	sirop	Nné < 1 mois 1 mois - 6mois 6 mois - 1 ans) 1 ans	1/2 cac x 3/j 1 cac x 3/j 2 cac x 3/j (2 a 3)cac x 3/j	1 flc
	Isospalgine (Timonal - vesciralgine)	sirop	Enfant adulte	01 cac x 3/j 01 caSx3/j	01 flc


Anti Diarrhéiques	tiopam) Ne dépasse pas 7 jours	sachet	10 mg < 15 kg 30 mg > 15 kg	01 sachet x3/j	01 bte
	Argiles (Smecta)	sachet	< 10 ans 6 mois - 1 année 01 année - 2 ans > 2 ans	½ sachet /j 01 sachet /j 01 sachet x 2/j 01 sachet x3/j	QSP 5 jours
	Lopéramide (Inphadium)	sirop	0.03 mg/kg/j soit 1.5 ml/kg/j	01ddp x3/j	1 flc
	Nifuroxazide (Ercerfuryl)	Sirop	> 2 ans Max 7 jours	01 cam x3/j	1 flc
	Ultrabiotique	sachet	Infantile - Nourrisson	01 sachet x2/j	1 bte
Anti Constipations	Lactulose (Duphalac - Isolact - Ezilax) matin ou coucher pdt 3 jours	Sirop	< 06 mois 06 mois - 1 ans 01 ans - 6ans 7 ans - 14 ans	½ cac x/j ½ cac x2/j 01 cac x2/j 01 cac x3/j	01 flc
	Forlax	Sachet	4 mg : 6 mois - 1 ans 1 ans - 4 ans 4 ans - 8 ans 10 mg : > 8 ans	01 sachet / j 01 sachet x2/j 01 sachet x3/j 01 - 02 sachet/j	1bte
	huile de paraffine	sirop	<01 ans 01 - 06 ans >6 ans	01 cac / j 01 cac x 2 / j 01 cac x3 / j	1 flc
	Glycérine	Supp	Bébé / adulte	01 supp x2/j	1 bte
Anti Emetiques	Domperidone (Motilium)	Sirop	Avant les repas 15 mnt	01 ddp x 3 / j	1 bte
		cp	10 mg > 30 kg (13 ans)	01 cp x2 / j	1 bte
	Metopimazine (vogalene) Ruptur	sirop		01 ddp x 3/j	1 flc
		supp	< 6 ans >6 ans	½ supp x 3/j 01 supp x3/j	1 bte
	Vomiteb	sirop	01 ans - 5 ans 5 ans - 12 ans > 12 ans	01 cac x2/j 01 cac x3/j 2 cac x3/j	1 flc
	SRO	sachet		01 sachet / 24h	1 bte
Anti reflux Anti acide	NOBAC nourrisson	sirop	0 - 01 mois aprs 6 rps 01 mois - 02mois aprs 5 rps 02 mois - 04 mois aprs 5 rps 04 mois - 18 mois aprs 4 rps	01 ml 1.5 ml 02 ml 2.5 ml	1 flc
	NOBAC enfant/adulte	sirop	2 ans - 6 ans 6 ans - 12 ans > 12 ans	01 cac x2/j 01 cacx3/j 02 cac x3/j	1 flc
Anti Tissufs > 2 ans (A éviter sur tt En cas toux Productive) — Rx thorax	Prospan (01 semaine)	S	02 ans - 06 ans 6 ans - 12 ans > 12 ans	½ cac x 2/j 01 cacx 2/j 01 cac x 3/j	1flc
	Carbocisteine (Rhinaliol - Carbomax 2% enfant 5%ad - mycolyse)	I	2 ans - 5 ans > 5 ans Adulte	1 cac x2/j 1cac x3/j 03 cac x3/j	
	Toplexil	R	2 ans - 6 ans 6 ans - 10 ans 10 ans -12 ans	1 cac x3/j 2 cac x2/j 2 cac x3/j	
	Toux kid (1 a 6 ans)		1 ans - 6 ans 6 ans - 15 ans	1 cac x3/j 2 cac x3/j	
	Neocodeon	O	Nourrisson > 3 mois	01 cac x2/j	
	denoral	P	30 mois - 8 ans 8 ans - 15 ans	½ cac x4/j 1 cac x4/j	

Maux De Gorge	Maxilase (seche)	Sirop	6 mois – 3 ans > 3 ans Adulte	1 cac x3/j 2 cac x3/j 1 ca5x3/j	1 flc
	Hexaspray Pulv/3				
	Thymoseptine (productive)		3 ans – 6 ans 7 ans – 12 ans > 12 ans	01 cac x4/j 2 cac x4/j 3 cac x4/j	
A N T I H I S T A M I N I Q U E Apartir de 1 ans	Primalon (cam = 2.5 ml)	sirop	< 40 kg > 40 kg	1 cam/kg rpti2/j 4 cam x2/j	
	Polaramine = Histagan= doramine Max 5jours	Sirop	< 30 mois 30 mois -10 ans 10 ans -15 ans > 15 ans	½ cam x 3/j 1 cam x 3/j 2 cam x 3/j 4 cam x3/j	01 flc
		Cp 2 mg	> 15 ans	1 cp x 3/j	1 bte
	Zyrtec = Rhtene	goutte	2 ans – 6 ans 6 ans – 12 ans > 12 ans	05 goutte x2/j 10 goutte x2/j 20 goutte/j le soir	1bte
	Deslor (le soir) Rhinite allergique	sirop	1 ans – 5 ans 6 ans -11 ans > 12 ans	2.5 ml/j (1/2cac/j) 5 ml/j (1 cac /j) 10 ml/j (2cac/j)	1flc
	Loratidine (Loradine - clarityne)	sirop	< 30 kg > 30 kg	1 cam/j 1 cam x2/j	
		Cp10m	> 12 ans	1cp/j	1bte
	Ketotifene	sirop	6 mois – 3 ans > 3 ans	½ cac x2/j 1 cac x2/j	
Lavage des Fosses nasales	Eau de mere (humer)	pulv			1 bte
	Sterimar - Respinal			01 pulv x3/j	
	Nasacort				
anti	Fluvermal Helmintox	sirop	Renouveler tt les 15 jours	01 cac /j pnd 3j	1 flc
parasitaire	vertin	Cp400	Boite=1cp (répétition chaque 7 j)	01 cp / j	3 bte
	Fungisone daktarin	Sirop Gel	Muguet ou aphte buccale	01 cac x3/j 01 app x3/j	1fl
Multi Vitaminiques	Solvityl ou Alvityl	sirop	6 mois – 1 ans 1 ans – 15 ans > 15 ans	½ cac /j 1/2 cac x2/j 1 cac x2/j	01 flc
	vitaforme	goutte	1 ans – 3 ans 4 ans – 12 ans > 12 ans	15 goutte/j 20 goutte/j 25 goutte /j	
	Géni kid	sirop	2ans – 7 ans 7 ans – 12 ans > 12 ans	01cac x2/j 01 cac x3/j 01 cac x4/j	
	Omega 3 junior	sirop	3 ans – 7 ans 15 ml 8 ans - 12 ans 30 ml	½ dosette/j 1 dosette /j	
	Pédiactif omega 3	sirop	0 – 6 ans 6 -15 ans > 15 ans et femme enceinte	1 cac /j 1cac x2/j 1cacx3/j	
	Memory fort (aprs repas)	sirop	< 5 ans > 5 ans	1 cac x2/j 2 cac x3/j	
Conjonctivite	Tebromycine (obrex/tobrex)	collyre	Purulente	01 goutte x4/j	10 jours
	Fucithalmic	pmd	purulente	01 appl/j le soir	
	Opti sérum	goutte		1-6 goutte x3/j	
	Rifamycine (bacterienne)	Collyre Pmd	01 goutte/cœil * 4/j 1pp /j le soir	4 goutte/j	
	Vitabact (Viral)	collyre	01 goutte/cœil * 4/j	4 goutte/j	

***Définition de l'officine :**

Est un local où les médicaments sont conservés, préparés et servis par le pharmacien (assistant de pharmacien) .

***prescription de l'officine :**



***Signification des couleurs :**

- vert —→ tous qui est bio
- blanc —→ propreté
- rouge —→ le sang

***subdivision de l'officine :**

Surface $\geq 50m^2$
Distance $\geq 200 m$

1 – salle de vente :

- comptoirs
- Etagères

2 – salle de stock :

- réfrigérateur : contient tous produit sensible à la chaleur (insuline – vaccin – collyre ...)
- Armoire fermante : contient des produits à l'abri des gens (psychotropes , neurologique)
- paillasse : sert à la préparation des produits

3 – sanitaire :

***Le rôle de l'assistant de pharmacien :**

Il participe à :

- l'accueil des malades et assure le bon comportement.
- identification de la prescription médicale (ordonnance).
- délivrance des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
- implantation des produits dans les linéaires.
- conseil et orientation des malades.

***La prescription médicale (ordonnance) :**

- Est un document permettant au malade de connaître son traitement et au pharmacien de lui servir.

- elle est écrite par le médecin (généraliste – spécialiste – dentiste – sage-femme) après l'examen de malade.

- elle doit comporter :

1 – la date de soin (ne dépasse pas 48 h).

- 2 – renseignement de médecin (nom, prénom, qualité, adresse, N° tel).
- 3 – renseignement de malade (nom, prénom, Age et poids).
- 4 – Dénomination de médicament, forme, dosage, quantité (QSP) et posologie.
- 5 – cachet et signature de médecin.

*** Dénomination de médicament :**

- 1 – DCI : c'est le nom admis pour tous les pays

Détermination Chimique International

Dénomination Commune International

- 2 – NC : c'est le nom sous lequel une firme pharmaceutique vend ces médicaments

Nom Commercial

*** Abréviation des formes médicamenteuses :**

- | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| - Comprimé | → | cp – comp | boîte | → | bt – bte |
| à avaler – à croquer – à sucer – dispersible – effervescente – lyoc (sublinguale) | | | | | |
| - gélule | → | gel | | | |
| - sirop | → | sp – srp | flacon | → | fl – fle |
| * cuillère à mesure | → | c à m / cm (5ml) | | | |
| * cuillère à café | → | c à c (5ml) | | | |
| * cuillère à soupe | → | c à s (10 - 15ml) | | | |
| * pipette | → | 1 dose de poids | → | 1 ddp | |
| * Dosette | → | 2.5ml – 5ml – 7.5ml – 10ml – 15ml | | | |
| - Sachet | → | st – sac – scht – s | | | |
| - Suppositoire | → | suppo (voie rectale) | | | |
| - Ovule | → | ov (voie vaginale) | | | |
| - Goutte | → | gtt | | | |
| - Ampoule buvable | → | Amp – Ab | | | |
| - Pommade | → | pmd – pd – pde | } | tube | → tube |
| - Gel | → | gel | | Application locale → App | |
| - Crème | → | crème | | | |
| - Patch | → | patch | | | |
| - Collyre | → | collyre | | | |
| - Lotion | → | lotion | | | |
| - Spray | Nasal | → | pulverisation | → | pul |
| | Buccal | → | bouffet | → | bouffet |

- Injectable → inj N° 06
- * intra musculaire → 1 inj en IM
- * intra veineuse → 1 inj en IV
- * Sous cutané → 1 inj en S/C

Les Anti biotiques

1/betalactamine :(famille)

DCI	Indication	Forme / dosage / posologie
1 – Amoxicilline :	- infection respiratoire (sphère ORL otite - sinusite – pharyngite - angine – toux grasse) - Abscès dentaire - poste opératoire - infection digestif (ulcère d'estomac)	500mg Enf + 12 - cp < 1g Ad 1 cp 2 — 3x/j
NC		125mg NRS (0-2 ans) - sp < 250mg Enf (2-6 ans) 500mg Enf (6-12 ans) 1 cm 2 — 3x/j
-clamoxyl -amoxal		500mg Enf + 12 - inj < 1g Ad 1 inj en IM/J
- penamox -biopamox		
- amoxypen		
- saifoxyl		
- amodex.Gé		
- lamoxyl		
- amoximex		
2 – Ampicilline	- infection respiratoire - poste opératoire - infection urogénital	gel 500 mg Enf + 12 1 gel 2 — 3x/j
NC		sp 250mg Enf (2-6 ans) 1 cm — 3x/j
- Totapen		inj 1g Ad 1 Inj en IM/J
- Ampinax		
- Ampal		
- Ampilline		
3 – Amoxicilline / Acide clavulanique	- infection respiratoire Aigue (bronchite – sphère ORL – Angine) - Abscès dentaire Aigue - infection urinaire - infection cutanée bénigne	500mg Enf + 12 - cp < 1g Ad 1 cp 2 — 3x/j
NC		500 mg Enf - st < 1g Ad 1 sac 2 — 3x/j
- Augmentin		NRS - sp < Enf 1 ddp 2 — 3x/j
- Klavox – clavodar		
- Bioclav – Amoclan 8:1		
- Amoclan Bid		
- Amoclan fort		
- clavodex		
4 – Oxacilline	- infection cutané (plai – abcès cutané)	Enf + 12 1 gel 2 — 3x/j - gel500 < Ad 2 gel 2 — 3x/j
NC		500mg Enf 1 inj IM/j - inj < 1g Ad 1inj IM/J

5 – Phenoxy methyl pénicilline	- Angine	1000000 ui Enf + 12 - cp { 1500000 ui ad } 1 cp 2x/j 250000 ui enf - sp { 400000 ui enf } 1 cm 2x/j 500000 ui Enf - inj { 1000000 ui Ad } 1 inj en IM/j
NC		
- Oспен – Orapen – Penival - gectapen		
6 – Benzathine pénicilline	- Angine (effet retard)	600000 ui enf - inj { 1200000 ui Ad } 1 inj en IM / 21 jrs
NC		
- Extencilline – Retarcilline - retarpen - retarmex		

(ui → unité International)

2 / Céphalosporine (famille)

DCI	Indication	Forme / dosage / posologie
1 – Céfalexine	- infection respiratoire (sphère ORL – Bronchite – Angine) - poste opératoire - infection urogénital - infection dermatologique	500 mg Enf + 12 - cp { 1g Ad } 1 cp 2-3/j 125mg NRS - sp { 250mg enf } 1 cm 2-3x/j
NC		
- Keforel – Lexin – unlexin - lexinal – Ospexin – Cephalax - Cefacet – Cephadar - efflixante		
2 – Cefazoline	- infection respiratoire (sphère ORL – Bronchite – Angine) - poste opératoire - infection urogénital - infection dermatologique	- inj 1 g — Ad 1 inj en IM/j
NC		
- intrazoline - cefazal - zepelin		
3 – Cefactor	- infection respiratoire (Angine – Bronchite) - infection urinaire	500mg — Ad 1 cp 2 – 3x/j 125mg NRS - sp { 250mg enf } 1 cm 2x/j
NC		
- Tabiclor – Dicef - Cloracef		
4 – Cefuroxime	- infection respiratoire (Angine – Bronchite) - infection urinaire	250mg - cp { Ad } 1cp 2x/j 500mg - Sp 125mg NRS 1ddp 2x/j
NC		
Zimmat – zinoximor - daroxim		
5 – Cefixime	- infection respiratoire (Angine – Bronchite) - infection urinaire	200mg - cp { 400mg } Ad 1cp 2x/j 40mg NRS - sp { 100mg enf } 1 ddp 2x/j
NC		
- Oroken - orokal - Winex - Betexime		

3 / Macrolide : (famille)

DCI	Indication	Forme / dosage / posologie
1 – Spiramycine	- Abscès dentaire - Angine	$\begin{array}{l} \text{- cp } \left\{ \begin{array}{l} 1500000 \text{ ui Enf + 12} \\ 3000000 \text{ ui Ad} \end{array} \right\} \text{ } 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j} \\ \text{- sp } 0.375 \text{ mui enf } 1 \text{ cm } 2 \times / \text{j} \end{array}$
NC		
- Rovamycine – Spiracare - Spiramylal – Spira - Rovadal		
2 – Spiramycine / Metronidazole	- infection de la cavité buccale (Abscès dentaire – Gencive – stomatite)	$\text{- cp } \left\{ \begin{array}{l} 750000 \text{ ui Enf + 12} \\ 1500000 \text{ ui Ad} \end{array} \right\} \text{ } 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j}$
NC		
- Orogyl – Bi. orogyl - spiradent – Bi. spiradent - rodogyl – Bi. rodogyl		
3 – Azithromycine	- infection respiratoire (Angine – Bronchite)	$\begin{array}{l} \text{- cp } \left\{ \begin{array}{l} 250 \text{ mg bt} = 06 \text{ cp enf} \\ 500 \text{ mg bt} = 03 \text{ cp Ad} \end{array} \right\} \\ 1 \text{ cp/j pdt } 03 \text{ jrs} \\ \text{A distance des repas} \\ \text{- sp } 200 \text{ mg } \left\{ \begin{array}{l} \text{Nrs } 2.5 \text{ ml/j} \\ \text{Enf } 5 \text{ ml/j} \end{array} \right\} \text{ pdt } 03 \text{ jrs} \end{array}$
NC		
- Zomax – Zithromax - Azithral – Zotrix - Azimycine – binozyl		
4 – Roxithromycine	- infection respiratoire (pneumopathie)	$\text{- cp } 150 \text{ mg AD } 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j}$ Avant les repas
NC		
- Roxid – Roxamed		
5 – Josamycine	- infection respiratoire	$\begin{array}{l} \text{- cp } 500 \text{ mg – Ad } 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j} \\ \text{- sp } \left\{ \begin{array}{l} 125 \text{ mg NRS} \\ 250 \text{ mg enf} \\ 500 \text{ mg enf} \end{array} \right\} \text{ } 1 \text{ ddp } 2 \times / \text{j} \end{array}$
NC		
- Josacine		
6 – Clarithromycine	- infection respiratoire (sphère ORL – Bronchite – Angine – pneumopathie) - Abscès dentaire - infection dermatologique - infection digestif (ulcère d'estomac)	$\begin{array}{l} \text{- cp } \left\{ \begin{array}{l} 250 \text{ mg} \\ 500 \text{ mg} \end{array} \right\} \text{ } \text{Ad } 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j} \\ \text{- sp } \left\{ \begin{array}{l} 125 \text{ mg NRS} \\ 250 \text{ mg enf} \end{array} \right\} \text{ } 1 \text{ ddp } 2 \times / \text{j} \end{array}$
NC		
- Clarit – Zeclar - Claridar		

4 / Aminocide : (famille)

1 – Gentamycine (DCI) :

- infection urogénital
- Abscès dentaire
- poste opératoire
- infection rénal

forme / dosage / posologie

inj $\left\{ \begin{array}{l} 40 \text{ mg enf} \\ 80 \text{ mg Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1 \text{ inj en IM/j}$

NC

- Gental
- Epigent
- Gentaxyn
- Gentaline

5 / Quinolone : (famille)

1 – ciprofloxacine(DCI) :

- infection urogénital
- poste opératoire
- pied diabétique

forme / dosage / posologie

cp $\left\{ \begin{array}{l} 250 \text{ mg} \\ 500 \text{ mg} \\ 750 \text{ mg} \end{array} \right\} \rightarrow \text{Selon le cas}$

NC

- Ciprolon - ciprotek
- Cipro- ciprofloxacal
- Cipromax
- Ciproval - Quinox

6 / Tetracycline (famille) : → infection légère de la peau

1 – Doxycycline (DCI) :

forme / dosage / posologie

cp 100 mg - Ad

NC

- Dotur -Doxyline
- Vibramycine N

2 – Oxvtetracycline (DCI) :

forme / dosage / posologie

cp 250 mg - Ad

NC

- Oxymed

3 – Emcycline (DCI) :

forme / dosage / posologie

cp 150 mg - Ad

NC

- Tetralysal

7 / Autre :

1 – Acide fusidique (DCI) :

- infection cutané compliqué
(plais – abcès –pied diabétique)

forme / dosage / posologie

- cp 250 mg - Ad 2cp 2 – 3x/j
- sp 250 mg - enf 1cm 2 – 3x/j
- pd 1 app le soir

NC

- Fucidine - Zeta
- Fucidane
- Acifudal

2 – Nitroxoline (DCI) :

- infection urinaire

forme / dosage / posologie


Cp $\left\{ \begin{array}{l} 50 \text{ mg} \\ 100 \text{ mg} \end{array} \right\} \rightarrow \text{Ad 2cp 2 – 3x/j}$

NC

- Nibiol
- Nabyol forte
- Naxolin

Les Antalgiques

Sont des médicaments destinés à réduire la douleur d'un patient.



1 – Paracétamol (DCI) :

Douleurs et fièvre (maux de tête – douleur dentaire – état grippal – courbature)

forme / dosage / posologie :

- cp { 500 mg enf + 8 ans 1 g Ad }	1 cp / 6 h ou / 8 h	{ + 4x/j → Toxicité hépatique }
- suppo { 100 mg 3 - 8 kg 150 mg 8 - 12 kg 200 mg 12 - 16 kg 300 mg 15 - 24 kg }	NC	- Doliprane - Dolye - Paralgan - paramol - panadol - dolicrane - dofebril - effetalgan - suppfadol - dolpriv - cetalgine - sapramol - expanadol - telynol - paracetal
- st { 100mg 6 - 8kg 150 mg 8 - 12kg 200 mg 12 - 16 kg 300 mg 15 - 24 kg 500 mg +27 kg (+8ans) }		
- sp { Nrs Enf }	1 ddp / 6h ou 8h	

2 – paracetamol + acide ascorbique (DCI) :

Douleurs et fièvre

forme / dosage / posologie :

cp enf + 8 ans et ad 1 cp / 6h ou / 8h

NC

effergalvan vit c

3 – Tramadol (DCI) :

Douleur en traumatologie et rhumatologie

forme / dosage / posologie :

- gel $\left\{ \begin{array}{l} 50 \text{ mg} \\ 100 \text{ mg} \end{array} \right\}$ ad 1 cp 2 – 3x/j

- inj Ad à la demande

NC

- Dolex – Supramadol

- Duofem

4 – Paracétamol / Tramadol (DCI) :

Douleur en traumatologie et rhumatologie

forme / dosage / posologie :

- cp — ad 1 cp 2 – 3x/j

NC

- Xamadol - Di dolex

- Dolokil – extramadol

- Dolmatol – Trapal – planadix advance.

5 – paracétamol / caféine (DCI) :

- douleur dentaire

- Douleur en traumatologie et rhumatologie

- Migraine

forme / dosage / posologie :

- cp — Ad 1 cp 2 – 3x/j

NC

- Panadol extra - pacet extra

- planadix extra

6 – paracétamol / codéine (DCI) :

- douleur dentaire

- Douleur en traumatologie et rhumatologie

- Migraine

forme / dosage / posologie :

- cp — Ad 1 cp 2 – 3x/j

NC

- Codoliprane – Coparamol – Coparalgan

- Dafalgan codeine

Contre-indication :

Asthme – Cardiopathie – Femme enceinte



Les Anti Pyrétiques

Sont des médicaments dont le but est de lutter contre le symptôme de la fièvre (38.5°)

Effets secondaires :

- 1- Trouble digestif (ulcère d'estomac)
- 2- Risque hémorragique
- 3- Toxicité rénale

1 - Acide Acétyl Salicyllique (Dci) :



- inj 500 mg → Ad 1 inj en IM au moment de la fièvre

N.C :

Aspégic – Catalgine - Aspirine Cardio – Aspirine biotique – Aspegal.....

Les anti inflammatoires:

1- Ains :

DCI	Indication	Forme- dosage-posologie
1/ Diclofenac de sodium :	- douleur dentaire	25mg enf 50 mg 75 mg 100 mg - Cp AD 12.5mg nrs 25 mg enf 100 mgAd - Suppo - Inj 75 mg Ad - gel 1cp 2x/j 1cp/6h - /8h 1cp 1 a 2x/j 1cp/j 1 supp le soir 1 inj en IM/J 1app le soir
(N.C)	- douleur en traumatologie et Rhumatologie	
- Clofenal – biofenne – xinnac – voltamex – votrex- flovenac- fenaquene- declofar- diclamid- clogel- voltarene emulgel- tabiflex cool	- douleur de cycle menstruel	
2/ Naproxène sodique :	- douleur dentaire	275 mg 550 mg DS CP Ad 1cp 2x/j
(N.C)	- douleur en traumatologie et Rhumatologie	
Nopain- Nopain DS proxidol- proxidol DS Nhupain- Nhupain DS	- douleur de cycle menstruel	
3/ Diclofenac de potassium :	-douleur dentaire	- cp 50 mg AD - 1cp 2x/j
N.C	- douleur en traumatologie et Rhumatologie	
Rapidus- cataflam- votrex rapide	- migraine	
4/ Ibuprofene : (DCI)	Douleur et fièvre	200 mg enf+8/AD 400 mg 600 mg - CP AD 1cp/6h - /8h NRS Enf - sp 1ddp /6h - /8h
NC		
Xydol- Ibuprofal- prof- Antaflen - Sapofen- Algifen- remofen- bifen...		
5 / Morniflumate (DCI)	- douleur en traumato et Rhumato	250mg Ad 200 mg NRS 400 mg enf 700 mg Ad -suppo 1 suppo le soir 2gel 2 - 3x/j ad pd 1app le soir
NC	- mal au gorge	
Niflumene – inflammine – usenil- Niflumate - Niflurie – flucidal- Niflugel	- Otite – circoncision	
NC		
Celebrex – Celoxib – Celvex- Rumabrex- Inicox		
7- piroxicam (DCI)		
Prixam- feldene – felcam – piroxeu- painoxam Geldene- orthocam – fenoxam		

8/ ketoprofene : (Dci) (il est utilisé comme Ains puissant)	- douleur en traumatisme et Rhumato - douleur rénal	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 100\text{mg} \\ 200 \text{ mg LP} \end{array} \right\}$ Ad (1cp 2x/j)
NC		- suppo 100mg Ad (1 suppo le soir)
Profenid- profen- ketum- geprofen- Alprofen – Ketonal- Ketoneed- Kefentech patch- Saifen.....		- inj 100 mg - Ad (1inj en IM/J) - gel Ad (1App le soir)
		- sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{urs} \\ \text{enf} \end{array} \right\}$ 1 ddP / 6h ou /8h
		- patch 1 patch /48h

2/ Ais (corticoïde)

DCI	Indication	Forme- dosage- posologie
1 - Prédnisolone (N.C) - solupred -oropred - solugé -deprisol - swor - prèdnal - physiolone	- Système respiratoire (Bronchite- Asthme- ORL- Tuberculose...) - Transplantation des organes	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 5\text{mg} \text{ enf } +2\text{ans} \\ 20\text{mg} \text{ Ad} \end{array} \right\}$ - Selon le cas- matin Après les repas pdt : 05 jrs -sp
2 - Methyl prédnisolone N.C - Medrol - Lemod - Prednol -MP4 - MP16 -Solu medrol - Meprenal	- Système respiratoire - Allergie Saisonnière - En traumatisme et Rhumato	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 4\text{mg} \\ 16\text{mg} \end{array} \right\}$ Ad Selon le cas - inj $\left\{ \begin{array}{l} 20 \text{ mg} \text{ enf} \\ 40\text{MG} \text{ Ad} \\ 120\text{MG} \end{array} \right\}$ 1inj en IM/J
3 - Betaméthasone : (Dci) N.C Celestene - Celestasone - Betabio- Betacrovis - Tabeta - Heet – Diprostene – diprosone -Betasone- Betsol - dermasol	- système respiratoire - Allergie Saisonnière - En traumatisme et Rhumato	- cp - 2mg Ad (selon le cas) - gtt $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{Enf} \end{array} \right\}$ 10gtt/ 1kg - inj Ad 1 inj en IM/ 7 a 21 jrs - pd } lapp/j - lotion }

- Traitement de Reflux Gastro oesophagien : (RGO)

1/ anti-acide

2/ anti- émitique

- Traitement de gastrite : (inflammation)

1/ Traitement de RGO

2/ anti spasmodique

3/ pensement gastrique (IPP)

- Traitement de l'ulcere d'estomac : (infection)

1/ Traitement de Gastrite

2/ Antibiotique

3/ Régime Alimentaire

Les Anti-Acides

- Brulure d'estomac et Remonte des acides

ST	SP	CP
- Gaviscon - Phosphalugel -Phosphalumine -Estogel -Pepsane	-Gaviscon -Nobac -Gastrium -Peptidac -Maalox	-Rennie -Renibon -Rennie deflatine
1 sac 3x/j	1 càs 3x/j	1 cp 3x/j

Les Anti – émétiques

-Traitement de vomissement et Nausée

DCI	Forme- dosage- posologie
1/Metoclopramide : (Dci)	- cp 10 mg Ad 1 cp 3x/j
NC	- sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{ENF} \\ \text{AD} \end{array} \right\}$ Ad 1 cas 3x/j
Clopramide- Metoclam- primpéran- mepramide	- Suppo Ad 1 suppo à la demande - inj Ad 1 inj en IV ou en IM à la demande
2/ Dompéridone : (DCI)	
NC	- cp 10mg AD 1cp 3x/j
Dompérone- Motilium- Emiduim- Motidone Dompéride- Nauséduim- Peridys...	- sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{Enf} \end{array} \right\}$ 1 ddp 3x/j
3/ Vomiteb : (N.C)	- cp Ad 1cp 3x/j
	- sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{enf} \text{ 1càc} \\ \text{Ad} \text{ 1càs} \end{array} \right\}$ 3x/j

Les antispasmodiques

1)Phloroglucinol:(DCI)

- Gastro-entérologie.
- Gynécologie (Femme enceinte – Douleur de cycle menstruel).
- Colique néphrétique (Rein)

*** Forme-Dosage-Posologie:**

- Enf +8ans 1Cp $\xrightarrow{2}$ 3x/J
- Cp Lyoc 80 mg $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf +8ans 1Cp} \xrightarrow{2} 3x/J \\ \text{Ad} \quad 2Cp \quad \xrightarrow{2} 3x/J \end{array} \right.$
- Suppo 150 mg $\rightarrow$ Ad 1Suppo à la demande.
- Inj $\rightarrow$ 1 Inj en IM ou en IV à la demande.


Ex : (N.C)

Spasfon – Spasmodyl – Spacyl – Levospasme –Spasmol – Spasmine - Spasmex.

2) Trimébutine : (DCI)

- Douleur, Ballonnement et Gaz de colon

** Forme-Dosage-Posologie:*



Ex : (N.C)

- Debridat.
- Digestat.
- Transacalm.
- Trimedat.
- Colostop.

3) Meteospasmyl: (N.C)

- Douleur et gaz de colon

** Forme-Dosage-Posologie :*

- Cp $\rightarrow$ Ad 1Cp 3x/J

4) Meteoxane: (N.C)

- Douleur , Ballonnement et Gaz de colon

** Forme-Dosage-Posologie :*

- Gel $\rightarrow$ Ad 2gel 2 $\rightarrow$ 3x/J

5) Bedelix: (N.C)

- traitement de dérèglement de l'intestin


** Forme-Dosage-Posologie :*

- St $\rightarrow$ Ad 1 sac 3x/J

6) Pinavérium : (DCI)

- traitement des douleurs et des troubles du transit (relâche les muscles)

** Forme-Dosage-Posologie :*




Ex : (N.C)

- Dicetel - Pinatel.

7) Mebévérine : (DCI)

- traitement des douleurs ou de l'inconfort liés au dérèglement de l'intestin



Ex : (N.C)

Duspatalin – Spascol – Despavine

Pensement Gastrique (IPP)

Inhiteur de la pompe à proton

- Maux d'estomac
- En association avec les Anti – inflammatoires

1 / Oméprazole : (DCI)

Gel $\left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ mg enf} \\ 20 \text{ mg Ad} \end{array} \right\} \quad 1 \text{ gel } 1 \text{ à } 2 \text{ x/j}$

Ex: (N.C)

Lomac – Proton – Zimor – Antag – Omed – Neogastric – Omépramex - omind .

2 / Lansoprazole : (DCI)

Gel 30 mg → Ad 1 gel 1 à 2 x/j

Ex: (N.C)

Esoproton

3 / ésoméprazole : (DCI)

Gel $\left\{ \begin{array}{l} 20 \text{ mg} \\ 40 \text{ mg} \end{array} \right\} \quad \text{Ad } 1 \text{ gel } 1 \text{ à } 2 \text{ x/j}$

Ex: (N.C)

Inexium – Esoral – Kenzoprazole – Lesinox

4 / pantoprazole : (DCI)

Gel 40 mg → Ad 1 gel 1 à 2 x/j

Ex: (N.C)

Protonex – Pantodar

5 / Ranitidine : (DCI)

CP $\left\{ \begin{array}{l} 150 \text{ mg} \\ 300 \text{ mg} \end{array} \right\} \quad \text{Ad } 1 \text{ cp } 2 \text{ x/j}$

Inj Ad 1 inj en IM à la demande

Ex: (N.C)

Ranitex – Ranitidal – Ratidex – Ranimex

Les Laxatifs : (Traitement de la constipation)

Sont des médicaments accélérant le transit intestinal (facilitant l'évacuation des selles).

1) Lactulose : (DCI)

Traitement symptomatique de la constipation.

*** Forme-Dosage-Posologie :**

-St $\longrightarrow$ Ad 1 sac 2 $\longrightarrow$ 3x/J
NRS 2,5ml 2 $\longrightarrow$ 3x/J
-SP $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf 5ml-7,5ml 2} \longrightarrow 3x/J \\ \text{Ad 10ml-15ml 2} \longrightarrow 3x/J \end{array} \right.$

Ex : (N.C)

Duphalac - lactulose Mylan - Lactunad - Ezilax - Isolact - Inphalac.

2) Macrogol : (DCI)

Traitement symptomatique de la constipation.

*** Forme-Dosage-Posologie :**

-st $\left\{ \begin{array}{l} 4g \text{ NRS 6 mois} \longrightarrow \text{Enf 8 ans} \\ 10g \text{ Enf 8 ans} \longrightarrow \text{Ad} \end{array} \right. \} 1 \longrightarrow 2 \text{ sac le matin}$

Ex : (N.C)

-Forlax.

3) Glycérine : (N.C)

Lorsque les selles s'accumulent dans le rectum (bouchon)

*** Forme-Dosage-Posologie :**

-SUPPO $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{array} \right. \} 1 \text{ Suppo à la demande}$

4) Charbon active : (DCI)

Traitement symptomatique des troubles de transit intestinal (absorbant)

*** Forme-Dosage-Posologie :**

-Cp $\longrightarrow$ Ad 1 Cp 2 $\longrightarrow$ 3x/j

Ex : (N.C)

Eucarbon - Charbonnel - Carbophos.

5) Micro lavements :

5)1-Norgalax (regulax) }
5)2-Normacol lavement } Tube (voie rectal) pour assurer le vidange
(Préparation des examens)

5)3-Fortrans $\longrightarrow$ St

6) Laxatifs à base des plantes :

6)1- Laxena Cp $\begin{cases} 15 \text{ mg} & \text{Enf} \\ 25 \text{ mg} & \text{Ad} \end{cases}$

6)2- Huile de paraffine SP $\longrightarrow$ Ad EX : isofine

Les Anti diarrhéiques :(Traitement de la diarrhée)

Diarrhée $\begin{cases} \text{Mal Nutrition.} \\ \text{Médicament.} \\ \text{Physiologique (poussé dentaire-Trac-Stress).} \end{cases}$

1) Nifuroxazide : (DCI)

Diarrhée d'origine bactérienne.

** Forme-Dosage-Posologie :*

Gel 200 mg $\longrightarrow$ Ad 2 gel 2 $\longrightarrow$ 3x/J.

SP $\begin{cases} \text{Nrs} & 2,5\text{ml} \\ \text{Enf} & 5\text{ml} \end{cases} \Bigg\} 2 \longrightarrow 3\text{x/J.}$

Ex : (N.C)

Ercefuryl – Xéfuryl – Dysentyl – Nifazide - Penfurax.

2) Lopéramide : (DCI)

Ralentisseur de transit intestinal (réduise les sécrétions).

** Forme-Dosage-Posologie :*

Gel 2 mg $\longrightarrow$ Ad 1 gel 2 $\longrightarrow$ 3x/J

SP $\begin{cases} \text{Nrs} \\ \text{Enf} \end{cases} \Bigg\} 1\text{ddp } 2 \longrightarrow 3\text{x/J.}$

Ex : (N.C)

Lopéridal – Imodium – Diaryl – Dimépra - Inphadium.

3) Racécadotril : (DCI)

Traitement symptomatique de la diarrhée aigue.

** Forme-Dosage-Posologie :*

Gel 100mg $\longrightarrow$ Ad 1 gel 2 $\longrightarrow$ 3x/J

St $\begin{cases} 10\text{mg} & \text{Nrs} \\ 30\text{mg} & \text{Enf} \end{cases} \Bigg\} 1 \text{ sac } 2 \longrightarrow 3\text{x/J.}$

Ex : (N.C)

Tiorfan

4) Diosmectite : (DCI)

Régulateur de la fonction intestinal.

* **Forme-Dosage-Posologie :**

St	Nrs	1/2 sac	1	→	2x/J.
	Enf	1/2 sac	2	→	3x/J.
	Ad	1 sac	2	→	3x/J.

Ex : (N.C)

Smecta - Smedyl.

Traitement de la bactérie(cas intoxication)

1) Metronidazole : (DCI)

Cp	250mg	}	1 Cp	2	→	3x/J.
	500 mg					

Sp	125mg	Nrs	}	1 CM	2	→	3x/J.
	200mg	Enf					

Ex : (N.C)

Flagyl – Nidazol – Imuzol - Flazol.

2) Cotrimoxazole : (DCI)

Cp	480mg	}	Ad 1 Cp	2	→	3x/J.
	960 mg					

Sp 200mg 1 CM 2 → 3x/j.

Ex : (N.C)

- Bactrim - Bactrim forte
- Cotrimoxal- Cotrimoxal forte
- Trimédar - Trimédar forte
- Primazol
- Cotrim
- Sulprim

En cas de déshydratation on utilise :

Sels de réhydratation S.R.O — St

-Rehydrax — 1 L eau

-Celia — 200ml eau

-Rehydramin

A renouveler chaque
24h

Les Antihistaminiques (traitement de l'allergie)

<u>1 – Loratadine (DCI) :</u> Allergie respiratoire (rhinite) Forme-Dosage-Posologie : - cp 10 mg Ad 1 cp - sp — ENF 5 ml } le soir Ex (NC) : Clarityne – Tirlor – Akaryl – Neotadine – Allertine – Restamine	<u>2 – Kétotifène (DCI) :</u> - Allergie respiratoire (Toux) - Prévention bronchite/asthme Forme-Dosage-Posologie : - cp 1 mg Ad 1 cp - sp < NRS > 3 mois 2.5ml } le soir enf 5ml Ex (NC) : Totinal – Tifen – Zaditen	<u>3 – Cétérizine (DCI) :</u> Les deux types d'allergie Forme-Dosage-Posologie : - cp 10 mg Ad 1 cp - gt < Enf 5 - 10 gt } le soir Ad 15 - 20 gt Ex (NC) : Histazine – Artiz – Zyrtec – Zetirec – Rhiten	<u>4 – Fexofenadine (DCI) :</u> Les deux types d'allergie Forme-Dosage-Posologie : - cp < 120mg respiratoire } 180mg cutanée Enf + 12 et Ad Ex (NC) : Telfast – Rifex – Fexodine Fexonidal
<u>5–Dexchlorphéniramine (DCI)</u> Allergie cutanée Forme-Dosage-Posologie : - cp 2 mg - Ad 1 cp - sp < Nrs 2.5 ml } le soir Enf 5 ml Ex (NC) : Polaramine – Histagan – Histone	<u>6 – Mequitazine (DCI) :</u> Les deux types d'allergie Forme-Dosage-Posologie : - cp < 5 mg } Ad 1 cp 10mg } le soir - sp < Nrs 2.5 ml } Enf 5 ml Ex (NC) : Primalan	<u>7 – Cyproheptadine (DCI) :</u> Pour la prise de poids Forme-Dosage-Posologie : - cp 4 mg - Ad 1 cp } le soir - sp enf 1 cm Ex (NC) : Periactine – Heptagyl – Oryactine Heptal – Lapeti – Isoctine – super Appetit – Ceptadine – Modestamine	Autre : - deslor < Cp Sp - Rupafin cp 10 mg - Bilaxten cp 20 mg

Les Antitussifs

Toux sèche
↓
Suppresseur de la toux
↓
Effet central

Toux grasse
↓
Expulsion des mucus (expectorant)
↓
Effet local poumons

*** Expectorants :**

1) Carbocesteine : (DCI)

- Sp $\left\{ \begin{array}{l} 2 \% \text{ enf} \\ 5 \% \text{ Ad} \end{array} \right\} \text{ 1 CM } 3x/J.$

St 200mg $\longrightarrow$ Ad 1 sac 3x/J

Ex : (N.C)

Rhinathiol-mucolyse-Broncholactol-Pectosan-carbulam-fluimicil-solmucol

2) Ambroxol : (DCI) $\longrightarrow$ Sans sucre

Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf+8ans } 1c \text{ à } c \\ \text{Ad } 1c \text{ à } s \end{array} \right\} 3x/J.$

Ex : (N.C)

Muxol-lxol-Soluxol.

3) Bromhexine : (DCI)

Bronchite

Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf } 2,5 \text{ ml } 1 \text{ — } 2x/J \\ \text{Ad } 5 \text{ ml } 2 \text{ — } 3x/J \end{array} \right.$

Ex : (N.C)

Bisolvon – Isolvon

4) Mucotec : (DCI)

Pour lavage des poumons

Cp $\begin{cases} 150\text{mg} \\ 300\text{mg} \end{cases}$ } Ad selon le cas

<u>Toux sèche</u>	
<u>1 - Neocodion : (N.C)</u> Cp $\rightarrow$ Ad 1cp 3x/J Sp $\begin{cases} \text{Nrs + (3mois)} \\ \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{cases}$ } 1 CM 3x/j	<u>2 - Denoral : (N.C)</u> Sp $\begin{cases} \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{cases}$ } 1CM 3x/J
<u>3 - Comphobiotic : (N.C)</u> Suppo $\begin{cases} \text{Nrs} \\ \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{cases}$ } 1 suppo le soir	
<u>Toux sèche et irritative</u>	
<u>5 - Toplexil : (N.C)</u> Sp $\begin{cases} \text{Enf + 2 ans 1 cac} \\ \text{Ad 1cas} \end{cases}$ } 3x/J	<u>6 - Encofluid : (N.C)</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j
<u>7 - Sinécod : (N.C)</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j	<u>4 - Bronchocalm : (N.C)</u> Sp $\begin{cases} \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{cases}$ } 1 CM 3x/J
<u>À base des plantes</u>	
<u>8 - Zecuf : (N.C)</u> - Sp $\begin{cases} \text{Sucré} \\ \text{Sans Sucré} \end{cases}$ } Ad 1 cas 3x/J - pastille Ad 1 cp 3x/j	<u>9 - Mentex : (N.C)</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j

<u>10-biocalyptol : (NC)</u> -SP - Ad 1 cas 3x/j	<u>11-bronchonet (NC)</u> - Sp $\begin{cases} \text{Sucré} \\ \text{Sans Sucré} \end{cases}$ - pastille Ad 1 cp 3x/j
--	---

Mal au gorge

<u>1 – Hexalyse : (N.C)</u> Cp à sucer Ad 1 cp 3 - 4x/j	<u>2 – Hexaspray : (N.C)</u> Spray (collutoire) 1 bouffet 3 - 4x/j
<u>3 – Thymoseptine (NC) :</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j	<u>4 – α amylase (DCI) :</u> - Cp Ad 1 cp 3x/j ——— megamylase - sp enf 1 cac 3x/j ——— maxilase / Ximalex

Les Bronchodilatateurs

Sont des médicaments destinés à traiter ou à prévenir de certaines maladies telles que : Asthme et Bronchite

<u>1 – Salbutamol (DCI) :</u> - cp 2 mg selon le cas - sp $\begin{cases} \text{Nrs} \\ \text{enf} \\ \text{Ad} \end{cases} \left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} \text{ cac } 1 - 2x/j \\ \frac{1}{2} \text{ cac } 2 - 3x/j \\ 1 \text{ cas } 2 - 3x/j \end{array} \right\}$ - spray - solution à inhaler Ex : (N.C) Ventoline – Salbulam – Rabwalyse - koxma – Asthalin	<u>2 – Terbutaline (DCI) :</u> A un effet retard - cp 5 mg lp selon le cas - sp $\begin{cases} \text{Nrs} \\ \text{enf} \\ \text{Ad} \end{cases} \left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} \text{ cac } 1 - 2x/j \\ \frac{1}{2} \text{ cac } 2 - 3x/j \\ 1 \text{ cas } 2 - 3x/j \end{array} \right\}$ - inj (à usage hospitalier) Ex : (N.C) Bricanyl – Talin – Isobutaline
---	--

Autre : (Aéro)

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1 – Clenil 250 | 7- Foradil 12 |
| 2 – Budecort (100 – 200) | 8- Spiriva 18 |
| 3 – Flixotide (50 – 125 – 250) | |
| 4 – Séretide (100 – 250 – 500) | |
| 5 – Pulmicort (200 – 400) | |
| 6 – Symbicort (100 – 200 – 400) | |

Les Pulvérisateurs Nasal

<u>A base de sels</u>	<u>A base de Corticoïde</u>
- eau de mer - Respibien (Respinhal) - Soufrane - Niframycine - S.S.I (sérum physiologique)	- Beconase (Nasabec) - Nasacort - Flixonase (Flixasone) - Rinoclenil - Rhinocort - Nasonex - Niframycine hydrocortisone
1 pul 3 - 4x/j	1 a 2 pul le matin

Les gouttes Auriculaire

1 – Otofa	→ ATB	} SELON LE CAS
2 – Polydexa	→ ATB	
3 – Otocine	→ ATB	
3 – Panotile	→ Anti – inflammatoire / ATB	
4 – Otipax	→ Anti – inflammatoire	
5 – Cerulyse	→ Anti septique	

Les Vitamines

<u>1 – Fer : (dci)</u> - cp < 80mg Tardyferan 100mg Selofer 200mg Fumacure } Ad 1cp 1-3x/j - sp < 50 mg enf 100 mg Ad } 1cm 1-3x/j ferrulam – Orofer – Selofer - gtt < Nrs Enf Femum - Amp Ad 1 amp/j Fer3+	<u>2 – Acide Folique : (dci)</u> Cp 5 mg Ad 1 cp/j Ex: NC Zanitra – Fonitra – Foliden – Hup folique novofer
<u>3 – Fer + Acide Folique : (dci)</u> Cp Ad 1 cp/j Ex: NC Triferfol – Selofer fol – Tardyferan B9 – Novofer plus – zanitra plus	<u>4 – Magnésium : (dci)</u> (Carence en magnésium / stress) - CP : Ad supradyne magnésia – Adittiva magnésium - Amp :Ad enermag - Vitamag – Pimag - ST : enf Adittiva Bumbino mix - SP: enf enermag - Actimag

5- Calcium: (dci)

Cp 500mg ad 1 cp 1 a 3x/j

St 500mg ad 1 sac 1 a 3x/j

Sp enf 1 cm 1 a 3x/j

ex :

calcium sandoz- calperos - calcidose - actical- calcial - kinadyn

6- Vitamine D₃ (dci)

Amp $\left\{ \begin{array}{l} \text{inj} \quad 1 \text{ inj} / 6 \text{ mois} \\ \text{Orale} \end{array} \right.$

Ex :

Vit d₃ Bon

7- Calcium + vit D₃ : (dci)

- cp Ad 1cp 3x/j Ideos – osse D₃
- st Ad 1cp 3x/j calcium D₃ Sandoz

8- Acide Ascorbique : (dci)

-cp $\left\{ \begin{array}{l} 500 \text{mg lp} \\ 1000 \text{mg efferv} \end{array} \right.$ Ad 1 cp 2x/j

Ex:

Vitamin c upsa

9- Cyanocobalamine :

Inj Ad 1 inj en IM $\frac{1}{2}$ J

Ex : vit b₁₂ - cobamine

Les complexes vitaminiques :

- B₁-B₆ vv Neurovit – novital
- B₁- B₆- B₁₂ Trois b – Tri b
- Juvamine – Omnivit – Alvityl – Enervit – Calevit - echivit
- Gestarelle G (genesia – gestane – gestagyn)

Les ampoules (fortifiants)

- Tonic Ad
- Stimol Ad
- Gelpore 1000 Ad
- Gelpore plus 2000
- Gelpore pro
- Gelpore fer + vit e
- Gelpore ginseng
- Gelpore Junior
- Sargenor 500mg - enf / 1g - ad

Diabete

1/ Metformine : (Dci)

- cp 500mg
 850mg
 1000mg } Ad selon le cas Après les repas

Ex :

Glucophage – Novoformine- Diaguanide – Diabamine – diabformine

2/ Glimépiride : (Dci)

Cp 1mg – 2mg – 3 mg – 4 mg – 6mg —————> Ad 1cp/j Avant les repas

Ex :

Amarel – Lavida – Gludosin – Glimécare – piramyl - larimel

3/Répaglinide : (Dci)

 0.5mg
cp 1mg } Ad selon le cas avant les repas
 2mg

1/ Acarbose : (Dci)

Cp 50mg Ad 1cp 1 - 3x/j Avant les repas

Ex :

Glucobay – Gluconova

Autre ADO : (Anti Diabète Oraux)

- Glurenor 30mg cp/ Diamecran 30mg (Diaphag 80mg)/ Glibil 5mg (Diabenil)

Les Insulines

1/ flexpen :

- Novorapid – Novomix – levemir – Apidra Solostar – Lantus Solostar – Humalog mix

2/ Penfil :

-Actrapid – Mixtard – Insulatard – Humalog mix.




Les gouttes Oculaires et les pommades (collyres)

Les antibiotiques	Les anti-inflammatoires	ATB + anti-inflammatoires	Antihistaminiques	Suppléance	Antiglaucomeux
-Rifamycine Collyre pde -chibroxine (c) -Tobrex (c) -Gantalline (c) -Ciloxan (c) pde -Azyter (c) -Cébémoxine (pde) -Fucithalmic (pde) -Clomycine 1% (pde)	-Fraxidex (c) (pde) -Indocollyre (c) -Vexol (c) -Flucon(c)	-Maxidrol (c) (pde) -Cronolone neo (cedermex) (pde) -Bacicoline (c) -Chibro-cadron (c) -Sterdex (pde)	-Naaxia (c) -Naabak (c) -Levophita (c) -Opatanol (c) -Zlerg (c)	-Siccafluid(gel) -Liposic (gel) - Artelac -Hyfresh -Tymer -Vitamine A -Fluidabak (Sécheresse de l'œil)	-Carteol 1%-2% Lp 1%-Lp2% -Betoptic -Azopt -Trusopt -Travatan -Xolamal -Cosopt -Xalatan -Geltim (Hyper tension oculaire)

- Anti septique → vitabact - Désomédine - S.S.I
- Préparation des examens → Mydriaticum - Skiacol .

Les anti biotiques


1-Betalactamine (famille) :




D.C.I	Indication	Forme/Dosage	posologi
<u>1-Amoxicolline</u>	-infection respiratoire(ORL / angine/toux grasse) -Absès dentaire -poste opératoire -infection digestif (ulcère d'estomac)	500 mg CP 	-Enf (+12ans) -Adulte
NC		125 mg SP 	-NRS (0-2)
*Clamoxyl *amoxal *Amoxicilline EG *Amoxypen *Biopamox *lamoxyl *amoximex		500mg 1 cam 2 — 3x/j GEL : 500 mg INJ 	-ENF (2-6 ans) -ENF (6- 12ans) -ENF - Adulte
<u>2-Ampicilline</u>	-infection respiratoire -poste opératoire -infection urogénital	-Gélules 500mg 1 gel 2 — 3x/j	-Enf (+12ans)
NC			

-Ampinax -totapen -ampal -ampiline	- infection dermique	-sp 250 mg 1cam3x/j -INJ 1g 1ln) en IM /j	-ENF (2-ans) -Adulte
<u>3-Amoxicilline</u> <u>(Acide clavulanique)</u> NC -Augmentin -Klavox-clavodar - Bioclav- - Amoclan8-1 -Amoclan Bid -Amoclan fort -Clavodex	-infection respiratoire aigue (bronchite-ORL-) - Abscès dentaire Aigue -Infection urinaire -infection cutanée التهاب الجلد	500 mg -CP $\nearrow$ 1 g 1cp 2 — 3x/j 500 mg -sache $\nearrow$ 1 g 1sache 2 — 3x/j NRS -sirop $\nearrow$ ENF 1 DDP 2 — 3x/j	- Enf (+12ans) - Adulte -ENF (12ans) - Adulte -NRS (-ENF (ans)
<u>4-Oxacilline ou cloxacilline(orbenine500mg)</u>	- infection cutané (plaies ,abcès ,cutané) التهاب الجلد	ENF+12 1 gel2-3x/j -gel $\nearrow$	- ENF

NC		500 mg	Ad 2gel 2-3x/j	- Ad
-Bristopen -Oxaline -Oxacil -Oxal -Oxacare		-inj	500 mg ENF 1 (NJ) IM/J 1g Ad 1 (NJ) IM/J	- ENF+12 - Ad

2-Céphalosporine (famille) :

D.C.I	Indication	Forme/dosage /posologie
1-Cefalexine	-infection respiratoire (ORL , Bronchite , Angine)	cp  500mg ENF +12ANS 1g Ad
N.C	-poste opératoire	
-Keforal – Lexin – Ospexin -Cefacet – Cephadar	-infection urogénital - infection dermatologique	1cp 2-3x/j -SP  125 mg NRS 250 mg ENF 1Cam2-3x/j
<u>2-cefazoline</u>	-infection respiratoire (ORL , Bronchite , Angine)	
NC	-poste opératoire	




Intrazollne cefazal zepelin	-Infection urogénital - infection dermatologique	-INJ 1g ——— Ad INJ en IM
<u>3-Cefaclor</u>	- infection respiratoire (Angine , Bronchite) -Infection urinaire	-CP 500 mg — 1cp 2-3x/j -SP 
NC		
- Tabiclor - Cloracef - Dicef		
<u>4-Cefuroxime</u>	- infection respiratoire (Angine , Bronchite) -Infection urinaire	CP  SP 125mg NRS 1ddp2x/j
NC		
-Zinnat -zinoximor -Daroxime		
<u>5-Ceflixime</u>	- infection respiratoire (Angine , Bronchite) -Infection urinaire	CP 

NC	
-Orken -Orokal	SP $\begin{cases} 40\text{mg NRS} \\ 100\text{mg ENF} \end{cases}$ 1ddp2x/j


3-Macrolide :(famille)

D.C.I	Indication	Forme/dosage /posologie
1-Spiramycine	-Abces dentaire -angine	CP $\begin{cases} 1.5 \text{ M.U.I ENF} \\ 3 \text{ M.U.I Ad} \end{cases}$ 1cp2x/j -sp 0.375 M.U.I /5ml ENF 1 cam2x/j
NC		
-Rovamycine -Spiracare -Spiramynal -Spira -Rovadal		
2- Spiramycine/ Metronidazole	-infection de la cavite buccale (abces dentaire)	CP $\begin{cases} 750000 \text{ UI ENF+1} \\ 1500000 \text{ UI Ad} \end{cases}$
NC		


-OROGYL -Bi-orogyl -Bi-spiradent	(oral) 1cp/j	1cp2x/j
3-Azithromycine NC	-Infection respiratoire (Angine , Bronchite)	-cp $\begin{cases} 250 \text{ mg B/6 CP ENF} \\ 500\text{mg B/03 CP Ad} \\ 1\text{cp/j pdt j} \end{cases}$ A distance des repas 2h
-Zomax -Zithromax -Zotrix -Binozyt	A distance des repas 2h <i>à distance des repas 2h</i>	-sp $\begin{cases} 2.5 \text{ ml /j NRS} \\ 5\text{ml /j ENF} \end{cases}$ 200mg Pdt 03
4-Roxithromycine NC	-infection respiratoire (pneumopathie)	-cp 150mg Ad 1cp 2x/j avant les repas
Roxid Roxamed Roxithromycine HUP		

<u>5-Josamycine</u>		
NC	-infection respiratoire	- cp 500 mg -Ad 1cp2x/j
-Josacine		-SP  125mg NRS 250mg ENF 500mg ENF 1ddp2x/j
<u>6-Clarithromycine</u>		
NC		
-Clarit -Zeclar -Claridar	-Infection respiratoire (pneumopathie ,ORL , Angine) - Abscès dentaire -Infection dermatologique -Infection digestif (ulcère d'estomac)	-cp  250mg 500mg } Ad 1cp2/j -sp  125mg 250mg } 1ddp2x

4-Aminocide : (famille)

<u>-Gentamycine (D.C.I)</u>	indication	Forme/dosage/posologie
N.C	-infection urogénital -abcès dentaire - poste opératoire -infection rénal	inj 
Gental Epigent Gentaxyn Gentaline		

6-Quinolone(famille)

<u>-Ciproflxacine(D.C.I)</u>	indication	Forme/dosage/posologie
N.C	-infection urogénital - poste opératoire -pied diabetique	cp 
Ciprolon Cipro Ciprotek Quincx		

6-Tetracycline (famille) : infection légère de la peau

<u>Doxycycline (D.C.I)</u>	indication	Forme/dosage/posologie
N.C		-CP 1000mg Ad
Dotur Doxylone Vibramycine		