

Les antibiotiques

Les Beta-lactamines

A/ Les pénicilline : Angines, Infections pulmonaires, infections dentaires, sinusite, otite, urinaires, cutanée (bristopen) .



N'oubliez pas de demander au malade si il a une allergie à la Pénicilline !

Durée de traitement : généralement entre 7 à 10 jours .

La prise alimentaire n'a pas d'incidence sur l'absorption de la pénicilline , c'est-à-dire elle peut être pris avant , au cours ou après les repas .

• Sauf pour : • l'Augmentin (et ses génériques) : de préférence – au **début** des repas , afin de réduire au maximum le risque d'intolérance gastro-intestinale et d'améliorer l'absorption de ce médicament .

• Orbénine : Il est préférable de le prendre **30 minutes avant les repas** .

DCI	Nom commercial	Dosage	Posologie
1-Pem G : Benzylpenicilline	Gectapen	Inj : 500 mille UI (Enf) 01million UI (Ad)	*1inj/jr
2-Pem V : phenoxy-methyl- penicilline	Orapen, Ospen	SUSP buv (Enf) : 400 mille UI Cp (ad) : * 1million UI * 1,5 MUI	*3 prises/jr
3-Pem A: Amnopenicilline			
Amoxicilline	Clamoxyl Amodex Amoximex Amoxypen Biopamox	Smp Buv : 125, 250, 500 mg Cp /gélule : 500mg / 1g Inj : 1gramme	*2-3 prises par jour par voie orale . *1inj /jr
Ampicilline	Ampiline Ampinax,	Gélule : 500mg Inj : 1 gramme	*Ad: 2cp 2-3x/jr *1 inj/jr
Amoxicilline+ Acide clavulanique	Augmentin Amoclan Bioclav	Susp Buv (enf/ans) 100+12,5mg/ml Sch , cp Enf : 500+62,5mg AD : 1g+125mg	*2-3 prises/jr au début des repas

4- Penicilline M : anti staphylocoque : pour traiter certaines infections peu sévères de la peau			
Cloxacilline	Orbenine	Gélule : 500mg	*Ad, Enf > 12 ans 1-2 gélule 2-3x/jr 30 min avant les repas.
5-Pénicilline G à effet retard			
Benzathine benzyl- penicilline	Extencilline, Retaracilline,	Inj : 0,6 MUI (Enf) 1,2 MUI (Ad)	* 1 inj chaque 21 jours

Sinusite,,,

Céphalosporines de 1ere génération

Cefalexine	Cefacet Lexin Keforal Ospexin Cephalex Cefadar lexinal	Susp Buv 250mg (NRS+Ent) Gélule, cp 500mg (>12ans) Gélule, cp 1g (Ad)	2-3 prises /jr * Peut être pris Avec ou Sans aliments , mais il est préférable de le prendre en dehors des repas notamment chez les enfants (diminution de l'efficacité du médicament lors de sa prise avec du lait)
Cefadroxil	Cedrox	Cp 1g	*Ad : 1cp2x/jr la prise pendant les repas diminue les nausées .
Cefaclor	Cloracéf Tabiclor Dicéf	Susp buvable: Nrs: 125mg/5ml Ent : 250mg/5ml Cp (Ad) 500mg Ad	2 prises par jour
Cefazoline	Cefazolin, Cefazl, Zepilen,	Inj IM : 1 g	Ad 1 inj /jr

Céphalosporine de 2eme generation

Cefuroxime axetil	Zinnat Zinnetal	Susp buv (Nrs, Ent)125 mg/5ml Cp : 250, 500mg	2prises par jour après les repas
--------------------------	--------------------	--	-------------------------------------

Céphalosporine 3 eme génération

Cefixime	Oroken Orokal Winex	Susp buv Nrs 40mg/5ml Ent 100mg/ 5ml Cp Ad 200mg	2 prises par jour après repas
-----------------	--	---	-------------------------------

Aminosides

en association avec d'autres ATB

Gentamycine	Gentaxyn	Inj : Enf : 40 mg Ad : 80mg	*Ad, Enf : 1mg/jr
--------------------	----------	---------------------------------------	-------------------

Macrolides

Remplace les pénicilline en cas d'allergie ,

Spiramycine	Rovamycine, Spiracare,	Sirop Enf, Nrs 375 mille UI Cp : 1,5 Million UI 3 Million UI	2-3 prises /jr Cas d'abcès dentaires surtout
Spiramycine+ metronidazole	Bi orogyl Orogyl Spiradent, Bispiradent	Cp : 1,5 MUI + 250mg 750milles UI +125 mg	*Ad, Enf >12 ans 1 à 2 cp 2-3x/jr au milieu des repas Cas d'abcès dentaires surtout
Erythromycine	Eryhesan	Sirop : 200mg Cp : 500mg	*2-3 prises /jr
Roxithromycine	Roxid	Cp : 150 mg	*Ad : 1cp2x/jr avant les repas
Josamycine	Josacine	Susp buv : 125, 250 Cp : 500mg	Susp buvable selon le poids 2x/jr Cp pour adulte 2x/jr
Clarithromycine	Zeclar, Claridar Clarital	Susp buv 125mg (25/ml) 250mg (50/ml) Cp 500 mg	

Azithromycine	Zithromax Zomax Binozyt	Susp buv 200mg/ 5ml 360mg/5ml Cp ou gélule : 250, 500 mg	Une seule prise par jour pendant 3 jours. Une heure après les repas
Pristinamycine	Pyostacine	Cp 500 mg	Ad, Enf > 12ans 1 à 2cp 2-3x/jr pendant repas

Association Contre indiqué : **Azithromycine** avec la **Cholcichine** . Médicament utilisé surtout pour le traitement de la Goutte)

Sulfamides

Infections urinaires, digestifs (Diarrhée)

Cotrimoxazole= Trimethoprim+ Sulfamethoxazole	Bactrim Sulprim Diprim Cotrim, Cotrimoxal	Susp buv : 200+40 mg/5ml Cp : 400+80 mg Cp : 800+160mg	2 prises par jour De préférence au cours des repas
--	--	---	--

Quinolones de 2eme génération

ATB tres puissant utilisés dans les cas

severes ; Urogenitale, Pulmonaires, Osseuses, Oculaires,

Ciprofloxacin	Ciprofon, Cilox, Cipro, Ciproflox	Cp : 250- 500mg	*	*1cp 2x/jr
Norfloxacin	Urobacid , Norfloxal	Cp : 400 mg	*Cp	*1 cp 2 x/jr

Les comprimés doivent être pris avec un grand verre d'eau, et ne doivent pas être pris avec du lait ou avec d'autres produits laitiers - **Diminution de l'effet de ce médicament.**

Imidazolé

- Utilisés en association avec d'autres ATb dans les infections suppurées : angines, abcès dentaires, cutanées,...
- Utilisés aussi dans certains cas de diarrhée

Metronidazole	Flagyl, Flazol, Imuzol	Sirop : 125 Cp : 250 - 500	2- 3 prises par jour selo l'age, au milieu des rep:
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Le métronidazol est à la fois , un antibiotique et un antiparasitaire .

Acide fusidique

Anti staphylocoque infections cutanée

Acide fusidique	Fucidine	Sirep, Cp 250	Ad : 2cp 2-3x/jr Ent > 12ans : 1cp 3x/jr *Nrs, Enf < 12ans 1/2 à 1 C à C 2-3x/jr selon le poids pendant les repas
------------------------	----------	---------------	--

Cycline

Infections Uro génitales, Acnée

Doxycycline	Vibramycine, Dotur	Cp 100mg	1 à 2cp /jr
Lymecycline	Tetralysal	Gélules 150 mg	1-2 gélules 1-x/jr

⇒ Pour la **Doxycycline** les comprimés doivent être avalés **au cours du repas** avec un grand verre d'eau et au moins **une heure** avant le coucher.

Il est important de **ne pas s'allonger** ou de **ne pas se coucher** pendant **l'heure** qui suit la prise des comprimés.

* Ces conditions de prise sont à respecter en raison de possibles troubles digestifs, en particulier des **ulcérations de l'œsophage**.

Anti bactériens urinairesréservés seulement aux **infections urinaires**

Fosfomycine + trometamol	Monuril, Uricare	Sachet 3 gramme	Un sachet le matin à jeun (sinon 2 à h avant les repas) en une prise unique.
Nitroxoline	Nibiol Nabyole Naxolin,	Cp 100mg (ad)	1-2 cp 2-3* /r Avant les repas .

Classification des antalgiques

Palier 1	Palier 2	Palier 3
Antalgiques non morphiniques	Antalgiques opioïdes faibles	Antalgiques opioïdes forts
• Paracétamol • AINS	• Codéine • Tramadol	• Morphine
Douleurs faibles à modérées	Douleurs modérées à intenses	Douleurs intenses à très intenses

Palier 1

- **Paracétamol :**
 - ➡ Seule
 - ➡ + Vitamine C
 - ➡ + Caféine
- **AINS = Les anti inflammatoires non stéroïdiens .**

Indication : Douleurs et fièvres . آلام وحمى

Antalgiques : ضد الألم

Antipyretique : ضد الحمى

Paracétamol (PO)

• **En comprimé** : 500mg – 1g

• Dofebril • Dolyc • Doliprane • Paramol • Efferalgan
• Expandol • Dolicrane • Panadol • Paracetamol

• **En suppositoire** : 100mg (3 -8 kg) • **Sécable** • - 150 mg (8-12 kg) -
200mg (12-16 kg) - 300mg (15-24 kg)

• Doliprane • Dolpriv • Parol

• **En sachet (poudre pour suspension buvable)** : 100-200-300-500 mg

• Doliprane • Sapramol

• **En sirop** :

• Efferalgan pédiatrique • Doliprane • Planadix • Dolpriv

• **En stick unidose** :

• Planadix Liquiz

• **Injectable** :

• Paracétamol injectable (Usage hospitalier)

★ Posologie :

○ Pour les enfants avant un poids de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans) : Ne pas dépasser 2 g par jour .

○ Pour les enfants avant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans), **Max 3 g par jour** .

○ Chez les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans) . Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, la posologie maximale peut être augmentée jusqu'à 4 g par jour (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule) .

★ Toujours respecter un intervalle de 4 à 6 heures entre les prises.



Paracétamol + Vitamine C (DCL)

Vitamine C = Acide Ascorbique .

- **Comprimé effervescent** : 500mg/200mg (Paracétamol 500mg / Vit C 200mg)
- Efferalgan Vitamine C .

★ Réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (soit environ à partir de 8 ans).

En raison de la présence de vitamine C, éviter la prise en fin de journée.

⊘ **Contre indiqué** : Au cas de grossesse ou Allaitement .



Paracétamol + Caféine (DCL)

- **Comprimé** : 500mg/65mg (Paracétamol 500mg / Caféine 65mg)
- Panadol Extra • Planadix Extra • Expandol plus .



Palier 2

– Antalgiques opioïdes faibles : pour des douleurs modérées à intenses –

Paracétamol + Codéine (DCL)

• En comprimé : 500mg/30mg - 400mg/20mg :

- Co-Dolyc • Dafalgon Codéine • Planadix confort • Codoliprane
- Coparalgan • Coparamol • CoExpandol

⊘ **Contre-indication** : Allaitement .
Asthme .
Enfant de moins de 15 ans .

Insuffisance respiratoire



Tramadol (DCL)

- En comprimé :
- Supramadol • Dolex • Tramadol
- En Suppositoire : 100 mg
- Tramadol



Paracétamol + Tramadol (PCA)

• En gélule : 325mg/3.75 mg

• Xamadol

• Di-Dolex

• Planadix Advance



Palier 3

– Antalgiques opioïdes forts : pour des douleurs intenses à très intenses –

Buprenorphine (PCA)

• Injectable :

• Buprinal

• Temgesic



Anti Histaminiques

-YouPharm Dz -

★ Un anti histaminique H₁ = Anti allergique .

Un antihistaminique est un médicament qui lutte contre l'action d'une substance naturelle présente dans l'organisme humain : l'**histamine**. Cette molécule est un neuromédiateur sécrété par l'organisme, notamment lors des réactions allergiques. C'est précisément l'histamine qui **déclenche les effets de l'allergie**.

Indications :

- Rhinites allergiques .
- Conjonctivites allergiques.
- Episodes allergiques de la peau avec démangeaisons (manifestations locales après piqures d'insectes, rougeur et urticaire).

DCI	Nom commercial	Forme et dosage
Cyproheptadine	Heptagyl Heptal Lapeti Ciptadine Modestamine Periactine	Cp : 4 mg Sirop ad et enf + 2ans
Méquitazine	Primalan Natazine	Cp : 5-10 mg Sirop ad et enf+ 2 ans
Cétirizine	Artiz Zetirec Zyrtec Rhitene	Cp 10mg Gouttes buvables enf-ad + 2ans : <u>Adultes et enfants de plus de 12 ans :</u> 20 gouttes 1 fois par jour. <u>Enfants de 6 ans à 12 ans :</u> 10 gouttes 2 fois par jour ou 20 gouttes 1 fois par jour. <u>Enfants dès l'âge de 2 ans :</u> 5 gouttes 2 fois par jour ou 10 gouttes fois par jour
Loratadine	Akaryd Allertine Clarityne Loradine Restamine Tirlor	Cp 10 mg Sirop ad+enf +12 ans
Féxofénadine	Telfast Fexodine Rifex	120 mg : indiqué dans le traitement de symptômes de la rhinite allergique saisonnière . 180 mg : indiqué dans le traitement de démangeaisons au cours de l'urticaire.

Kétotifene	Tifen Allerfene Totinal	Cp 1 mg Sirop Nrs + 6mois
Desloratadine	Deslor Loradess Airditine	Cp 5 mg Sirop enf +1 ans
Bilastine	Bilaxtene	Cp 20mg
Dexchlorphéniramine	Histone Histagan Polaramne	Cp 5mg Sirop Nrs-enf-ad
Ebastine	Ebasta	Cp 10mg
Levocetirizine	Xycare Levozen	Cp 5mg
Rupatadine	Rupafen	Cp 10mg

LES GOUTTES

AURICULAIRES



MOHAMED PHARM
0900

ATB + CORTICOÏDES

➡ A/ Polymyxine_B + Néomycine + Fludrocortisone + Lidocaine « DCI »

Traitement local des otites externes d'origine bactérienne à tympan fermé, en particulier **eczéma infecté du conduit auditif externe**.

Posologie : Instiller chaque matin 3 à 6 gouttes dans le conduit auditif de l'oreille atteinte et renouveler l'opération le soir.

La durée du traitement est habituellement de 7 jours

3

Nom_Commercial :

-- PANOTIL®





B / CIPROFLOXACINE (DCI) :

Traitement des otites causées par des germes sensibles à la ciprofloxacine .

- * L'Otite moyenne chronique.
- * L'Otite externe aigue

Posologie : Otite externe aigue : **un récipient /12h pendant 7 jour .**

Otite moyenne chronique : **un récipient /12h pendant 10 jour .**

2

Nom_Commercial :

OTOCINE®



➡ Polymyxine_B + Néomycine + DEXAMÉTHASONE « DCI »

Association d'un **anti-inflammatoire stéroïdien** (dexaméthasone) et de deux **ATB**.

Traitement local des otites externes d'origine bactérienne à tympan fermé, en particulier **eczéma infecté** du conduit auditif externe.

Ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas de perforation tympanique en raison du risque d'ototoxicité.

Posologie : ** ADULT : Installer 1 à 5 gtte → 2*/j pendant 7 jours.

** ENF : Installer 1 à 2 gtte → 2*/j pendant 7 jours .



MOHAMED PHARM



Nom_Commercial :

POLYDEXA®



Conseils d'utilisation :

Tiédifier le flacon au moment de l'emploi en le maintenant quelques minutes dans la paume de la main, afin d'éviter le contact désagréable de la solution froide dans l'oreille.

Instiller, tête penchée, les gouttes dans l'oreille atteinte en tirant à plusieurs reprises sur le pavillon de l'oreille. Maintenir la tête penchée sur le côté pendant environ 5 minutes, afin de faciliter la pénétration des gouttes dans le conduit auditif.

ATB Non Associés

➡ A / RIFAMYCINE (DCI)

Traitement local de certaines otites chez l'adulte et chez l'enfant

Posologie : Adulte : 5 gtte --» 2*/j

Enfant : 3 gtte --» 2*/j

Nom_Commercial :

-- **OTOFA®**



Anesthésique local

➡ PHÉNAZONE + LIDOCAINE « DCI »

Traitement symptomatique local de certains **états douloureux** de l'oreille moyenne à tympan fermé .


Posologie : 4 gtte —» 2 à 3 */j

Ne pas dépasser 10 jours de traitement

Nom_Commercial :

*Principes : — **OTIPAX**

*Generique : — **ORICALM®**



CÉRUMENOLYTIQUE

➡ XYLÈNE « DCI »

Pour dissoudre les **bouchons de cérumen** du conduit auditif.

Posologie :

- ** Bouchons mous : une dizaine de minutes avant le lavage d'oreille.
- ** Bouchons durs : 03 fois par jour les 3 à 4 jours précédant l'extraction du bouchon de cérumen .

Nom_Commercial :

— CERULYSE®



DIVERS

EAU DE MER

Indications : • • Hygiène de l'oreille

• • Fluidifie et dissout progressivement le cérumen .

Nom_Commercial :

HUMEX® STERIMAR® Spray Auriculaire (A ne pas confondre avec le spray nasale)



Posologie et mode d'utilisation :

Humex spray auriculaire : 1 à 2 pulvérisations par jour dans chaque oreille .



Médicaments pour le Rhume et Grippe

- YouPharm Dz -

RHUME**COMMENT
DISTINGUER
LE RHUME****GRIPPE****DE LA GRIPPE ?**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ADOLESCENT DE PLUS DE 15 ANS.

Contre-indication :

- Hypersensibilité paracétamol / pseudoéphédrine
- Enfant – 15 ans
- Antécédent ou risque d'accident vasculaire cérébral (AVC)
- Hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée
- Antécédent de convulsion
- Insuffisance hépatocellulaire sévère
- Allaitement et grossesse .



La durée de traitement ne doit pas dépasser 5 jours .

Paracétamol + Maléate de phéniramine (DCI)

* Humex lib

1 gélule, 1 à 4 fois par jour.



Paracétamol + Acide ascorbique + Maléate de phéniramine (DCI)

* Biovex sachet

* Fervex sachet

1 sachet 2 ou 3 fois par jour.



Phénylpropanolamine 50 mg + chlorphénamine (DCI)

* Gripex gélule .

Adulte et à l'enfant de plus de 12 ans

1 gélule matin et soir



Ibuprofène / pseudoéphédrine chlorhydrate (DCI)

* Gripex plus

* Xydol rhume

1 gélule matin et soir à renouveler si nécessaire au bout de 6 heures .

Au milieu des repas



Paracétamol Et Pseudoéphédrine (DCI)

* DoliRhume

1 comprimés 3 fois par jours .



Paracétamol / caféine / phényléphrine chlorhydrate (dci)

* Panadol rhume

Adulte et à l'enfant de plus de 12 ans

1 comprimés 3 fois par jours



Chlorhydrate de triprolidine + Chlorhydrate de pseudoéphédrine +
Paracétamol (dci)

* Rhumafed

1 comprimés 1 à 3 fois par jours



Paracetamol/phenylephrine/pheniramine/cafeine (dci)

* Rynza sachet

