

TRINITRINE (LENTRAL , NITROGLYCERINE)

Indications : OAP, syndrome de menace, IDM.

Contre- indications : hypotension(surtout IDM inférieur).

Posologie : ampoule 3mg/2ml et 15mg/10ml

- ✓ 0.5 à 3mg/H au PSE.
- ✓ En cas d'OAP hypertensif, possibilité d'injecter une dose de charge de 1 à 3mg en IVD, à renouveler éventuellement 10minutes plus tard.
- ✓ Dilution dans G5% ou sérum physiologique.
- ✓ Utiliser toujours le même type de dilution afin de pouvoir modifier la posologie facilement.

VALPROATE DE SODIUM (DEPAKINE)

Indication : état de mal épileptique.

Contre-indications : affections hépatiques, allergie au Valproate de sodium.

Posologie : lyophilisat 400mg et ampoule de 4ml de solvant.

- ✓ Bolus de 15mg/kg en IV lente sur 3minutes puis relais au PSE à 1mg/kg/H, à adapter secondairement aux dosages sanguins (75mg/l).
- ✓ Dilution dans du sérum physiologique.

PROPRANOLOL (ALVOCARDYL)

Indications : troubles du rythme supra-ventriculaire (en particulier dans la crise aiguë thyrotoxisque).

Contre-indications : asthme, insuffisance cardiaque, BAV, maladie de l'oreillette, association à la Cordarone.

Posologie : ampoule de 5mg/5ml

- ✓ 0.5 à 1mg en IVD toutes les 02minutes jusqu'à effet (maximum 10mg).
- ✓ Dilution dans du sérum glucosé ou physiologique.
- ✓ Pas d'injection trop rapide car risque de bradycardie.

TERBUTALINE (BRICANYL)

Indications : crise d'asthme, dyspnée spastique chez les insuffisants respiratoires chroniques, hyperkaliémie.

Contre-indication : affection coronarienne aiguë.

Posologie : ampoule = 0.5mg/1ml. Dosette = 5mg/2ml.

- ✓ SC = 1ampoule.
- ✓ IV = ½ à 1ampoule en IV lente (5minutes) puis relais au PSE à la dose de 0.1 à 1µg/kg/minute.
- ✓ Aérosol : nébulisation avec 6-8L d'O2 en 5 à 10minutes de ventoline ; 5-10mg (1-2ml) ou Bricanyl 5 à 10mg (2-4ml) plus Atrovent 0.5mg/2ml uniquement à la 1^{ère} nébulisation.

VITAMINE K1 (KONAKION)

Indication : surdosage aux AVK.

Contre-indication : allergie à la vitamine K.

Posologie : ampoule 10mg/1ml.

- ✓ 10mg en IV lent.
- ✓ Compatible avec le sérum glucosé et le sérum physiologique.

ACUPAN (NEFOPAM)

Indications : antalgique non morphinique d'action centrale (activité antalgique comparable à celle de 10mg de morphine en IM).

Contre- indications : convulsions et ATCD de convulsions, glaucome, adénome de prostate et enfant de moins de 15ans.

Posologie : ampoule de 20mg/2ml.

- ✓ 1 ampoule en IM ou en IV lente (injection en 5minutes minimum).
- ✓ A répéter si besoin toutes les 4 à 6 heures.
- ✓ Administrer chez un sujet couché.
- ✓ Diluer dans G5% ou sérum physiologique.

ISOPRENALINE (ISUPREL)

Indications : BAV du 3^{ème} degré en attente d'appareillage.

Contre-indications : insuffisance coronaire aiguë et en particulier l'infarctus.

Posologie : ampoule 0.2mg/ml

- ✓ 5ampoules (1mg) dans 250 ml de sérum glucosé à 5% et régler le débit en fonction de la F.C.
- ✓ conservation à l'abri de la lumière.

PHENOBARBITAL (GARDENAL)

Indications : état de mal convulsif résistant aux BZD, particulièrement chez l'enfant.

Contre-indication : porphyries.

Posologie : flacon poudre + solvant 40mg/ 2ml.

- ✓ 10 à 20mg/kg en IV lente sur 15minutes.
- ✓ Dilution dans du sérum physiologique.

NICARDIPINE (LOXEN)

Indications : urgences hypertensives, pré- éclampsie, dissection aortique.

Contre- indications : allergie connue au produit.

Posologie : ampoule de 5mg/5ml et 10mg/10ml.

- ✓ 2.5mg en IV en 5minutes, attendre 5minutes pour renouveler, si nécessaire, cette séquence jusqu'à un maximum de 10mg.
- ✓ Relais au P.S.E à la dose de 2 à 4mg/Heure à adapter par palier de 0.5mg/Heure.
- ✓ Précipitation avec les produits présentant un pH > 6 (solutions bicarbonatés, Lasilix, Valium).
- ✓ Dilution dans du sérum glucosé (ne pas utiliser de solution saline car risque d'absorption du produit sur les matériaux plastiques de la tubulaire.

METHYLPREDNISLONE (SOLUMEDROL)

Indications : réactions allergiques graves, asthme aigu grave.

Contre- indications : pas de CI en urgence.

Posologie : flacons de 20-40-80 et 120mg + solvant de 2ml.

- ✓ 1-2mg/kg en IV lent sur 5 à 10 minutes.
- ✓ Traumatismes médullaires : 30mg/kg/45minutes puis 5.4mg/kg/Heure pendant les 23 heures restantes (avant 8heures post – traumatisme).
- ✓ Dilution dans du sérum glucosé ou sérum physiologique.
- ✓ Ne pas injecter trop rapidement.

ADRENALINE

Indications : arrêt cardiaque, choc anaphylactique et autres états de choc, asthme aigu grave.

Contre- indications : insuffisance coronaire, troubles du rythme ventriculaire, cardiomyopathie obstructive.

Posologie :

Arrêt cardiaque :

- ✓ Adulte = 1mg en IV ou 3mg en intra- trachéal(dilution dans 10ml de sérum physiologique).
- ✓ Enfant = 10µg à 30µg en intra- trachéal à renouveler toute les 03 à 05minutes.

Choc anaphylactique :

- ✓ 1mg dilué dans 10ml de sérum physiologique à injecter ml par ml.

Autres états de choc : débiter à 0.01µg/kg/minute en IV puis augmenter progressivement en fonction de l'état hémodynamique.

Asthme aigu grave : 0.01 à 1µg/kg/min en IV

N.B :

- ✓ Ne jamais diluer ou injecter dans une solutés alcalines.
- ✓ Compatible avec le G5% et le sérum physiologique.

DOBUTAMINE

Indication : syndrome du bas débit cardiaque.

Contre-indication : obstacle à l'éjection(cardiomyopathie obstructive, valvulopathie aortique, tamponnade).

Posologie : flacon 250 mg/20ml → 2.5 à 20 µg/kg/minute.

- ✓ Ne pas être dilué que dans du G5% ou du sérum salé.
- ✓ Ne pas arrêter brutalement une perfusion mais diminuer progressivement les doses.
- ✓ Règle de dilution pratique = Poids * 3 = dose en mg à diluer dans 50ml, on obtient ainsi 1ml / H = 1µg/kg/minute.

DOPAMINE

Indications : correction des troubles hémodynamiques de l'état de choc, l'effet est variable en fonction des doses :

< 5µg/kg/min améliore la perfusion rénale.

> 5 à 20µg/kg/min améliore la contractilité cardiaque.

> 20 µg/ kg/ min = vaso constriction.

Contre- indications : troubles du rythme ventriculaire, cardiomyopathie obstructives.

Posologie : ampoule 200mg/ 5ml ou 50 mg/ 5ml.

- ✓ 2 à 20 µg/kg/min
- ✓ ne pas diluer avec des solutions alcalines.
- ✓ Ne pas arrêter brutalement une perfusion mais diminuer progressivement les doses.
- ✓ Même règle de dilution que pour le Dobutrex.

HEPARINE RAPIDE

Indications : situations nécessitant une anti- coagulation efficace (phlébite, embolie, infarctus).

Contre- indications : antécédent de thrombopénie sous héparine, lésions susceptibles de saigner.

Posologie :

- ✓ Flacon de 5ml à la concentration de 5000 UI/ml
- ✓ En moyenne = 400 à 600 UI/kg/24heures au P.S.E (parfois dose de charge de 5000 UI en IV direct). La posologie sera adapté en fonction des résultats d'hémostase.

Conseils pratiques : ne pas associer d'autres produits dans la même perfusion car il existe des risques d'incompatibilité.

Surveillance : prélever un dosage des plaquettes et une hémostase avant la mise en route du traitement, répéter le dosage 04heures après son début afin d'adapter la posologie.

Effets secondaires : thrombopénie, hémorragie.

HYDROXYZINE (ATARAX)

Indications : tranquillisant (anxiété, crises d'agitation), anti-histaminique H1 (allergie), tachycardie de type Bauvert.

Contre- indications : glaucome, adénome de prostate, grossesse au 1^{er} trimestre.

Posologie :

- ✓ IM = 50 à 100mg
- ✓ IV = 50 à 100mg dilués dans 10ml de sérum physiologique à injecter en 05minutes.

Conseils pratiques : injection IV stricte et lente du produit dilué afin d'éviter une hémolyse.

TEMGESIC

- ✓ **Indication** : antalgique morphinique.
- ✓ **Contre- indication** : 1/ intoxication éthylique. 2/ Insuffisance respiratoire. 3/ insuffisance hépatocellulaire. 4/ âge < 15ans.
- ✓ **Posologie** : 1 ampoule en S/C, IM ou IV ou 1cp en sublingual.
- ✓ **Conseils pratiques** : ne pas associer à d'autres morphiniques.

MORPHINE

- ✓ **Indications** : douleurs résistantes aux autres antalgiques.
- ✓ **Contre-indications** : 1/ TC grave en l'absence de ventilation contrôlée. 2/ IHC sévère.
- ✓ **Posologie** : ampoule 10mg/1ml. → 0.1mg/kg en SC ou en IV. → si insuffisant compléter par des bolus de 1mg/5 à 10minutes jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité.
- ✓ **Conseils pratiques** : conserver les ampoules vides.

MEDICAMENTS DE L'URGENCE

ASPEGIC

Indications : antipyrétique, antalgique, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire (IDM et syndrome de menace).

Contre-indications : allergie à l'aspirine, maladie ulcéreuse, risque hémorragique, 3^{ème} T de la grossesse, virose.

Posologie :

- ✓ Adulte= 0.5 à 1g en IV. anti- agrégant plaquettaire 250 mg en IV.
- ✓ Enfant= 10 à 25mg/kg/jour en six injections.
- ✓ Diluer dans du G5% ou sérum physiologique.
- ✓ Ne pas mélanger avec d'autres produits.

ZOVIRAX

Indication : méningite herpétique.

Posologie :

- ✓ 30 mg/kg/24 heures en trois perfusions.
- ✓ Perfusion de une heure minimum dans un volume de dilution de 50 à 100ml de sérum salé.
- ✓ Adapter la posologie en cas d'insuffisance rénale.

FUROSEMIDE

Indications : O.A.P, hyperkaliémie et hypercalcémie aiguës.

Contre- indications : obstacle sur les voies urinaires, encéphalopathie hépatique, troubles hydro- électrolytiques non corrigés.

Posologie : ampoule = 20mg/2ml

- ✓ 20 à 80mg en IVD
- ✓ précipitation en cas d'injection dans une solution acide.

HYDROCORTISONE

Indications : asthme aigu grave, œdème de Quincke, oedèmes laryngés.

Contre- indications : il n'y en a pas en situation d'urgence.

Posologie :

- ✓ Adulte = 100 à 200mg en IV.
- ✓ Enfant = 5mg/kg
- ✓ Conseils pratiques = dilution possible dans du sérum physiologique ou sérum glucosé(le délai de perfusion ne doit excéder 04heures.

CORDARONE

✓ **Indication** : troubles du rythme supra- ventriculaire.

✓ **Contre-indications** :

Troubles de la conduction (bradycardie, blocs sino-auriculaires, auriculo-ventriculaire) , collapsus cardio- vasculaire, allergie à l'iode.

✓ **Posologie** :

- 5mg/kg en IV sur 15 à 30minutes puis relais au PSE à la dose 1 ampoule sur 08 heures.
- La voie IV est réservée aux situations d'urgence en cas d'échec des autres alternatives thérapeutique et ne doit jamais se faire en IV rapide.
- Utiliser exclusivement du G5% sans adjonction d'autres produits.

ATROPINE

✓ **Indications** : 1/ bradycardie sinusale et BAV, notamment à la phase aiguë des IDM postérieurs. 2/ douleurs aiguë spasmodiques (colique néphrétique, biliaire et digestive). 3/ antidote pour organophosphorés.

✓ **Contre-indications** : 1/ glaucome. 2/ adénome de prostate. 3/ insuffisance cardiaque, tachycardie.

✓ **Posologie** : ½ à 1mg en IV lente (0.5minutes).

✓ **Conseils pratiques** : antidote = 1mg en IM ou IV à répéter toutes les 5 à 10 minutes jusqu'à apparition d'une dilatation pupillaire et arrêt de la sécrétion salivaire et de la transpiration.

DIAZEPAM

Indications : 1/ crise convulsive. 2/ agitation, angoisse. 3/ delirium tremens. 3/ intoxication à la chloroquine.

Contre-indications : 1/ insuffisance respiratoire. 2/ myasthénie.

Posologie : ampoule = 10mg/2ml.

✓ Convulsions :

Adulte : 10 à 20mg en IV lente (1mg/minute) jusqu'à l'arrêt des convulsions.

Enfant = 0.5mg/kg en IR à renouveler si besoin.

✓ Intoxication à la chloroquine = 2mg/kg en IV lent puis relais 2 à 4mg/ kg/ 24 heures.

✓ Autres indications : 5 à 20 mg en IV lent.

NB : injection dans une grande veine.

FLUMAZENIL (ANEXATE)

✓ **Indication** : antidote dans les surdosages aux BZD.

✓ **Contre-indications** : 1/ épilepsie. 2/ intoxication poly médicamenteuse.

✓ **Posologie** : ampoule de 0.5mg/5ml et 1mg/1ml.

0.2 à 0.3 mg /minute en IV jusqu'au réveil complet (dose maximale = 2mg).

Relais au PSE à la dose de 0.1 à 0.4mg / Heure.