

Les Anti Anémiques

-YouPharm Dz -

Le FER

Traitement curatif : Anémie par carence en fer (Anémie ferriprive) .

Traitement préventif : Traitement préventif de la carence en fer de la femme enceinte lorsque les apports alimentaires sont insuffisants . et chez les prématurés .

Dei : Sulfate ferreux	Tardyferon	Cp 80mg
Dei : Fumarate ferreux	Fumafer, Fumacur	Cp 200mg
Dei : Gluconate ferreux +manganèse+ Cuivre	Tothema	Amp buv 50mg
Dei : Férédetate ferreux	Ferrostrane, Ferrolam	Sirop 34mg/5ml
Dei : Hydroxyde ferrique	Ferrum Selofer Orofer	Gttes : 50mg/ml Sirop : 50, 100mg/5ml
	FER+3	Amp buva * 100mg /amp
	Venofer	Inj IV *100mg/ inj



- La prise du fer se fait **de préférence au milieu des repas** pour éviter les effets indésirables digestifs (douleurs de l'estomac, nausées, vomissement, constipation,...)
- Le fer peut causer un noircissement des dents (sirop, gouttes) chez l'enfant, il est nécessaire de boire de l'eau après la prise du fer ;
- **La vitamine C augmente** l'absorption du fer
- La consommation des **produits laitiers** (Riche en calcium) et des boissons ou d'aliments riche en **caféine** (thé, café, chocolat) **réduit** l'absorption du fer.

ACIDE FOLIQUE : Vitamine B9

Traitement curatif :

Anémie par carence en acide folique .

Traitement préventif :

Chez la **femme enceinte** : prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural du fœtus , en particulier de spina bifida qui correspond à un développement incomplet de la colonne vertébrale. Les risques de très graves malformations comme l'anencéphalie (malformations du cerveau et du crâne) sont également grandement diminués .

➡ 1 cp / jr

Chez les **patients sous Méthotrexate** (Un médicament couramment prescrit pour traiter l'arthrite rhumatoïde , psoriasis étendus et sévères , quelques types de cancer) .

➡ Généralement ; 1 cp par semaine .

Dci : Acide Folique (Folate)	Zanitra - Fonitra	Cp 5mg 
--------------------------------------	--------------------------	--

Association FER + Acide Folique B9

Traitement préventif : Anémie ferriprive chez : femme enceinte, après accouchement ,, malnutri, post opératoire, règles abondantes chez la femme.

➡ 1 cp / jr

Sulfate ferreux + Acide folique	Tardyferon B9 Zanitra plus	Cp : 50 mg + 0,35 : 50 mg + 0,5
Complexe glycine sulfate ferreux + acide folique	Ferrosanol Gyn	Gélule : 80 + 1mg
Hydroxyde ferrique + Acide folique	Selofer fol Novofer-plus, Trifer-Fol	Cp / Cp à sucer : 100 + 0,35



Vitamine B12 (Cobamine)

• **Par voie injectable IM** : pour combler les déficits en vitamine B12 que l'organisme n'absorbe plus, chez les personnes souffrant de la maladie de Biermer ou ayant subi l'ablation de l'estomac ou d'une partie de l'intestin.

➡ **Traitement d'attaque** : 1 ampoule par jour pendant 10 jours ou 1 ampoule 3 fois par semaine pendant un peu plus de 3 semaines, soit 10 ampoules au total.

➡ Puis, en **traitement d'entretien** : une ampoule par mois.

• **Par voie orale (ampoule buvable)** pour traiter les anémies (diminution du nombre de globules rouges dans le sang) causées par une alimentation pauvre en vitamine B12 chez les personnes suivant un régime alimentaire sans viande, laitage, œuf ou poisson depuis plus de 4 ans (végétaliens stricts).

➡ **Traitement d'attaque** : 1 ampoule par jour pendant 15 jours à 1 mois .

➡ Puis, en **traitement d'entretien** : 1 ampoule tous les 10 jours.

(versez le contenu de l'ampoule dans un verre d'eau)

- **La vitamine B12 peut être prescrite chez les patients qui prennent de la metformine (médicaments antidiabétique)** : L'administration de metformine s'accompagne d'une diminution du taux de vitamine B12, et induisant le patient à des risques de déficit en cette vitamine suite à son utilisation prolongée, avec des conséquences potentielles telles l'anémie, la neuropathie, et la démence..

Cyanocobalamine

Vit B12, Cobamine, Cobavit

Amp Injectable IM et/ou buvable



Conseils et précautions d'emploi

- Le diagnostic de l'anémie se fait après examens clinique ou à l'aide des analyses biologiques (FNS, Fer sérique, Ferritine,...)
- Les formes galéniques pour l'adulte : Cp, gélules, Amp buvable, inj IV
- Les formes galéniques pour enfants et nourrissons : Sirop, Gouttes

• **Méthotrexate et acide folique** Le corps humain a besoin de folates pour effectuer de nombreuses fonctions, y compris la division cellulaire, la croissance et la production de nouveaux globules rouges.

Le **Méthotrexate** (un médicament couramment prescrit pour traiter l'arthrite rhumatoïde) agit en bloquant **certains des effets de l'acide folique**. Une carence en folates peut entraîner des effets secondaires tels que des ulcères dans la bouche, des problèmes d'estomac comme des nausées ou des douleurs abdominales, des problèmes de foie ou des problèmes avec la production de globules. Ces effets secondaires sont parfois tellement gênants qu'ils amènent les patients à arrêter la prise de MTX (abandon de traitement) .