

A) Beta lactamines ou Antibiotiques betalactames(Famille) :

1)Amoxicilline(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(sphere ORL: ~~Otite-Sinusite-pharyngite~~ ; Angine ; Toux grasse)
- Abcès dentaire
- Cas postopératoire(comme prévention)
- infection digestif(Ulcère gastrique)

FDP :

-CP, gel { 500mg : (Enf+12ans)
1g : Ad } → 1cp → 2 → 3*/jour

-SP { 125mg : NRS
250mg : Enf(2 → 6ans)
500mg : Enf(6 → 12ans) } → 1C a M → 2 → 3*/jour

-INJ { 500mg : (Enf+12ans)
1g : Ad } → 1inj en IM/jour(N7 → N10)

NC : Clamoxyl ; amoxypen ; Amodexgé ; Biopamox ; Amoximex ; lamoxyl ; Saiffoxyl ; Penamax

2)Ampicilline(DCI) :

Ind :

- Infection urogénital(++++)
- infection respiratoire
- cas post-opératoire

FDP :

- gel 500mg { Enf+12ans:1gel---2 → 3*/jour
Ad :2gel---2 → 3*/jour

-SP 250mg :Enf(2-6ans) :1C a M---2 → 3*/jour

-INj 1g :Ad---1inj en IM/jour

NC :Totapen ;Ampal ;Ampilline ;Ampinax

3) « Amoxicilline+Acide clavulanique »(DCI) :

Ind :

-Infection respiratoire aigue(Bronchite,sphere ORL,Angine)

-Abcet dentaire

-Infection urinaire

FDP { 500mg :(Enf+12ans)
-CP { 1g : Ad } } 1cp---2 → 3*/jour

-ST { 500mg :Enf
1g : Ad } } 1sac---2 → 3*/jour

-SP { NRS
Enf } } 1ddp---2 → 3*/jour

NB :concernent les SP(NRS,Enf),il ya aucune différence entre eux, sauf dans la quantité(30ml vs 60ml ou 35ml vs 70ml);donc ,on peut donner le SP de NRS a l'Enf et vice versa, en considération du poids du malade

NC :Augmentin ;Augmentimex ;Klavox ;Amoclan BID ;Amoclan 8 :1 ;Bioclav ;clavodar

4)Oxacilline(DCI) :

Ind :

-Infection cutanée(plais,Abcet cutanée)

FDP : $\left. \begin{array}{l} \text{Enf+12ans :1gel} \\ \text{-gel} \\ \text{Ad : 2gel} \end{array} \right\} 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

-INJ $\left[\begin{array}{l} 500\text{mg} \\ 1\text{g} \end{array} \right] \text{Ad :1inj en IM/jour}$

NC :Bristopen ;Oxacil ;Oxaline ;Oxal ;Oxcare

5)Phenoxyl-Methyl-Penicilline « PMP »(DCI) :

Ind :

-Angine(traitement pde 10 jours)

FDP : $\left. \begin{array}{l} 1\text{MUI : (Enf+12ans)} \\ \text{-CP} \\ 1,5\text{MUI :Ad} \end{array} \right\} 1\text{cp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

-SP $\left\{ \begin{array}{l} 250\ 000\text{UI : (Enf+3ans) :1C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour} \\ 400\ 000\text{UI (très rare)} \end{array} \right.$

-INJ $\left. \begin{array}{l} 500\ 000\text{UI :Enf} \\ 1\text{MUI :Ad} \end{array} \right\} 1\text{inj en IM/jour}$

NC : Ospan ; Orapen ; Penival ; gectapen

6) Benzathine penicilline(DCI) :

Ind :

-Angine(effet retard :traitement peut atteindre 5 mois)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 600\ 000\text{UI} : \text{Enf} \\ 1,2\text{MUI} : \text{Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{inj}/21\text{jours}(\text{on a dit : effet retard,,,N}^{\circ}07 \text{ « presque 4 mois »)}$

NC : Extencine ; Extencilline ; Retarcilline ; Retarmex ; Retarpen

B) Les céphalosporines(Famille) :

1) Cefalexine(DCI) :

Ind :

-infection respiratoire(sphere ORL ; Angine ; Bronchite)

-cas post-opératoire(++++)

-infection urogénital

-infection dermatologique (varicelle « بوشوكة »)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf}+12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{cp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

-SP : $\left\{ \begin{array}{l} 125\text{mg} : \text{NRS} \\ 250\text{mg} : \text{Enf} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

NC : Keforel ; lexinal ; lexin ; cephalax ; Cephadar ; Cefadat ; Ospexin ; ulexin

2)Céfazoline(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(sphere ORL ;Angine ;Bronchite)
- cas post-opératoire
- infection urogénital
- infection dermatologique (varicelle « بوشوكة »)

FDP :

-**INJ** 1g :Ad---1inj en IM/jour ;;;**NB** :(le seul céphalosporine qui est sous forme injectable)

NC :Cefazoline ;Intrazoline ;Zopelin ;Cefazoline sandoz ;Hikma Cefazoline

3)Cefaclore(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(Bronchite aigue seulement++++)
- infection urinaire

FDP :

-**CP** 500mg :Ad :2CP---2 →3*/jour

-**SP** { $\begin{array}{l} 125\text{mg :NRS} \\ 250\text{mg :Enf} \end{array} \right\} 1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

NC :Tabiclor ;Dicef ;Cloracef

4)Cefuroxime(DCI) :

-Ind :

- infection respiratoire(Bronchite aigue seulement++++)
- infection urinaire

FDP : 250mg
-CP } 500mg } Ad : 1cp---2→3*/jour

-SP 125mg : NRS : 1ddp---2→3*/jour

NC : Zinnat ; Zinoximor ; Daroxine

5) Cefexime (DCI) :

Ind :

-Infection urinaire(++++)

-Infection respiratoire (Angine, Bronchite)

FDP : 200mg
-CP } 400mg } Ad : posologie selon le cas

-SP } 40mg : NRS
 } 100mg : Enf } posologie selon le cas

NC : Oroken ; Winex ; Belexin ; Orokal

C) Macrolides (Famille) :

1) Spiramycine (DCI) :

Ind :

-Abcès dentaire(++++)

FDP : 1,5MUI : (Enf+12ans)
-CP } 3MUI : Ad } 1cp---2*/jour

-SP Enf :1C a M--2 3*/jour

NC :Rovamycine ;Spira ;Spiracare ;Spiramycil ;Rovadal

2) « Spiramycine+Metronidazole »(DCI) :

Ind :

-Infection de la cavité buccale(abcet dentaire,infection de la gencive ;Stomatite)

FDP : $\left[\begin{array}{l} 750\ 000\text{UI :Enf} \\ 1,5\text{MUI : Ad} \end{array} \right]$

-CP $\left. \begin{array}{l} \text{---} \end{array} \right\} 1\text{cp} \text{---} 2^*/\text{jour}$

NC :Orogyl ;Bi-orogyl

3)Azithromycine(DCI) :

Ind :

-Infection respiratoire(Angine;Bronchite++++)

FDP : $\left[\begin{array}{l} 250\text{mg :Enf(boite de 6cps)} \\ 500\text{mg :Ad(boite de 3cps)} \end{array} \right]$

-CP $\left. \begin{array}{l} \text{---} \end{array} \right\} 1\text{cp/jour} \text{---} \text{pendant 3 jours}$

-SP 200mg $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS : «(1/2) CaM=2,5ml»/jour} \text{---} \text{pendant 3 jours} \\ \text{Enf : «1CaM=5ml»/jour} \text{---} \text{pendant 3 jours} \end{array} \right.$

NC :Zomax ;Zithromax ;Azithral ;Binozyt ;Zotrix ;Azimycine

4)Roxithromycine(DCI) :

Ind :

-infection respiratoire(pneumopathie)

FDP :

-CP 150mg :Ad :1cp---2 → 3*/jour(pdte 10 jours)

NC :Roxid ;Roxamed

5)Clarithromycine(DCI) :

Ind :

-Infection respiratoire(toute les inection respiratoires)

-Abcet dentaire

-Infection dermatologique

-Infection digestif(ulcère gastrique)

FDP { 250mg }
-CP { 500mg } } Ad :posologie selon le cas

-SP { 125mg :NRS }
 { 250mg :Enf } } posologie selon le cas

NC :Clarit ;Zeclar ;Claridar ;Clarital


6)Josamycine(DCI) :

Ind :

-Infections respiratoires(toute les infections respiratoires)

FDP :

-CP 500mg :Ad :1cp---2*/jour



NC :il existe un seul nc qui est :**Josacine**

D)Aminoside(Famille) :gentamycine

Ind :

- Infection urogénital
- Abcet dentaire
- cas post-opératoire
- Infection rénale




NC :gental ;gentamycine ;gentaxyn ;epigent ;gentalline

E)Quinolone(Famille) :

Ind :

- Pied diabétique(++++)
- Infectionurogénital
- cas post-opératoire
- Otite chronique



NC :Ciprolan ;Cipro-quinox ;Ciproval ;Cipromax(le **DCI** est :Ciprofloxacin)

F)Tetracycline(Famille) :

Ind :

-Infection légère de la peau(surtout pour «l'**acné**=حب الشباب »)

F-1)Doxycycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 100mg :1cp---1→2*/jour

NC :Vibramycine N ;Dotur

F-2)Oxytetracycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 250mg :posologie selon le cas

NC :Oxymed

F-3)Lymécycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 150mg :posologie selon le cas

NC :Tetra lysal

G)Fucidamine(Famille) :

-Acide fucidique(DCI) :

Ind :

-Infection cutané compliquée(Plaies ;Abcès cutané ;cas post-opératoire ;Pied diabétique++)

FDP :

-**CP** 250mg :Ad :2cp---2→3*/jour—**NC** :Fucidine

-**SP** 250mg :Enf :1C à M—2 → 3*/jour—**NC** :Fucidine

-**Pde** pour tout :1app le soir—**NC** :Fucidine ;Zeta ;Fucidame ;Acifudal

Autres antibiotiques :

-**Nitroxoline(DCI)** :n'a pas une famille=un DCI à seul :

Ind :

-Infection urinaire(seulement)

FDP : { 50mg(ne plus existe pour l'instant)

-**CP** {
100mg :Ad :2cp---2→3*/jour

NC :Naxolin ;Nibiol ;Nibyol forte

-**Cedroxyl** :**CP** 1g :posologie selon le cas

-**Pyostacine** :**CP** 500mg : posologie selon le cas

-**Omnicef « céfdénir(DCI)** : {
CP 300mg
SP 125mg } posologie selon le cas

-**Aciclovir(DCI)** : {
CP 200mg
Pde(5pour 100) } posologie selon le cas

Ind : (الحب لي يدير على الشوارب والنيف أحياناً) مدوها للي تبوسو الحمة:

NC :Clovirax(crème dermique) ;Viravir(crème dermique) ;clovir(CP)