

# DOPAMINE

**DOPAMINE® :**

Ampoules 200mg/5ml ; 50mg/10ml

-Précurseur des catécholamines, Catécholamine  
sympathomimétique

-Actions : dose dépendante

- DA rénaux, mésentériques:  $< 5 \mu / \text{kg} / \text{min}$
- Beta 1 + :  $5 \text{ à } 10 \mu / \text{kg} / \text{min}$
- Alpha + :  $> 10 \mu / \text{kg} / \text{min}$

- Indications:

-états de choc

-IRA oligo-anurique

**Dr YASSINE.B**

# GARDENAL

phénobarbital GARDENAL® :

*solution injectable à 40 mg/2 ml*

-Action thérapeutique : Anticonvulsivant, sédatif, hypnotique

-Indications: épilepsies généralisées ou partielles

-Posologie : Voie IM ou IVL.

- Adulte : 10 mg/kg/j
- Enfant : 20 à 40 mg/j
- NRS : 10 à 20 mg/j

-Contre-indications :

- insuffisance respiratoire sévère.
- Porphyrries.
- Antécédents d'hypersensibilité aux barbituriques

-Effets secondaires :

- Somnolence, allergies, vertiges.
- Confusion mentale, troubles mnésiques

**Dr YASSINE.B**

# **BRICANYL**

Sulfate de terbutaline **BRICANYL®** :

Ampoules 0,5 mg/1 ml

-Actions :

- Action  $\beta_2$  sur les muscles lisses bronchiques => bronchodilatation
- utérorelaxation

-Posologie et indication :

01-Nébulisation : en 1ère intention dans l'Asthme Aigu Grave, associé à l'Atrovent

02-IV lente :  $\frac{1}{2}$  à 1 amp / 60 Kg

03- SC:

-Adulte : 1/2 à 1 amp / 6h

-Enfant : 10  $\mu$ /kg (1/4 amp pour 15 kg)

**Dr YASSINE.B**

# **VENTOLINE**

## **VENTOLINE® aérosol**

-Bronchodilatateur

- Action stimulante et prolongée sur les récepteurs Bêta 2 des muscles lisses bronchiques

### -Indications :

- Crise d'asthme sévère
- Bronchopneumopathies chroniques obstructives

### -Contre-indications :

allergie

### -Posologies :

1 à 2 bouffées répétées 1 à 2 fois

**Dr YASSINE.B**

# **SOLU-MEDROL**

**Méthylprédnisolone SOLU-MEDROL®**

**flacons 20, 40, 120 mg**

**-Corticoïde de synthèse, effets anti-inflammatoire 5 X plus puissant que**

**l'hydrocortisone**

**-Indications :**

- **Réaction allergique, oedème de Quincke**
- **OEdème laryngé, laryngite suffocante, épiglottite**
- **Crise d'asthme**
- **Crise d'insuffisance respiratoire**
- **Réactions inflammatoires**
- **Traumatisme du rachis**

**-Posologies :**

- **Asthme et épiglottite : 1 à 2 mg/Kg IV lente**
- **Choc anaphylactique et TC jusqu'à 30 mg/Kg**

**-Effets secondaires :**

- \* **Allergie**
- \* **Hyper ou hypotension artérielle, insuffisance cardiaque**
- \* **Arythmie si IV trop rapide**
- \* **Ulcères gastroduodénaux, hémorragie digestive**

# **ISUPREL**

**Isoprénaline ISUPREL®** : Ampoules 0,2mg/ml

-Sympathomimétique de synthèse

- Beta 1 stimulant: effet dromotrope +
- Beta 2 stimulant: minime

-Indications

- Bradycardie par BAV de haut degré
- Torsade de pointe

-Posologie:

- 0,01 à 0.1  $\mu$ /kg/mn ou
- 05 amp dans 250 ml SG5% = 5 à 20 gtte/mn

**Dr YASSINE.B**

# ATROVENT

## ATROVENT® :

unidos 0,5 mg / 2ml adulte,

unidos 0,25 mg / 2 ml enfant

## -Indications :

- Crise d'asthme
- État de mal asthmatique
- Décompensation spastique BPCO

## -Posologies :

-*Adulte* : 1 récipient / 5ml aérosol

-*Enfant* : 1 récipient / 4ml aérosol

# NORADRENALINE

Norépinéphrine NORADRENALINE® :

Ampoules 8mg/ 4ml

-Catécholamine sympathomimétique

- Alpha + puissant vasoconstricteur
- Beta 1+ faible

- Indication:

états de choc : 0,5 ~ 3  $\mu$ /K/mn



# **LENITRAL**

**NITROCINE® LENITRAL® :**

**ampoules 10 mg/ 10 ml**

**-Dérivé nitré :**

- **antiangineux**
- **Vasodilatateur coronaire**
- **Vasodilatateur veineux**

**- Indications :**

- **Angor instable, Infarctus du myocarde**
- **OAP, HTA systolique**

**-Posologie:**

**1-3mg/h en PSE**

**- Contre-indications :**

- **Hypotension artérielle sévère**
- **Insuffisance ventriculaire droite aigue**

**Dr YASSINE.B**

# **SALBUTAMOL**

**Salbutamol SALBUTAMOL®**

ampoules 0.5mg/1ml , 5mg/5ml

-Bêta 2 + : bronchodilatation et utéro-relaxation

Délai d'action : 5 mn IV, 20 mn S/C

Durée d'action : 3 à 4 h

-Indications :

- Bronchospasme sévère
- Crise d'asthme sévère, état de mal asthmatique
- Menace d'accouchement prématuré

-Contre-indications :

- IDM aigu, angor instable, insuffisance coronarienne

-Posologies (asthme) :

- 0,25 à 1,5 mg /h au PSE
- Dilution 2 amp / 50 ml

-Effets secondaires : Tachycardie, hypotension artérielle,

Agitations, vertiges, nausées

**Dr YASSINE.B**

# LOXEN

**Nicardipine LOXEN® :**

Ampoules 10mg/10ml

-Antihypertenseur, inhibiteur calcique, Vasodilatateur artériel

-Indication:

urgences hypertensives

-Posologie:

- Dose de charge: 1mg IVL toute 03mn
- Dose d'entretien: 1 à 6 mg/h en PSE
- Chez l'enfant: 0,5 à 3 mg/kg/24h

**Dr YASSINE.B**

# **LASILIX**

**Furoséide LASILIX ® : ampoule 20mg/2 ml**

## **-Effets :**

- **Diurétique de l'anse de Henlé, d'action brève et puissante.**
- **Inhibe la réabsorption du Na et Cl**
- **Effet calciurétique important**

## **-Indications :**

- **OAP, Insuffisance cardiaque**
- **Poussée hypertensive**
- **Rétentions hydro sodées**
- **Néphropathie**
- **Hypercalcémie aiguë**

**-Posologie : 0,5 à 2 mg / Kg / j**

**-Délai d'action : 5 mn, Durée d'action : 2 à 3 h**

## **-Contre -indications :**

- **Hypersensibilité aux sulfamides**
- **Encéphalopathie hépatique**
- **Oligo-anurie sur obstacle des voies urinaires**

## **-Effets secondaires :**

- **Troubles hydro-électrolytiques :hypok, hypoNa, hypovolémie, hypoTA, déshydratation**
- **Troubles métaboliques (glycémie, urée)**

**Dr YASSINE.B**

# VALUIM

**Diazépam VALUIM®** *solution injectable à 10 mg/2 ml*

-Action thérapeutique : Anxiolytique, sédatif, anti convulsivant, myorelaxant

-Indications

- Urgences neuropsychiatriques: épilepsie, crise d'angoisse, agitation
- prémédication à l'endoscopie,
- tétanos.

-Posologie

Adulte : 0,1 à 0,2 mg/kg en IM ou IV lente.

Enfant : 0,5 mg/kg

-Contre-indications

- insuffisance respiratoire et hépatique sévères,
- Hypersensibilité aux benzodiazépines

-effets indésirables

- sensation ébrieuse, somnolence
- dépendance
- Risque de syndrome de sevrage

**Dr YASSINE.B**

# ADRENALINE

## Épinéphrine ADRENALINE ® :

ampoules 1, 0.5, 0.25mg/ 1ml

-Catécholamine sympathomimétique

- *Alpha+* : vasoconstriction,
- *Bêta 1+* : inotrope +, bathmotrope+, Chronotrope +, dromotrope +
- *Bêta 2+* : bronchodilatateur

- Indications et Posologies :

01-Arrêt cardiaque

- 1mg / 3ml IVD
- 3mg / 10 ml Intra trachéal

02- Etats de choc :

Anaphylactique 0,1 à 0,2mg IVL

Hypovolémique : 0,05-0,5µg/kg/mn

03- Asthme Aigu Grave : 0,1µg/kg/mn

**Dr YASSINE.B**

# DOBUTREX

Dobutamine DOBUTREX® :

ampoules 250mg/10 ml

-Catécholamine sympathicomimétique de synthèse

- *Alpha+* mineur
- *Bêta 1+* majeur

-Indications

- Etat de choc cardiogénique
- Choc septique à la phase hypokinétique

-Posologie:

2,5 à 20  $\mu$ /Kg/mn

Dr YASSINE.B

# **CORDARONE**

**Amiodarone CORDARONE® :**

ampoules 150mg/3ml

**-Antiarythmique classeur III**

- Chronotrope -, inotrope -, dromotrope -, bathmotrope –

**-Indications et posologies :**

Traitement des troubles du rythme supraventriculaire et ventriculaire

- Dose de charge: 5mg/Kg en 30mn
- Dose d'entretien : 10mg/Kg/24h

**-Contre –indications :**

- BAV, bradycardie
- Hypotension artérielle
- Grossesse
- Insuffisance cardiaque sévère
- dysthyroïdie

**Dr YASSINE.B**



# EPHEDRINE

Ephédrine EPHEDRINE®:

ampoules 30mg/1ml

-Sympathomimétique non  
catécholaminergique, de synthèse

- Beta 1 stimulant: majeur
- Alpha stimulant: mineur

-Indication: Collapsus vasculaires:

3 à 9 mg IVD

Dr YASSINE.B

# ATROPINE

Sulfate d'atropine ATROPINE® : 0,25 mg, 1mg/1ml

-Anticholinergique, parasymphathicolvtique

-Actions :

- Antagoniste compétitif de l'Ach : récepteurs muscariniques

Effet tachycardisant

- Effets antisécrétoire salivaire, bronchique, gastrique, sudoripare
- Effet mydriatique
- Effet antispasmodique

-Indications et posologies

- 10-15  $\mu$ /kg IVD
- Bradycardie sinusale : 0,5 à 1 mg IVD
- Intoxication par les anticholinestérasiqnes organo-phosphorés :  
1 à 2 mg/5mn IVD

- Contre -indications :

- Glaucome à angle fermé
- Iléus paralytique
- Hypertrophie prostatique

**Dr YASSINE.B**