

Médicaments au cours de la grossesse

 **Contre-indiqué**

 **A éviter**

 **Autorisé**

I. Cardiologie :

Anticoagulants oraux

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Acenocoumarol	Sintrom®				*
Warfarine	Coumadine®				*
Fluindione	Previscan®				

*Une supplémentation en vitamine K recommandée lors de tout allaitement maternel exclusif.

Héparine

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Héparine non fractionnée	Héparine®			*	
Héparine fractionnée	Fraxiparine®				

*Risque hémorragique utéroplacentaire accru au moment de l'accouchement

Antiagrégants plaquettaires

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Clopidogrel	Pidogrel®				
Abciximab	Reopro®				
Aspirine	Aspegic®	*	*	**	***

*Traitement ponctuel ou à faible dose: 100 mg/j (dose anti-agrégante). ** Dose ≥ 500mg/j.

*** Traitement chronique et à dose antalgique ou anti-inflammatoire.

Thrombolytiques

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Streptokinase	Sireptase®				
Altéplase	Actilyse®	*	*	*	
Urokinase	Urokinase®	*	*	*	

*Contre-indication relative, l'angioplastie est recommandée en 1^{ère} intention dans l'IDM.

Antihypertenseurs

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
IEC	Lopril®				
ARA II (sartans)	Atacand®				
Labétalol	Trandate®				
Nifédipine	Adalate®				
Nicardipine	Loxen®				
Alpha-Méthylidopa	Aldomet®				
Diurétiques	Lasilix®				

Antiarythmiques de classe III

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Amiodarone	Cordarone®				

II. Pneumologie :

Corticoïdes inhalés

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Budésonide	Pulmicort®				
Béclométhasone	Bécotide®				

Bêta -2 mimétiques inhalés

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Salbutamol	Ventoline®				
Terbutaline	Bricanyl®				
Ipratropium bromure	Atrovent®				

Antitussifs

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Oxomémazine	Toplexil®				
Dextrométhorphan	Drill®				
Carbocistéine	Rhinathiol®				



III. Neuro-psychiatrie :

Antidépresseurs

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Paroxétine	Deroxat®				
Clomipramine	Anafranil®			*	

*Une surveillance du nouveau-né est nécessaire.

Neuroleptiques/Antipsychotiques

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Chlorpromazine	Largactil®			*	
Halopéridol	Haldol®			*	

*Une surveillance du nouveau-né est nécessaire

Hypnotiques et Anxiolytiques

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Hydroxyzine	Atarax®				
Bromazépam	Lexomil®				
Diazépam	Valium®				

Anticonvulsivants

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Phénobarbital	Gardénal®				
Valproate de sodium	Dépakine®				
Clonazépam	Rivotril®				

Antimigraineux

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Pizotifène	Sanmigran®				
Oxétorone	Necertone®				
Sumatriptan	Imigran®				
Ergotamine, Dihydroergotamine	Gynrergene® Ikaran®				

Antihelminthique

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Albendazole	Zentel®				

V. Maladies infectieuses :

Bêta-lactamines :

- Pénicilline

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Péni. A (Amoxicilline)	Clamoxyl®				
Péni. G	Pénicilline G®				
Péni.M (Oxacilline)	Oxacilline®				
Péni.V (Oracilline)	Oracilline®				

- Cephalosporines

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
C3G: Céfotaxime	Claforan®				
C3G: Céfixime	Oroken®				
C1G : Céfadroxil	Oracéfal®				
C2G : Céfuroxime	Zinnat®				

- Autres Beta-lactamines

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Amoxicilline + acide clavulanique	Augmentin®				

Aminoglycosides

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Gentamicine	Gentamicine®				
Streptomycine	Streptomycine®				

Macrolides

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Azithromycine	Zithromax®				
Roxithromycine	Rulid®				
Spiramycine	Spiramycine®				
Pristinamycine*	Pyostacine®				

*Macrolide apparenté

 [www.facebook.com/letradosdesmedecins](#) | [www.instagram.com/letradosdesmedecins](#) | [www.youtube.com/channel/UCvWUwXGKtYDQmTgRnEzF7Hw">www.youtube.com/channel/UCvWUwXGKtYDQmTgRnEzF7Hw](#) | [www.tumblr.com/letradosdesmedecins](#) | [www.pinterest.es/letradosdesmedecins](#) | [www.linkedin.com/company/letradosdesmedecins](#) | [www.behance.net/letradosdesmedecins](#) | [www.dribbble.com/team/letradosdesmedecins](#) | [www.flickr.com/photos/letradosdesmedecins/">www.flickr.com/photos/letradosdesmedecins/](#)

* nouveau-né d'âge <1 mois.

VI. Les antalgiques et les anti-inflammatoires

*Utilisation ponctuelle si nécessaire.

VII. Les anti-histaminiques

*Utilisation ponctuelle si nécessaire.

IV. Gastro-intestinale

Antiémétiques

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Doxylamine	Donormyl®			*	
Métoclopramide	Primpéran®				
Sulpiride	Dogmatil®			*	

*Une surveillance du nouveau-né est nécessaire.

Anti-diarrhéiques

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Lopéramide	Imodium®				
Diosmectite	Smecta®				
Attapulgite de Mormalon activée	Actapulgite®				
Nifuroxazide	Ercéfuryl®				*

*Limiter la durée du traitement.

Protecteurs gastriques

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Famotidine	Famodine®				
Oméprazole	Mopral®				
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium	Maalox®				*
Alginate	Gaviscon®	*	*	*	*

*Limiter la durée du ttt.

Antispasmodiques/ Laxatifs/ Antihémorroïdaires

Nom pharmaceutique	Nom commercial	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre	Allaitement
Phloroglucinol	Spasfon®				
Trimébutine	Débridat®				
Sterculia	Normacol®				
Huile de paraffine	Lansoyl®				
Diosmine	Daflon®				

SYSTEME RESPIRATOIRE

Médicaments	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	Naissance
β -mimétiques	A	A	A	S

APPAREIL DIGESTIF

Médicaments	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	Naissance
Oméprazole	A	A	S	
Antispasmodiques	A	A	A	

SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE

Médicaments	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	Naissance
Digitoxine	A	A	S	
β -bloquants	A	A	A	
Méthildopa	A	A	A	
Furosémide	S	S	S	
α -bloquants	D	D	D	
Inhibiteurs calciques	D	D	D	
IEC	C.I.	C.I.	C.I.	
Sartans	C.I.	C.I.	C.I.	
Héparine	S	S	S	
HBPM	S	S	S	
AVK	C.I.	C.I.	C.I.	
NACO	C.I.	C.I.	C.I.	

ANTI-INFECTIEUX

Médicaments	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	Naissance
Pénicillines	A	A	A	
Céphalosporines	A	A	A	
Macrolides	A	A	A	
Imidazolés	S	S	S	
Fluoroquinolones	A	A	A	
Aminosides	D	D	D	
Glycopeptides	D	D	D	
Cyclines	C.I.	D	D	
Sulfamethoxazole-triméthoprime	C.I.	D	D	
Aciclovir	S	S	S	
Chloroquine	A	A	A	
Malarone	A	A	A	
Savarie	A	A	A	

A : Autorisé - S : Surveillance - D : Déconseillé - C.I. : Contre-indiqué

ANTIÉPILEPTIQUES : risque tératogène; un traitement efficace ne doit pas être brutalement interrompu, l'attitude sera modulée en fonction des molécules après avis spécialisé.

Médicaments	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	Naissance
Benzodiazépines	A	A	A	S
Lamotrigine	A	A	A	
Carbamazépine	S	S	S	
Lévéticacétam	S	S	S	
Autres	D	D	D	

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET DOULEUR

Médicaments	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	Naissance
Phénothiazines	A	A	S	S
Benzodiazépines	A	A	A (baisse posologie)	S
Corticoïdes	A	A	A	S
AINS	D	D	C.I.	
Salicylés	D	D	C.I.	
Paracétamol	A	A	A	
Antalgiques (OMS2 : co-déine, tramadol)	A	A	A	S
Morphine	A	A	A	S
Anesthésiques locaux	A	A	A	
MEOPA	D	A	A	

A : Autorisé - S : Surveillance - D : Déconseillé - C.I. : Contre-indiqué

Les classes d'antibiotiques contre indiquées chez la femme enceinte

Staph-Q(coque)

- **T** Tétracyclines
- **A** Aminosides
- **Q** Quinolones
- **S** Sulfamides
- **Ph** phéNicolés