

Les gouttes nasales

- YouPharm Dz -

Anti infectieux (antibiotiques)

DCI	Nom commercial	Indications	Posologie
Framycétine	Niframycine Soframicine	Traitements des infections de la muqueuse rhinopharyngée	Enf : 1 pulvérisation 3 fois/jr Ad : 1 pulv 4 à 6 fois/jr

Décongestionnants

DCI	Nom commercial	Indications	Posologie
Thiophène Carboxylate de Sodium	Soufrane Gefrane	Traitement local d'appoint en cas de rhume et de rhinopharyngite.	4 à 6 pulvérisations par jour dans chaque narine.
Oxymetazoline	Respinal Respibien	Traitement des états congestifs au cours de rhinite , sinusite	Ad et enf + 6ans : 1 à 2 pulv 1 ou 3 fois/jr

Antiallergiques : corticoïdes par voie nasale

Contre-indications • Traumatisme au niveau du nez

- Saignement du nez
- Herpès au niveau des muqueuses du nez, des lèvres, de la bouche ou des yeux .
- Antécédent récent de chirurgie nasale .
- Infection nasale non traitée • tuberculose pulmonaire

DCI	Nom commercial	Indications	Posologie
Fluticasone furate	Avamys	Rhinite allergique Ad et enf + 6 ans	• 12 ans- ad : 2 pulvérisations dans chaque narine, une fois par jour. En traitement d'entretien, la posologie peut être réduite à 1 pulvérisation dans chaque narine, 1 fois par jour. • 6-11 ans : 1 pulv/jr

Fluticasone Propionate	Flixonase Flomist	• Rhinite allergique Ad et enf + 4ans	12 ans- ad : 2 pulvérisations dans chaque narine, une fois par jour. En traitement d'entretien, la posologie peut être réduite à 1 pulvérisation dans chaque narine, 1 fois par jour. • 4-12 ans : 1 pulv/jr
	Fluticasone Flixasone	• Polypose nasale de l'adulte (une prolifération excessive de la muqueuse du nez qui recouvre la paroi)	Traitement d'attaque : 2 pulv 2 fois par jour, matin et soir. Traitement d'entretien : une fois les symptômes contrôlés, (en général, après 1 à 2 mois), 2, 1 fois par jour le matin.
Mométasone furoate	Etacid Nasonex Momenex	Rhinite allergique Ad et enf + 3ans	12 ans- ad : 2 pulv dans chaque narine, une fois/ jr. 3-11 ans : 1 pulv/jr
	Tasonex	Polypose nasale (Adulte)	Ad : 2 pulv dans chaque narine, une fois/ jr.
Béclométasone dipropionate	Beconase Nasabec 50 µg	Rhinite allergique	Ad – enf+ 6 ans : deux pulvérisations dans chaque narine, 2 fois par jour.

Triamcinolone	Nasacort Nasacet	Rhinite allergique Ad –enf + 2 ans	Ad : 2 pulv dans chaque narine, le matin. Après amélioration des symptômes, la posologie peut être réduite à 1 pulvérisation dans chaque narine, 1 fois par jour. Enf 6 à 12 ans : 1 ou 2 pulv le matin. Enf 2 à 6 ans : 1 pulv dans chaque narine, le matin.
Béclométasone dipropionate	Rhinoclenil Nasabec 100 µg	Rhinite allergique Rhinites inflammatoires chroniques Ad –enf + 3 ans	Adulte : 1 pulv dans chaque narine, 2 fois par jour. Enfant de 3 à 15 ans : 1 pulv, 1 à 2 fois /jr
Budésonide	Rhinocort	Rhinite allergique Ad et enf + 6ans	2 pulv dans chaque narine 1 fois par jour (le matin de préférence),
		Polypose nasale	1 pulvé dans chaque narine 2 fois/ jr (matin et soir).

Antiseptiques

DCI	Nom commercial	Indications
Eau de mer	Humer Marimer Stérimer Unimer Actimer	✓ La solution hypertonique indiquée uniquement dans le cas de 'nez boucher' ✓ La solution isotonique peut s'utiliser quotidiennement dans le cadre d'une hygiène nasale.



Mouche Nez

Classifications des Anti inflammatoires Stéroïdiens

- Corticoïdes -

YouPharm Dz

- Effet Anti inflammatoire
- Effet Anti allergique
- Effet Immuno supresseurs

Indications :

- **Maladies broncho-pulmonaires et ORL** ex : asthme, infections broncho-pulmonaires, bronchopathie chronique obstructive, rhinopharyngite, laryngite, sinusite
- **Maladies rhumatologiques et neurologiques** ex : paralysie faciale, pseudopolyarthrite rhizomélisque, maladie de Horton, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques
- **Maladies gastro-intestinales** ex : aphtes, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique
- **Maladies dermatologiques** ex: urticaire, eczéma
- **Cancer**
- **Autres pathologies** ex : maladies rénales

Les effets secondaires : Les AIS sont efficaces , mais à long terme , il peut y avoir des effets secondaires :

- Réactions cutanées : Prise de poids . La peau peut se fragiliser . Vergetures . Sècheresse cutanée .
- Troubles rénaux : calculs rénaux par précipitation des ions calcium ou phosphate ;
- Risque d'infection élevé : du fait de la diminution de l'immunité .
- Troubles métaboliques : rétention hydrosodée, hypokaliémie, hyperglycémie .

Contre-indications :

- Infections bactériennes ou mycosiques non contrôlées par un traitement spécifique ;
- Certaines viroses en évolution (herpès, hépatites, varicelle, zona) ;
- Vaccination par un vaccin vivant ; par exemple contre la rougeole, la varicelle
- La femme allaitante en raison d'un passage dans le lait.

Par ailleurs,

- en cas d'ulcère gastroduodénal, la corticothérapie n'est pas contre-indiquée mais un traitement antiulcéreux est souvent associé
- lorsque la corticothérapie est indispensable, le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas des contre-indications bien que le traitement puisse entraîner leur déséquilibre

★ A prendre le matin (en raison du pic physiologique de Cortisol à cette heure) après le petit déjeuner afin de protéger la muqueuse gastrique .

★ Il ne faut pas interrompre un traitement corticoïde brutalement pour deux raisons :

- 1) cela favorise les rechutes de la maladie ;
- 2) il existe un risque dû au sevrage des corticoïdes

Betamethasone (DC)

• En comprimé dispersible : 2 mg

- Betabio
- Betasone
- Celestene
- Celetasone

• solution buvable en gouttes: 0.05 %

- Betabio
- Betacrovis
- Tabeta
- Betastene
- Celestene
- Celetasone

• Suspension injectable : 2.7 mg+3 mg

- Celestene chronodose
- Helestene chronodose

• Suspension injectable : 5 mg / 2 mg

- Hupprostene
- Diprostene

• Lotion dermique 0.05 %

- Dermasone
- Betsol
- Diprosone

• Pommade / Creme dermique : 0.05 % - 1 %

- Betasone
- Betamethasone
- Diprosone
- Tabeta

Betamethasone + Acide salicylique (DCI)

- Pommade:

- Betacyl
- Diprosalic
- Diprosone
- Tabeta

Betamethasone + Acide fucidique (DCI)

- Crème :

- Zeta-Cort
- Zeta plus

Prednisolone (DCI)

- En comprimé oro dispersible : 5-20 mg

- Solupred
- Solopred
- Oropred
- Prednicort
- Swor

- Solution buvable :

- Physiolone
- Cortidal

Methyl Prednisolone (DCI)

- En comprimé : 4 - 16 mg

- Medrol
- Huppomedrol
- Prednol

- Solution injectable : 20 - 40 - 120 mg

- Solumedrol
- Meprenal
- Prednol
- Lemo-solu
- Lisamethyl.

Methyl Prednisolone acetate (DCI)

- MethylPrednisolone **NAD**

Dexamethasone (DCI)

- En comprimé : 0.05 mg
- Desacrovis

Triamcinolone acetonide (DCI)

- Suspension injectable : 40 mg
- Kenacort • Huppacort • Lisatriam • Obacort

Prednisone (DCI)

- En Comprimé : 5 mg
- Precortyl • Cortancyl

Les Anti asthmatiques

- YouPharm dz -

Trt de crise (Traitement d'attaque)

LES BRONCHODILATEURS D'ACTION RAPIDE SOUS FORME INHALÉE : Bêta-2 Stimulants

Ils agissent en relâchant les muscles qui entourent les bronches, facilitant le passage de l'air et permettant ainsi de soulager rapidement la respiration. Leur action est **rapide** (quelques minutes) et **limitée dans le temps** (quatre à six heures).

DCI	Nom Commercial
Terbutaline	Bricanyl* <u>Turbuhaler</u>
Salbutamol	Ventoline



Nébulisateur	Chambre d'inhalation
	

Les Bronchodilatateurs D'action Rapide En Nébulisation : En cas de crise d'asthme intense et inhabituelle, les bronchodilatateurs bêta-2 stimulants peuvent être utilisés par les services d'urgence sous forme de solution pour nébulisation. Ils sont utilisés lorsque la crise d'asthme ne cède pas après plusieurs prises de bronchodilatateurs d'action brève avec le système inhalé habituel. Ils sont habituellement associés à un autre type de bronchodilatateurs appelés anticholinergiques.

Dans le cadre d'un traitement d'urgence, les bronchodilatateurs bêta-2 stimulants peuvent également être utilisés par voie injectable à l'hôpital.

LES CORTICOÏDES en comprimé

Il sont parfois utilisés sous forme de **comprimés** à la suite d'une crise sévère ou qui ne cesse pas complètement malgré des prises répétées de bronchodilatateurs d'action rapide. **Pour une crise d'asthme aigu grave, le médecin peut prescrire des corticoïdes injectables**, qui seront pris pendant quelques jours après la crise.

Dans le traitement de la crise d'asthme, les corticoïdes en comprimés sont généralement prescrits pour une **courte durée, en particulier après une crise sévère.**

Classifications (Voir le cours classification des corticoïdes)

Traitement de fond :

Le traitement de fond de l'asthme vise à **éviter ou limiter la survenue de crises**. Il n'agit pas immédiatement et, pour être efficace, il doit être **pris tous les jours**. Deux familles de médicaments sont principalement utilisées dans le traitement de fond de l'asthme : les **corticoïdes**, des anti-inflammatoires puissants, et les **bronchodilatateurs à longue durée d'action**. Leur utilisation sous forme inhalée permet de les délivrer directement dans les poumons et d'éviter les effets indésirables sur l'organisme.

D'autres médicaments sont également proposés en alternative : montélukast et théophylline à libération prolongée, tiotropium ...

LES CORTICOÏDES PAR VOIE INHALÉE

* Ces médicaments réduisent l'inflammation des bronches et la sensibilité des bronches aux agents irritants contribuant ainsi à améliorer le passage de l'air .

* Pris tous les jours (en général, matin et soir)

DCI	NC
Budsonide	Budecort – Pulmicort
Beclomethasone	Clenil
Fluticasone	Flixotide



LES BRONCHODILATEURS À LONGUE DURÉE D'ACTION

Ils agissent en relâchant les muscles qui entourent les bronches, ce qui facilite le passage de l'air.

Ils sont toujours associés au traitement corticoïde inhalé. Ils sont le plus souvent administrés sous forme inhalée, **à prendre matin et soir**.

Il existe également des **comprimés**, moins bien tolérés, qui sont réservés aux personnes ne pouvant pas utiliser les solutions ou les poudres pour inhalation.

DCI	NC
Formoterol	Foradil
Terbutaline lp cp	Bricanyl lp



LES TRAITEMENTS DE FOND COMBINÉS PAR VOIE INHALÉE

Corticoïde + bronchodilatateur

DCI	NC
Budisone+formotérol	Symbicort (100-200-400)
Fluticasone+salmétérol	Seretide – Brequal 100-250-500



LES CORTICOÏDES PAR VOIE ORALE

Certaines formes d'asthme très sévère sont traitées avec un corticoïde en comprimés à prendre pendant plusieurs mois : la posologie est alors adaptée à chaque individu.

Classifications (Voir le cours classification des corticoïdes)

LE TIOTROPIUM

Le tiotropium est un **bronchodilatateur de longue durée d'action** de la famille des anticholinergiques. Il est utilisé par voie inhalée en traitement continu **en complément du traitement par corticoïde et bronchodilatateur bêta-2 stimulant de longue durée d'action** chez les adultes qui ont présenté des épisodes d'exacerbation d'asthme.

DCI	NC
Tiotropium	Spiriva



ANTILEUCOTRIENES

Les **leucotriènes** sont des substances naturellement produites dans les bronches des personnes asthmatiques et qui participent à accroître l'inflammation et à contracter les muscles qui entourent les bronches. **Les antileucotriènes** sont des substances qui les empêchent d'agir et qui sont susceptibles de réduire l'inflammation et l'obstruction des bronches.

DCI	NC
Montélukast	Montelair - Singular (4-5-10mg)



LA THÉOPHYLLINE : Theostat Ip 100-200-300 .

La théophylline est un bronchodilatateur très ancien, administré sous forme orale. La théophylline à libération prolongée (sous forme de comprimé ou de gélule) est indiquée dans le traitement de fond de l'asthme, mais elle est de moins en moins utilisée en raison de ses effets indésirables et de ses interactions médicamenteuses. En effet, la théophylline peut être **à l'origine de nombreux effets indésirables** parmi lesquels l'excitation, l'insomnie, les tremblements, la survenue de maux de tête, des troubles digestifs comme les nausées ou les vomissements, et éventuellement des palpitations avec une accélération des battements du cœur (tachycardie). Elle peut occasionner des effets toxiques (digestifs, cardiaques, etc.) en cas de surdosage. Dans les cas extrêmes, des convulsions peuvent survenir.



Les anti émétique = Médicaments
pour les nausées et les vomissements

★ A prendre ¼ heure (15 minutes) avant les repas .

DCI	Nom commercial	Forme	Posologie	
Domperidone	Motilium	*Cp (10mg)	*Ad : 1cp 3x/jr	
	Motidone			
	Peridium	*Snp	*Nrs-Enf : Selon le poids 2 à 3 fois par jour .	
	Domperone	buvable		
Metoclopramide	Primperan	* Cp (10mg)	*Ad : 1cp 3x/jr	
		* Injection		
	Clopramide			
	Modenum	*Sirop	* Nrs et enf >1 an : Selon le poids 2 à 3 fois par jour .	
Metopimazine	Vogalene	*Cp lyoc (7.5mg)	Ad et enf >6 ans : 1 Cp ou Suppo 2 à 3x/jr	
		*Suppo ou(5mg)		
Ondansétron	Zophren Setrem	*Cp 4 et 8 mg	1cp 2x/jr	Vomissements post chimiothérapie
Vomiteb	A base de plantes	Cp Sirop	1 ans – AD : 1 à 3 fois par jour	Mal des transports. Remont des acides Nausées de la femme enceinte

Les anti diarrhéique = Médicaments pour la diarrhée

YouPharm Dz

DCI	Nom commercial	Forme	Posologie
Lopéramide	Imodium, Inpladum, Diarryl Dinaepa Lopestin	Cp (2mg) Sirop	Ad : 1 cp après chaque selle diarrhéique E>2ans : selon le poids (2 à 3 fois par jour)
Racécadotril	Tiorfan	Sachet (10-30mg) Gélule (100 mg)	Nrs (10mg) Enf (30mg) Ad (100mg) 3 fois / jour
Diionectite	Smecta, Smectyl	*Pdr en Sachet	Enf>2ans : 1sct 2x/jr Ad : 1 sct 3x/jr
Nifuroxazide	Ercefuryl, Panfurex Dysentyl, Xeturyl	Gélule (200 mg) Sirop	Ad : 2gél 3x/jr Enf>2ans : 1CàC 3x/jr

- L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce la **Nifuroxazide** .
- Chez l'enfant: Le contenu du sachet de **Smecta** peut être délayé dans un biberon de 50 ml d'eau à répartir au cours de la journée, ou bien mélangé à un aliment semi-liquide : bouillie, compote, purée, 'petit-pot', etc.

Flore levurique et Flore bactérienne :

Ultra-levure (sacharomyces boulardii)	*Sachet 100mg(> 2ans) *G dures 200mg (Ad)	1 à 2x/jr
Ultrabiotique (Lactobacillus acidophilus)	*Sachet pour enfants *G dures pour Ad	1-3 x/ jour

★ La réhydratation est impérative dans le traitement de diarrhée (utilisation des **SRO**) **Sel de réhydratation orale** .

Un sachet du SRO + EAU (1L ou 200 ml selon le volume indiqué sur la boîte) : Préparation à renouveler chaque 24H .

Les laxatifs = Médicaments

pour la constipation

	DCI	Nom commercial	Forme	Posologie	Grossesse et allaitement
Par voie orale	Huile de paraffine	Isoflène	Sirop	Adulte : 1-3 C3S/jr Enf plus de 6 ans : 1 à 3 C3C/jr	/
	Lactulose	Inphalac, Exilax	Sirop	Adulte : 1 càS 1 à 3 fois /jr Enfant : 1 càc 2 à 3 fois / jr Nourrisson : ¼ à 1 c à c / jr	Possible
		Duphalac Lactunad	Sachet	En sachet : Adulte : 1 à 3 sachet / jr	
	Macrogol- PEG	Forlax	Sachet	Forlax 4g : (6 mois à 8 ans) Forlax 10 g : 8 ans-AD : 1 à 2 sachets par jour.	Possible
		Fortrans	Sachet	Utilisé pour lavage colique avant coloscopie	
	Laxatif à base de plante	Exp : Lactofibre	Sirop	1 à 6 ans : 5ml + un verre d'eau après chaque dose. 7 à 14 ans : 8ml + un verre d'eau après chaque dose Adulte : 10ml + un verre d'eau après chaque dose	Possible

Par voie rectale	Bisacodyl	Laxadyl	Suppo	10 mg (Adulte) : 1 suppo /jr 5 mg (4 ans et plus) : 1 suppo/jr	CI au cas de grossesse
	Glycérine	Glycérine	Suppo	Nourisson / Enfant /Adulte : 1-2 Suppo/jr	Le traitement de la constipation de la grossesse ne doit faire appel aux laxatifs par voie rectale que de façon très ponctuelle.
	Sorbitol+ Citrate de sodium	Norgalax, Microlax, Regulax	Gel rectale (tube)	Adulte : Un tube le soir	
	Solution hypertonique	Normacol	Récipients en tubes	Un lavement en cas de besoin	



Médicaments ophtalmologiques :

➡ Collyres - Gouttes oculaires - Gouttes ophtalmiques.

➡ Pommades et gels ophtalmiques.



Anesthésiques locaux

Indiqué comme anesthésique local au cours de différentes interventions chirurgicales ou différents examens de l'œil.

Cette spécialité est réservée à l'usage professionnel

Dci	Nom commercial	Posologie
Oxybuprocaine	Cebesine collyre	La dose recommandée est de 1 à 2 gouttes pour une anesthésie cornéo-conjonctivale d'une dizaine de minutes. Certaines interventions ou examens nécessitent que l'instillation soit répétée 2 à 4 fois à une minute d'intervalle.

Anti glaucomateux

Les collyres de cette classe sont indiqués pour faire baisser la pression oculaire chez les patients atteints d'hypertension oculaire ou de glaucomes.

Glaucome : Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision commençant tout d'abord en périphérie et progressant graduellement vers le centre.

Dci	Nom commercial	Posologie
Dorzolamide	Collyre : Zolamide Dorzamed Trusopt	En monothérapie, la dose est d'une goutte 3 fois par jour. En association à un bêta-bloquant à usage ophtalmique, la dose est d'une goutte deux fois par jour . (dans l'œil ou les yeux affectés)
Dorzolamide/ Timolol	Cosopt Xolamol Zolamide +	1 goutte dans l'œil ou les yeux atteint(s), deux fois par jour, matin et soir .
Timolol	Geltim Lp collyre	1 goutte dans l'œil (ou les yeux) malade(s), une fois par jour, le matin.
Brinzolamide	Azopt collyre	1 goutte dans l'œil ou les yeux atteint(s), deux fois par jour, matin et soir.

Carteolol	Carteol 1% - 2% collyre	Carteol 1% : 1 goutte dans l'œil (les yeux) malade(s) une fois par jour, le matin. Carteol 2% : 1 goutte dans l'œil malade, 2 fois par jour.
Latanoprost	Xalatan collyre Latasopt Lataneks	1 goutte dans l'œil (les yeux) malade(s) une fois par jour, de préférence le soir
Latanoprost / Timolol	Xalacom collyre Lataduo	1 goutte dans l'œil (les yeux) malade(s) une fois par jour
Travoprost	Travatan collyre Travost	1 goutte dans l'œil (les yeux) malade(s) une fois par jour, de préférence le soir

Antiviraux locaux

Il est indiqué dans le traitement de certaines infections virales et superficielles de l'œil (cornée).

Dei	Nom commercial	Posologie
Ganciclovir	Virgan - Gel oph	Ad +18 ans : 1 goutte 3 à 5 fois par jour. La durée du traitement ne dépasse pas 21 jours.

Anti allergiques locaux

Médicament anti histaminiques utilisés pour traiter les symptômes d'une allergie au niveau de l'œil (conjonctivite allergique) reconnaissable par des yeux et/ou des paupières gonflées, des yeux rouges, qui démangent ou qui larmoient.

- Eviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirez les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre .

Dei	Nom commercial	Posologie
Levocabastine	Levophta collyre	1 goutte dans chaque œil 2 fois par jour. Cette dose peut être augmentée, si nécessaire, à 1 goutte 3 à 4 fois par jour Le traitement ne devra pas être prolongé au-delà de 5 jours sans avis médical.
Acide N-acétyl aspartyl glutamique sodique	Naabak collyre Naaxia collyre	Ad et enf + 4ans 1 goutte, 2 à 6 fois par jour.
Olopatadine	Opatanol collyre	Adulte et enfant de plus de 3 ans : 1 goutte, 2 fois par jour.
Kétotifène	Zalerg collyre	Ad et enf + 3 ans : 1 goutte dans l'œil ou les yeux malade(s) deux fois par jour (le matin et le soir).

Anti infectieux locaux (Antibiotiques)

Indiqués dans le traitement local de certaines infections de l'œil et des paupières .

Dci	Nom commercial	Posologie
Acide fusidique	Fucithamie Gel ophtalmique	Une goutte dans le sac conjonctival inférieur 2 fois par jour , matin et soir.
Norfloxacin	Chibroxine collyre Floxamed	1 ou 2 gouttes 4 fois par jour dans l'œil (ou les yeux) atteint(s).
Azithromycine	Azyter collyre	Ad et enf + 17 ans : 1 goutte dans l'œil (les yeux) à traiter, 2 fois par jour : 1 goutte le matin et 1 goutte le soir. La durée du traitement est de 3 jours.
Chlortétracycline	Clomycine 1 % Aureomycine 1% - Pommade ophtalmique	1 à 2 applications par jour, dont une application le soir de préférence, pendant 7 jours en moyenne.
Ofloxacin	Coronol - Collyre Optiflox	2 gouttes 4 fois par jour dans l'œil ou les yeux atteints.
Garifloxacin	Gatifloxacin - collyre Tymer	1 à 2 gouttes dans l'œil (les yeux) atteint 3 à 4 fois par jour ou selon prescription médicale

Tobramycine	Tobrex - collyre Obrax	Ad et enf + 1 an : 1 goutte 3 à 8 fois par jour. Pendant 5 à 15 jours .
Rifamycine	Rifamycine - collyre / Pommade ophtalmique	Collyre : 1 à 2 gouttes de collyre, 4 à 6 fois par jour, selon la gravité, Pmd Opht : 1 à 2 applications par jour, dont une application le soir de préférence. pendant 7 jours en moyenne.
Dexaméthasone/ Oxytétracycline	Sterdex - Pommade ophtalmique 	Ad et enf + 8 ans : 1 à 3 applications par jour. Pendant 7 jours . Cette pommade est présentée en capsule à usage unique. La capsule doit être jetée immédiatement après usage et ne doit pas être conservée en vue d'une réutilisation.

Antiseptiques locaux

Ils sont préconisés dans le traitement de certaines infections bactériennes superficielles de l'œil.

Dci	Nom commercial	Posologie
Acide borique	Dacryoserum	La posologie recommandée est de 1 ou 3 lavages oculaires par jour. Utiliser le récipient unidose immédiatement après ouverture et le jeter après usage. Le récipient-unidose peut être utilisé pour le traitement des deux yeux.
Hexamidine	Desomedine - collyre	2 gouttes 4 à 6 fois par jour. Pendant 10 jours
Chlorhydrate de picloxydine	Vitabact - collyre	1 goutte, 2 à 6 fois par jour. Pendant 10 jours au max .

Corticoides locaux

Traitement de l'inflammation de l'œil

Dei	Nom commercial	Posologie
Fluorométholone	Optif Jam Flucon - Gel ophlt	1 goutte, 3 fois par jour, dans l'œil malade
Prednisolone	Optipred - Collyre	1 goutte, 4 à 6 fois par jour .
Phosphate de dexaméthasone	Dexafree collyre en solution en récipient unidose	1 goutte, 4 à 6 fois par jour, dans l'œil malade . Jetez l'unidose après utilisation. Ne la conservez pas pour une utilisation ultérieure.

Association : Corticoïdes et anti-infectieux

Antibiotique + corticoïdes : Ils sont indiqué dans le traitement local de certaines inflammations et infections de l'œil :

- après chirurgie de l'œil,
- dans des infections avec inflammation .

Dei	Nom commercial	Posologie
Néomycine / Dexaméthasone	Chibro-cadron - Collyre Neodron - collyre	- 1 goutte dans l'œil traité, 3 à 6 fois par jour, pendant 7 jours
Neomycine / Triamcinolone	Cronolone-Neo Cidermex - Pommade ophtalmique	1 à 2 applications par jour , selon la gravité pendant 7 jours en moyenne.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) par voie ophtalmique

Ils sont reconnus au cours de certaines interventions chirurgicales de l'œil et de leurs suites opératoires.

- Inhibition du myosis (rétrécissement du diamètre de la pupille) dans la chirurgie de la cataracte.
- Prévention des manifestations inflammatoires liées à la chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'œil.
- Traitement des manifestations douloureuses liées à la kératectomie photoréfractive (chirurgie correctrice de la myopie).

Réservés pour l'Adulte .

Dei	Nom commercial	Posologie
Diclofenac	Diclofed - collyre	· Inhibition du myosis au cours de la chirurgie de la cataracte : · pré-opératoire: jusqu'à 5 fois 1 goutte dans les 3 heures précédant l'intervention. Chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'œil: · pré-opératoire: jusqu'à 5 fois 1 goutte dans les 3 heures précédant l'intervention. · post-opératoire: 3 fois 1 goutte dès la fin de l'intervention, puis 3 à 5 fois 1 goutte par jour pendant maximum 4 semaines. Manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive (chirurgie correctrice de la myopie) : · pré-opératoire: 2 gouttes dans l'heure précédant l'intervention. · post-opératoire: 2 gouttes dans l'heure suivant l'intervention, puis 4 gouttes dans les 24 heures suivant l'intervention.
Indometacine	Indocollyre - collyre	Inhibition du myosis per-opératoire : 4 gouttes la veille de l'intervention, 4 gouttes dans les 3 heures qui précèdent l'intervention ; Prévention des manifestations inflammatoires liées aux interventions chirurgicales de la cataracte et du segment antérieur de l'œil : 1 goutte, 4 à 6 fois par jour jusqu'à complète disparition de la symptomatologie en débutant le traitement 24 heures avant l'intervention ; Traitement des manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive au cours des premiers jours post-opératoires : 1 goutte, 4 fois par jour, au cours des premiers jours post-opératoires.

Mydriatiques

Collyres qui permettent de dilater la pupille (mydriase) pour réaliser certains examens et/ou traitements en ophtalmologie.

Dei	Nom commercial	Posologie
Tropicamide	Mydraticum - collyre	- Examen du fond de l'œil: Instiller 1 ou 2 gouttes 15 minutes environ avant l'examen. - Examen skiascopique sous cycloplégie: Instiller 4 à 6 gouttes de collyre, à raison d'une goutte toutes les 5 minutes; il est généralement conseillé de débiter les instillations 45 minutes environ avant l'examen et de les poursuivre pendant environ 30 minutes. - Dilatation pré-opératoire pour cataracte, photocoagulation: Instiller 1 ou 2 gouttes de collyre dans les 15 minutes précédant l'intervention.
Atropine	Atropine Cropine - Collyre	Atropine 0.3% 1 goutte de collyre contient 93 µg de principe actif (atropine). ; Atropine 0.5% 1 goutte de collyre contient 135 µg de principe actif (atropine) Atropine 0.5% 1 goutte de collyre contient 310 µg de principe actif (atropine). Posologie : Adulte : 1 à 2 gouttes, 2 à 4 fois par jour. Enf 30 mois à 15 ans : 2 gouttes 3 fois par 24 heures
Cyclopentolate	Skiacol - Collyre	Adulte: une goutte, suivie d'une deuxième goutte instillée 10 minutes après si nécessaire. Enfants Il est recommandé d'établir une surveillance étroite de l'enfant durant les 30 minutes suivant l'instillation. Jeunes enfants (1 an à 3 ans) : une seule goutte dans l'œil. Enfants (3 ans à 12 ans) : une goutte dans l'œil. En cas de mydriase insuffisante et uniquement dans ce cas, une 2ème goutte pourra être administrée dans les 10 à 30 minutes suivant la 1ère instillation.

Suppleance lacrymale

Ils sont indiqués dans le traitement symptomatique de la **sécheresse oculaire**.

Dei	Nom commercial	Posologie
Hypromellose	Artelac - Collyre	1 goutte , 4 à 6 fois par jour.
Povidone	Fluidabak - Collyre	1 goutte , 4 à 6 fois par jour
Carbomere 974p	Siccafluid - Gel opht	1 goutte , 4 fois par jour
Carbomere 980	Liposic - Gel opht	1 goutte, 3 à 5 fois par jour, la dernière 30 minutes avant le coucher.
Hyaluronate de sodium	Hyfresh - collyre	1 à 2 gouttes au besoin .
Acide hyaluronique	Aqualarm	1 goutte , 4 à 5 fois par jour

Autres

Dei	Nom commercial	Posologie
Retinol	Vitamine A - collyre	Collyre cicatrisant : utilisé dans le traitement d'appoint des troubles de la cicatrisation de la cornée et pour traiter la sécheresse oculaire . 1 à 2 gouttes , 3 à 6 fois par jour

Médicaments à usage ophtalmique par voie orale

Acétazolamide	Diamox - comprimés sécables Lynox	Il est utilisé pour faire baisser la pression des liquides contenus dans le dans l'œil (baisse de la tension intraoculaire). Adulte : 1 à 2 comprimés par jour. Dans certains cas, cette dose peut être augmentée jusqu'à 4 comprimés par jour. Enfant à partir de 6 ans : la dose habituelle est de 5 à 10 mg/kg/jour.
---------------	--------------------------------------	---

Tobramycine / Dexaméthasone	Optidex-T - collyre	1 à 2 gouttes dans l'œil (les yeux) atteint 3 fois par jour .
Framycétine / Dexaméthasone	Frakidex - collyre / Pommade ophtalmique	Collyre : 1 goutte dans l'œil malade : - toutes les heures en début de traitement dans les affections aiguës sévères, - 3 à 6 fois par jour, dans les autres cas. Pommade opht : 1 à 3 applications par jour. Pendant 7 jours
Dexaméthasone / Sulfate de néomycine / Sulfate de polymyxine B	Maxidrol Maxilodre P.N.D	Collyre : 1 goutte dans l'œil traité 4 à 6 fois par jour . Pmd : 1 à 2 applications par jour. pendant 7 jours.
Dexamethasone / ofloxacin	Dexaflox - collyre	1 goutte toutes les 4 à 6 heures .