

MÉDICAMENTS

Dr.KHERBA_N

MÉDICAMENTS

Antibiotiques :

Pénicillines

Céphalosporines

Macrolides

Sulfamides

Autres ATB

Antalgiques

Antispasmodiques

Antiémétiques

Antidiarrhéiques

Anticonstipants

Antihistaminiques

Antitussifs

AINS

Corticoïdes

IPP

Lovenox

Mal au gorge

Nobac

Pénicillines

1 Amoxicilline

- 80mg/kg/j 3/j
- 80mg/kg/j=> Dose ORL
- 100_150mg/kg/j=> Dose pulmonaire
- $50 \times \text{poids} = ?/2 \text{ ou } 3$ (les fois/j)

Ex : poids : 20kg

$50 \times 20 = 1000/2$ donc 500mg

- Durée : 7j
- 2_3/j

■ Enfant : 

● Sirop :

■ 125/250/500mg => 1càm 2_3/j

■ <8kg : 125mg

■ 8_16kg : 250mg

■ 16_40kg : 500mg

● Cp :

■ >40kg : Cp 1g 1cp 2_3/j

● Inj : 1inj en IM/j N°7_10

■ >12ans : 500mg

■ Adulte : 1g

2 **Augmentin**

■ 50_80mg/kg/j (<30mois : 50/>30mois : 80)

■ 100mg/kg/j (Sinusite..)

■ Durée : 7_10j

■ 3/j

● Sirop : 1ddp 3/j

■ <15kg : 100mg Nourrisson

■ 15_25kg : Enfant

● Sachet : 1sac 3/j

■ 25_40kg : 500mg

■ >40kg ou >12ans : 1g

● Cp : 1cp 2_3/j

■ >12ans : 500mg

■ Adulte : 1g

3 Peni_V

→ Ospan / Orapen / Penival / Gectapen

- 0.05_0.1MUI/kg/j Ou 50mg/kg/j
- 2_3/j Pdt 10j
- 1mois_<15ans : 0.05_0.1MUI
- >15ans : 2_4MUI

● Sirop : 0.25MUI

- >3ans : 1cam 3/j pdt 10j

● Cp : 1cp 2_3/j

- Enfant >12ans : 1MUI
- Adulte : 1.5MUI

● Inj : 1inj/j en IM

- E : 0.5UI
- A : 1MUI

4 Oxacilline

→ Bristopen / Oxacil / Oxaline / Oxal / Oxcare

■ 50mg/kg/j

● Gel : 2_3/j

■ >12ans : 1gel

■ Adulte : 2gel

● Inj : 1inj/j en IM

■ Adulte : 1g

■ Enfant : 500mg

5 Ampicilline

→ Ampilline / Ampal / Ampinax / Totapen

■ 50mg/kg/j

● Sirop : 250mg

■ 2_6ans : 1cam 2_3/j

● Gel : 500mg

■ >12ans : 1gel 2_3/j

■ Adulte : 2gel 2_3/j

● Inj : 1g Adulte => inj/j en IM

6 **Extencilline**

→ Retarcilline / Retarmex / Retarpen

● Inj : 1inj/21j

■ <27kg : 0.6MU

■ >27kg : 1.2MU

Céphalosporines

1 **Cefalexine**

→ **Cefacet / Keforal / Lexinal**

Cefacet :

- Durée : 7_10j 2/j
- 25_50mg/kg/j
- Sans dépasser 2g/j

● Sirop : 1càm 2/j

- <2ans : 125mg
- 2_7ans : 250mg
- 7_15ans : 500mg

● Cp : >12ans : 500mg 2/j

- Adultes : 1g 1cp 2/j

Lexinal :

● Sirop :

■ <15 kg : 125mg poids en cc 2/j

■ Ex : 10 kg donc 10ml 2/j

■ 15_30kg : 250mg poids/2 en cc 2/j

Ex : 20kg donc 10ml 2/j

■ >30 kg : cp 500mg/1g

● Cp : Adulte 2g/j 2_3/j

2 Cefuroxime

→ Zinnat / Zinoximor / Daroxine

■ 30mg/kg/j pdt 7j

● Sirop : 125mg pdt 10j

■ <9kg : 1/2cac 2/j

■ 9_18kg : 1cac 2/j

■ >18kg : 1cac 3/j

● Cp : 250mg 500mg Adulte

■ 1cp 2_3/j

3 Cefdinir

→ Omnicef

■ 7mg/kg/j 2/j

● Sirop :

■ 40ml :

■ <9kg : 1/2cac 2/j

■ 9_18kg : 1cac 2/j

■ 18_27kg : 1cac 3/j

■ 80ml : >27kg 1cac 3/j

4 Cefaclor

→ Tabiclor / Dicef / Cloracef

- 20mg/kg/j 3/j
- Sévérité : 40mg/kg/j
- Pdt 7_10j

● Sirop : 1càm 2_3/j

■ Nrs : 125mg

■ E : 250mg

● Cp : 500mg Adulte 1_2cp 2_3/j

5 Céfazoline

■ 0.025_0.05g/kg

● Inj : Adulte 1inj/j en IM

6 Oroken

- 8mg/kg/j
- Durée : 10j
- 2/j

● Sirop : 1ddp 2/j

- <10kg : 40mg
- 10_40kg : 100mg

● Cp : 1cp 2/j matin/soir

- >12ans ou >40kg : 200mg
- Adulte : 400mg

Macrolides

1 Clarithromycine

→ Zeclar

- 50mg/kg/j !

- Pdt 7j

● Sirop : 1ddp 2/j

- 125mg : 25/ml <20kg

- 250mg : 50/ml 20_40kg

● Cp : 250mg 500mg >40kg

- 1cp/j 500mg

- 1cp 2/j 250mg

2 Azithromycines

→ Zomax / Zithromax

■ 20mg/kg/j

■ Durée : 3j

● Sirop : 1ddp 1/j

■ 15ml=200/22.5ml=300

■ 3mois_3ans : 10mg/kg/j

■ 3_8ans 15_25kg : 5ml/j

■ 8_11ans 26_35kg : 7.5ml/j

■ 12_14ans 36_45kg : 10ml/j

■ Sirop 200mg : Nrs : 2.5ml/j

■ Enfant : 5ml/j

● Cp : 1cp/j : >45kg

■ 2cp le 1^{er} j Puis 1cp/j les 4j Ou 1cp/j pdt 3j

■ Enfant : 250mg ■ Adulte : 500mg

3 Erythromycine

→ Erybesan

■ 30_40mg/kg/j

■ pdt 10j

● Sirop : 200mg

■ 5_10ans 20_35kg : 5ml 3/j

■ >35kg : 10ml 3/j

● Cp : 500mg 1cp 2_3/j

4 Roxid

● Cp : 150mg Adulte 1cp 2/j pdt 10j

■ Enfant >6ans : 5_8mg/kg/j

5 Orogyl

→ Biorogyl

● Cp : 1cp 2/j pdt 6j

■ Enfant : >12ans 750.000Ui

■ 6_10ans : 1cp 2/j

■ 10_15ans : 1cp 3/j

■ Adulte : 1.5MUI 2cp 2_3/j

6 Spiramycine

→ Rovamycine

● Sirop : 1cam 2/j Enfant

● Cp : 1cp 2/j

■ Enfant : 1.5U

■ Adulte : 3UI

Sulfamides

Bactrim

- Durée : 7j
- 30_40mg/kg/j
- 1cac/10kg
- 1cac=1cc
- Durée : 10j
- 2/j
- Sirop : 240mg 2/j
- 6sem_5mois : 1/2cam
- 6mois_5ans : 1cam
- 6_12ans : 2cam
- >12ans : 3_4cac

● Cp : 480mg 2/ >13ans

Autres ATB

Flagyl

- 30mg/kg/j
- Durée : 7j
- 3/j

● Sirop : 125mg (Nrs)/ 200mg (Enfant)

- 1cam 3/j

● Cp : 1cp 3/j

- 250mg : >13ans
- 500mg : Adulte

● Flacon : 500mg/8h pour un adulte

- Enfant : 20mg/kg/j

Acide_Fusidique

Fucidine / Zeta

● Sirop : 250mg 40_60mg/kg/j

■ 1ddp ou 1cac 2_3/j

● Cp : 250mg 30_50mg/kg/j

■ >12ans : 1cp 3/j

■ Adulte : 2cp 2_3/j

● Pmd : 1_2app le soir pdt 1sem

Nibiol

● Cp : 50mg 100mg Adulte 2cp 2_3/j

Pyostacine

■ 50mg/kg/j

■ 2_3/j

● Cp : 250mg 500mg

■ >12ans : 1_2cp 2_3/j

■ Adulte : 1g 2_3/j

Dotur

● Cp : 100mg 1cp 1_2/j

■ Adulte :

■ >60kg : 2cp/j en une seule prise

■ <60kg : 2cp/j en 1 prise le 1^{er} j puis 1cp/j

■ >8ans : 4mg/kg/j

Gentamycine

■ 3_8mg/kg/j

■ 7_10j

● Inj : 1inj/j en IM

■ Enfant : 40mg

■ Adulte : 80mg

Ciprolon

- 10_20mg/kg/j

- 2/j pdt 5_14j

● Cp : 250mg 500mg 750mg

- 1cp 2/j

Paracétamol

Doliprane / Efferalgan

- 60mg/kg/j
- 15mg/kg chaque 6h
- 10mg/kg chaque 4h

● Sirop: $\text{Poids}/10 = \text{nb des cam} \Rightarrow 1 \text{ddp}/6\text{h}$

● Suppo/Sachet:

- 3_4kg: 100mg 1/2suppo 4/j
- 6_8kg: 100mg 1supp 4/j
- 8_12kg: 150mg
- 11_16kg: 200mg
- 16_24kg: 300mg
- 27_40kg: cp 500mg

● Cp: >15ans >50kg: 500mg 1cp 3/j

■ Adulte: Cp 1g

Perfalgan

■ En IV 500mg : Enfant 1g : Adulte

■ Enfant : 15mg/kg/j Soit 1.5ml/kg

■ Max 3g/j

■ 1.5cc/kg

■ 250/500mg

Poids + 1/2Poids = ?cc

■ <10kg : 7.5mg × poids/6h perf IV 0.75cc/kg

■ >10kg : 15mg × poids/6h perf IV 1.5cc/kg

Antispasmodiques

1 Débridat / Trimebutine

- 1mg/kg/j
- 2_3/j
- Normalement à partir de 2ans

● Sirop: 250mg

- <6mois: 1/2cac 2/j
- 6mois_1ans: 1cac 2/j
- 1ans_5ans: 1cac 3/j
- >5ans: 2cac 3/j

● Sac: >5ans 1sac 1_2/j

● Cp: >12ans 100mg/200mg

- 1cp 2_3/j

2 Spasfon

● Inj: 80mg déjà diluée en IM ou IVD

0.5mg/kg/6h max 3amp/j

■ 5ans<.. <12 ans: 1/2 amp

■ >12 ans: 1amp

● Lyoc 80mg/160mg

■ >8 ans: 1lyoc 2/j

■ Adulte: 2lyoc 80mg ou 1lyoc 160mg au moment de crise, à renouveler en cas des spasmes importants sans dépasser 6lyocs de 80mg ou 3 de 160mg

● Suppo: 150mg Adulte 1suppo à la demande
1_3/j

✓ Indications :

- Dysménorrhées
- Colique hépatique
- Colique néphrétique
- Intoxication alimentaire
- Colopathies fonctionnelles

3 Bedelix

● Sachet

- <2ans: 1/2sac 2/j
- 2_5ans: 1/2sac 3/j
- 5_10ans: 1sac 2/j
- Adulte: 1sac 3/j

4 Stop colic ou Stop gaz

● Sirop:

- <1mois: 1/2cac 3/j
- 1_6mois: 1cac 3/j
- 6mois_1ans: 2cac 3/j
- >1ans: 2_3cac 3/j

5 Meteospasmyl

● Cp: 1cp 3/j

6 Meteoxane

● Gel: 2gel 2_3/j

7 Dusphatalin

● Gel: 1gel 2_3/j

■ 100mg

■ 200mg LP

8 Timonal

● Sirop: ■ Enfant: 1cac 3/j

■ Adulte: 1cas 3/j

Antiémétiques

15min avant repas

1 Domperidone

- 0.25mg/kg/j Ou 0.25ml/kg/j
- >12ans

● Sirop: 1ddp 3/j

● Cp: 10mg >35kg >13ans

- 1cp 1_3/j
- Max 30mg/j 1sem

Primperan

- Max 5j 1_3/j

- >18ans

- Sirop : >1ans 1ddp 1_3/j

- 15_19kg : 2mg

- 20_29kg : 2.5mg

- 30_60kg : 5mg

- >60kg : 10mg

- Cp : 10mg >18ans 1cp 1_3/j

- Inj : en IM ou IV diluée dans 2cc de SG ou SSI

- ✓ Indications :

- DNV

- Crise de panique

- Nausées/vomissements

- ⊖ Contre indications :

- Occlusion intestinale

3 **Vogalene**

- 1mg/kg/j

- 1_3/j

● Sirop: 1ddp

- >15kg: 1/2_1cac

● Suppo: 2.5mg >7.5kg

- <6ans: 1suppo/5kg/j 1/2 suppo 5mg (ou 1suppo 2.5mg)

- >6ans: 1suppo

● Cp lyoc: >6ans 1lyoc 2_3/j

- >12ans: 1lyoc 2_4/j

- 15kg_12ans: 1lyoc 1_2/j

● Gélules:

- >12ans: 1gel 1_2/j

- 6_12ans >15kg: 1gel 1/j

4 Vomiteb

■ CI <1ans

● Sirop:

■ 1ans_5ans: 1cac 2/j

■ 5ans_12ans: 1cac 3/j

■ >12ans: 2cac 3/j

■ Adulte: 1cas 3/j

● Cp: 1cp 3/j

Antidiarrhéiques

1 Tiopam / Tiorfan

- Durée max: 7j
- 1.5mg/kg par prise

● Sachet: 1sac 3/j

- <15kg: 10mg
- 1_9mois: 1sac 3/j
- 9_30mois: 2sac 3/j

- >15kg: 30mg
- 30mois_9ans: 1sac 3/j
- >9ans: 2sac 3/j

● Gel: 100mg 1gel 2_3/j

2 Smecta

● Sachet: pdt 5j max 7j

▪ <6mois: 1/2sac 1/j

▪ 6mois_1ans: 1sac 1/j

▪ 1ans_2ans: 1sac 2/j

▪ >2ans: 1sac 3/j

▪ Adulte: 1sac 2_3/j

Mais normalement: >2ans!!

3 Loperamide

● Sirop: 0.03mg/kg/j Soit 0.15ml/kg/j

▪ >2ans 1ddp 3/j

● Gel: 2mg 1gel 2_3/j

4 Ercefuryl

- Max 7j

- Gel: 200mg 2gel 2_3/j

5 Ultrabiotique

- Sachet: >2ans et adulte

- 1sac 2/j

- Gel: 50mg 200mg >6ans

- 2gel 50mg 2/j

Ou 1gel 200mg 1/j

Anticonstipants Laxatifs

1 **Lacutolose**

→ **Duphalac / Ezilax / Isolact**

▪Durée: 3j

● Sirop: 1flc

▪<6mois: 1/2cac 1/j

▪6mois_1ans: 1/2cac 2/j

▪1ans_6ans: 1cac 2/j

▪7ans_14ans: 1cac 3/j

▪Adulte: 1cas 2_3/j

2_3/j

▪Nrs: 2.5ml

▪Enfant: 5_7.5ml

▪Adulte: 10_15ml

● Sachet: Adulte 1sac 2_3/j

Ou Adulte:

■ Attaque=> 1_3cas ou 1_3sac/j

■ Puis 2_5cac ou 1_2sac/j

7_14ans:

■ Attaque: 1cas ou 1sac/j

■ Puis 2cac/j

■ 1_6ans:

■ 1_2cac/j

■ <1ans: 1cac/j

2 Forlax

● Sachet: matin

■ 4g:

■ 6mois_1ans: 1sac 1/j

■ 1ans_4ans: 1sac 2/j

■ 4ans_8ans: 1sac 3/j

■ 10g >8ans: 1_2sac 1/j

3 Huile de paraffine

● Sirop: 1flc

■ <1ans: 1cac 1/j

■ 1ans_6ans: 1cac 2/j

■ >6ans: 1cac 3/j

■ Adulte: 1cas 2_3/j

4 Glycérine

● Suppo: Nourrisson/Adulte

- 1 suppo 2/j
- Max 10j

5 Regulax

- Gel rectale
- Un tube le soir

Antihistaminiques

- Durée: 5j le soir

⊖ Sont déconseillés avant 6mois

1 **Primalan**

- 0.5ml/kg/j Ou 2.5ml/5kg/j

- >2ans

⊙ Sirop:

- <40kg: 1càm 2/j 1cam de 2.5ml/5kg/j

- >40kg: 4càm 2/j

- Dermato/Respiratoire

- 2.5ml/5kg/j Ou 0.5ml/kg/j

⊙ Cp: >12ans Adulte 2cp/j

- 30_40kg: 1cp et 1/2/j

- 20_30kg: 1cp/j

2 Histagan

■ Cutané++

Polaramine

● Sirop: 3/j 1flc

■ <30mois: 1/2càm

■ 30mois_10ans: 1càm

■ 10ans_15ans: 2càm

■ >15ans: 4càm ou cp

● Cp: 5mg 1cp 3/j 1bte

■ >12ans: 1cp 3_4/j

■ 6_12ans: 1/2cp 2_3/j

3 Zyrtec

● Goutte: 1bte

- 2_6ans: 5gtt 2/j
- 6_12ans: 10gtt 2/j
- >12ans: 20gtt 1/j

● Cp: 10mg 1cp/j >12ans Adulte

- 6_12ans: 1/2cp 2/j
- Dermatologie: 10mg/ml
- Respiratoire

4 Deslor

- Respiratoire ++

● Sirop: 1flc

- 1_5ans: 1/2cac 1/j

- 6_11ans: 1cac 1/j

- >12ans: 2cac 1/j

● Cp: 5mg >12ans

5 Loratidine

- Respiratoire

● Sirop: 1flc >12ans

- <30kg: 1cam 1/j

- >30kg: 1cam 2/j

● Cp: >12ans >30kg =>10mg 1cp 1/j 1bte

6 Telfast

● Cp >12ans: 1cp 1/j le soir

- 120mg: Respiratoire
- 180mg: Dermatologie

7 Tifen

● Sirop: >6mois

- 6mois_3ans: 1/2cac 2/j
- >3ans: 1cac 2/j

● Cp: 1mg

8 Ebasta

● Cp: 10mg >12ans 1cp/j

9 Xycare

● Cp: 5mg >6ans 1cp/j

■ Femme enceinte 🤰

Telfast, Deslor, Zyrtec, Histagan, Xycare,
Loratidine

■ Femme allaitante

Telfast, Deslor, Loratidine, Xycare

Antitussifs

✓ Femme enceinte 🤰:

- Sèche=> Soothex/Brochocalm
- Grasse=> Prospan/Bronchopan

✓ Allaitement:

- Sèche: Soothex/Bronchocalm
- Mycolytiques
- Fluimucil st
- Mycolyse 5% (adulte)
- Muxol
- Embroxol

✓ Âgé + HTA (Toux sèche)=>

Bronchonet/Bronchopan/Soothex

✓ Diabétique (Toux sèche)=>

Bronchonet/Zecuf/Sinecod

▪ (Toux grasse)=>

Muxol/Embroxol/Soluxol/Prospan SS

▪ Enfant diabétique=> Toplexil SS, Zecuf SS,

▪ Bronchonet SS, Touxkid

✓ Asthmatique=> Bronchonet

✓ Cardiopath=> Bronchocalm

✓ Enfant 🧒:

- Toux grasse (Expectorant): Mycolyse 2%/
 - Rhinathiol 2%/Prospan=> à partir de 2ans
 - Toux sèche: Toux kid, Phytoux junior, Zeal,
 - Bronchocalm enfant
-
- >3mois: Zeal kid 3_5gtt 2_3/j (sèche/Rhume)
 - >2ans: Zecuf, Phytoux 2.5ml (sèche)
 - >2ans: Prospan, Rhinathiol 2% (grasse)
 - Touxkid:
 - 2ans_6ans: 1cac 3/j
 - 6ans_15ans: 2cac 3/j
 - Si non: AH pdt 5j=> Deslor, Primalan, Histagan

Toplexil

Toux sèche allergique, irritative, non productive, nocturne max 5j

- 13_20kg 2ans_6ans: 1cac 3/j 5ml 2_3/j
- 20_30kg 6ans_10ans: 2cac 2/j 10ml 2_3/j
- 30_40kg 10ans_12ans: 2cac 3/j 10ml 3_4/j
- >40kg >12ans Adulte: 1cas 3/j 10ml 4/j

Sinecod

Toux sèche, diabétique, CI chez la FE  et asthmatique

- 6_12ans: 10ml 3/j
- >12ans: 15ml 3/j
- >16ans Adulte: 1cas 3/j 15ml 4/j

Prospan

Toux productive, bénigne occasionnelle, CI chez la FE

- Max 7j
- 2ans_5ans: 1/2cac 2/j 2.5ml
- 6ans_11ans: 1cac 2/j 5ml
- >12ans: 1cac 3/j
- Adulte 5ml 3/j

Bronchocalm

Toux sèche, >6ans ou >20kg

- Enfant et Adulte: 1cam 3/j
- 30mois_6ans: 2.5ml 4/j
- 6_12ans: 5ml 3_4/j
- 12_15ans: 5ml 4/j
- Adulte: 15ml 3_4/j

Zecuf

Sucré/sans sucre

- 5_10ans: 1/2cac 3/j
- 10_15ans: 1cac 3/j
- Adulte 1cas 3/j

Carbocisteine Rhinathiol/Mycolyse/Carbomax

- Normalement >15ans max 5j
- 2ans_5ans: 1cac 2/j
- >5ans: 1cac 3/j
- Adulte: 3cac 3/j 15ml 3/j

Muxol

>15ans, CI chez la FE

- Max 7j 1cas 2/j

Rhinathiol

Toux grasse

>5ans: 1cac 3/j

2_5ans: 1cac 2/j

Fluimucil

Toux grasse

1sachet 3/j

AINS

- Max: 5j au milieu de repas

+ IPP 20mg

⊖ CI: Ulcère, grossesse, allaitement, IR, IC, Asthme, Crohn, Antiagrégants, AVK

Inj CI chez les Cardiopathes ..

1 **Diclofenac de sodium**

Clofenal / Voltarene...

- >15ans

⊙ Cp: 1cp/8h

- Enfant: 25mg 1cp 2_3/j 2_3mg/kg/j

- Adulte: 50mg 75mg Lp 100mg 1cp 2_3/j

● Suppo: 1suppo soir

■ Nrs: 12.5mg

■ E: 25mg

■ A: 100mg

● Inj: 75mg Adulte 1inj/j en IM

● Gel: 1app 2_3/j le soir pdt 4j max 7j

2 Naproxène sodique

Nopain..

● Cp: 275mg 550mg

■ >15ans 1cp 1_2/j

3 Diclofenac de potassium

Rapidus..

● Cp: 50mg 1cp 2/j

=> Traumatisme, fracture, fissure, entorse

Hypertendu

4 Ibuprofène

Xydol...

=> Cervicalgies..

● Sirop: Nrs Enfant

■ 1ddp/8h

● Cp: 200mg >8ans, 400mg >15ans et >30kg,
600mg

■ 1cp/8h

Algifene

- Max 5j

- 20_30mg/kg/j Ou 1ml/kg/j

- Sirop: <20kg: 1ddp 3/j

- Cp: 1cp 2/j

- 20_30kg: 100mg

- >11ans >30kg: 200mg max 6cp de 200mg

5 Morniflumate

Celebrex..

- 40mg/kg 1_3/j pdt 4j

- Max: 20mg/j

- Gélules: 100mg 200mg adulte 1gel 2_3/j

- Suppo: 1suppo le soir

- Nrs: 200mg

- Enfant: 400mg

- Adulte: 700mg

- Gel: Adulte 1app le soir

- Sujet âgé, hypertendu, cardiopath, diabétique

=> Celebrex 100mg 200mg

Nifluril

● Suppo: 6_30mois: 200mg 1suppo 2/j

■ 30mois_13ans: 400mg/10kg 1suppo 2_3/j

■ Adulte: 700mg

● Gel: >13ans: gélule 250mg 1gel 2/j

6 **Ketoprofène**: Puissant

Profinid...

● Sirop: Nrs/E 1ddp/8h

● Gélules: 200mg Lp

● Cp: 1cp 100mg 2/j Adulte

100mg 200mg Lp

● Suppo: 100mg 1suppo Adulte 1suppo le soir

● Inj: 100mg 1inj/j en IM Adulte

● Gel: 1app/j le soir Adulte

● Patch: 1patch/48h

⊖ Hypertendu: Celebrex, Rapidus, Ketoneed
100mg, Ketoprofen 100mg, Naproxene 250mg

Corticoïdes

1 prise par jour le matin, pdt 3j, sans dépasser 5j

1 Celestene

● Gouttes: $<10\text{kg} \Rightarrow 10\text{gtt/kg/j}$ le matin après repas pdt 5j

2 Solupred

● Cp: $>10\text{kg} \Rightarrow 5\text{--}20\text{mg}$ 1mg/kg/j pdt 5j matin

- Adulte: 20mg

- Enfant: 5mg

3 **Physiolone**

● Sirop 1ddp/j en monodose matin pdt 5j
0.2_0.5ml/kg/j

ex: 9kg=> 9ml/j

4 **Predo**

● Sirop (poids /3)= ? ml prise unique le matin

ex: 9kg=> 3ml/j

5 Solumedrol

- Méthylprédnisolone (Anti_inflammatoire)

- 20mg 40mg 80mg 120mg en IM ou IVD

● Cp 4mg/16mg: 0.5mg/kg/j

● IM: 20/40/80mg: 1mg/kg/j

- Enfant >6ans: 20mg max: 40mg

- Adulte: 20_60mg/j 2_3/j inj IM ou IV

- 1_2mg/kg en IVL sur 5_10min

- Dilution dans SG ou SSI

- Traumatisme médullaire: 30mg/kg/45min puis 5,4mg/kg/h pdt les 23h restantes

✓ Indications:

- Crise d'asthme
- Piqûre d'insecte
- Réaction allergique
- Œdème de Quincke
- Traumatisme du rachis
- Réactions inflammatoires
- Œdème laryngé, laryngite, épiglottite

⊖ Effets secondaires:

- HTA
- UGD
- Allergie
- Hémorragie digestive
- Arythmie si IV trop rapide

6 Dexamethasone

■ 1 amp de 4mg

● Inj : 0.5mg/kg/j en IM max : 12mg

Cp/inj

■ Adulte : 0.5_9mg/kg/j

■ Ou 0.6mg/kg en IM

■ Échec après 1h : 0.4mg/kg

■ Laryngite Nébulisation=> 1 amp + Adrénaline
1cc + 4cc SSI

7 Prednisone

Cortancyl >6ans

● Cp: 5mg 20mg 0.5mg/kg/j

Hydrocortisone

● Inj: Enfant: 5mg/kg en IV/IM

- Max: 100mg pour un enfant
- 100_200mg pour un adulte
- Dilution dans 2cc de SG5% ou SSI
- La dégression progressive de la dose des corticoïdes se fait en cas:
 - Traitement de plus de 3 semaines
 - Dose ≥ 20 mg/j de prednisone
 - Signes de syndrome de Cushing (prise de poids, visage lunaire...)
 - Patient déjà traité par les corticoïdes récemment

✓ Indications:

- Laryngite
- Œdème laryngé
- Œdème de Quincke
- Asthme aigu grave
- Toux sèche gênante

IPP

1_2/j

1 Oméprazole

1mg/kg/j

Matin à jeun

Pdt sem!

● Gélules: 1gel/j

- 10mg: 10_20kg
- 20mg: >20kg et adulte

● Inj: 40mg

2 **Lansoprazole**

● Gel: 30mg 1gel/j

3 **Esoméprazole**

● Gel: 20mg 40mg 1gel/j >12ans

4 **Pantoprazole**

● Gel: 40mg 1gel/j >18ans, max 3sem

5 **Ranitidine**

● Cp: 150mg 300mg

- >12ans 1cp de 300mg ou 2cp de 150mg /j
- 3_11ans >30kg: 4_8mg/kg/j 2/j max 300mg/j
- Enfant: >15kg 5_10mg/kg/j 2/j max 600mg/j

● Inj en IM à la demande

- 1mg/kg/8h

Lovenox

● Curative: 2/j

- 100ui/kg ou 0.01ml/kg ou 1mg/kg
- 0.1ml ou 0.1cc pour chaque 10kg 2/j
- Sans dépasser 1cc/j

● Préventive: 1/j

- 150ui/kg ou 1.5mg/kg
- 0.4ml ou 0.4cc/j
- Si BMI >35=> 0.4
- Si poids >150=> 0.6

Exemple: pour un 70kg=> 0.7cc

- On utilise 0.8cc après élimination de 0.1cc

⊖ CI Si clairance rénale <30

Maux au gorge

Durée: 5j

1 **Maxilase**: sèche

● Sirop: 1flc

- >15kg >3ans: 2cac 3/j
- Adulte: 1cas 3/j Ou 1cp

2 **Hexaspray**

- Pulv >6ans
- 2pulv 3/j

3 **Thymoseptine**: productive

● Sirop: 3/j 1flc

- 3_6ans: 1cac 5ml
- 7_12ans: 2cac 10ml
- >12ans: 3cac 15ml 4/j

Nobac

- Antireflux/Antiacide

Après repas

● Sirop: 1_2ml/kg/j max 20ml/j

- Nourrisson:

- <1mois: 1ml

- 1_2mois: 1.5ml

- 2_4mois: 2ml

- 4_18mois: 2.5ml

- 18mois_6ans: 5ml

- Enfant/Adulte:

- 2ans_6ans: 1cac 2/j

- 6ans_12ans: 1cac 3/j

- >12ans: 2cac 10ml Ou 1cp ou 1sac 3/j

