




Radio du Thorax

MODÈLE DE LECTURE :

- Extérieur du thorax

- Parties molles extra-thoraciques

**- Structures osseuses et régions sous
diaphragmatiques**

Plèvre

- Parenchyme pulmonaire

- Médiastin



CRITÈRES DE BONNE QUALITÉ :



① Cliché de face

(extrémités internes des clavicules sont à égales distance des épineuses dorsales)

② Cliché debout

(Poche à air gastrique sous la coupole gauche avec un niveau hydro aérique)

③ Cliché pris en inspiration profonde

(Visualisation de 6 à 7 arcs costaux antérieurs au-dessus des coupoles diaphragmatiques)


④ Cliché bien exposé, scapula dégagées

SYNDROME BRONCHIQUE :

Épaississement des parois bronchiques :

- OPACITÉS EN RAILS : si bronche est perpendiculaire au rayon incident
- IMAGE CERCLÉE : si vue en tangence


Dilatation des bronches



SYNDROME INTERSTITIEL :

Image radiologique normale OU

**Images linéaires "réticulaires"
Images nodulaires**



CARACTÉRISTIQUES :

Images non confluentes ;
bilatérales et non
systématisées ; souvent
d'évolution lente ; masquées
par le syndrome alvéolaire
si association



SYNDROME ALVÉOLAIRE :

= condensation parenchymateuse non rétractile

CARACTÉRISTIQUES :

Opacités à contours flous ; opacités confluentes ;
distribution systématisée à contour net ;
bronchogramme aérien ; évolution plutôt rapide

2 PRINCIPALES ÉTIOLOGIES :

Opacité localisé et aiguë
(pneumopathies infectieuses) ;
opacités alvéolaires bilatérales
diffuses et aiguës (OAP)



SYNDROME PLEURAL :

● Pneumothorax :

Irruption d'air entre les 2
feuilletts de la plèvre



Complet : moignon pulmonaire rétracté vers la région hilare

Compressif : déplacement du médiastin du côté opposé +/- associé à une distension des espaces intercostaux

● Hémo-pneumothorax :

Épanchement pleural liquidien surmonté d'une clarté gazeuse

● **Pleurésie :** Opacité franche hydrique

● Calcifications pleurales :


Images de haute densité / images périphériques le long de la paroi du médiastin ou du diaphragme

SYNDROME DE MASSE :

Micronodule : Opacité ronde < 3 mm

Nodule : Opacité ronde de 3 mm à 3 cm

Masse : Image arrondie intra-parenchymateuse > 3 cm



SYNDROME MÉDIASTINAL :

Compartiment

Étage	Antérieur	Moyen	Postérieur
Supérieur	Goitre thyroïdien	Adénopathies	Tumeur neurogène
Moyen	Lésions thymiques	Adénopathies Kyste bronchogénique	Tumeur neurogène
Inférieur	Kyste pleuro péricardique	Kyste bronchogénique	Tumeur neurogène

Cardiomégalie :

Index cardio-thoracique $> 0,55$:
 largeur du cœur / largeur max du thorax

ATÉLECTASIE :

= condensation alvéolaire rétractile

Disparition de l'air alvéolaire due à un
collapsus complet des alvéoles

Opacité pulmonaire systématisée rétractile

