

# Лабораторная работа №5

Ларин Егор. 4 группа 2 курс

24 мая 2022 г.

## Теория

$$f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$a = 1, b = 2, k = 4$$

$$\boxed{\varepsilon = 10^{-7}}$$

$$h = \frac{b-a}{n}$$

$$I = \int_a^b f(x)dx - ?$$

## Правило Рунге

1.

$$Q_1 = Q(n)$$

$$Q_2 = Q(2n)$$

2.

$$R = \frac{Q_2 - Q_1}{2^m - 1},$$

где  $m$  – порядок точности КФ,  $n$  – число разбиений отрезка  $[a, b]$ .

3. Если  $|R| \leq \varepsilon$ , то прекращаем вычисления и  $I \approx \hat{Q} = Q_2 + R$ .

4. В ином случае  $Q_1 = Q_2, Q_2 = Q(4n)$  и возвращаемся к шагу 2.

## КФ Симпсона

$$I \approx Q^C = \frac{h}{3} \cdot \sum_{i=1,2}^{n-1} f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})$$

$$m = 4$$

## КФ трапеций

$$I \approx Q^T = h \cdot \left( \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

$m = 2$

## КФ НАСТ

$p(x) = 1$ , значит в качестве ортогонального многочлена степени  $k$  можно выбрать многочлен Лежандра  $P_n(x)$  степени  $k$ .

$$P_3(x) = \frac{1}{2} \cdot (5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8} \cdot (35x^4 - 30x^2 + 3)$$

Коэффициенты КФ могут быть найдены как

$$A_i = \frac{2}{k^2} \cdot \frac{1 - x_i^2}{P_3(x_i)^2}, P_4(x_i) = 0, i = \overline{1, 4}$$

$$x_1 = -0.861136311$$

$$x_2 = 0.861136311$$

$$x_3 = -0.339981043$$

$$x_4 = 0.339981043$$

В итоге имеем

$$\begin{aligned} Q^H = & \frac{b-a}{2} (0.34785485202283456 f(\frac{a+b}{2} + x_1 \frac{b-a}{2}) \\ & + 0.34785485202283456 f(\frac{a+b}{2} + x_2 \frac{b-a}{2}) \\ & + 0.6521451563287455 f(\frac{a+b}{2} + x_3 \frac{b-a}{2}) \\ & + 0.6521451563287455 f(\frac{a+b}{2} + x_4 \frac{b-a}{2})) \end{aligned}$$

## Листинг кода

---

```
eps = 1.0e-7
a = 1
b = 2
f x = exp x / (1 + x ^ 2)
integrateTrapezoid n = h * sum ((f a + f b) / 2 : [f x | x <- [a +
integrateSimpsons n = h / 3 * sum [f (x - h) + 4 * f x + f (x + h)
runge i m n = if abs r < eps then q2 + r else runge i m (n * 2)
```

```

where q1 = i n
      q2 = i (2 * n)
      r = (q2 - q1) / (2 ** m - 1)
xs = [-0.861136311, 0.861136311, -0.339981043, 0.339981043]
p x = 2.5 * x ** 3 - 1.5 * x
c k = (1 - (xs !! k ** 2)) / (8 * (p (xs !! k) ** 2))
sub x = (a + b) / 2 + x * (b - a) / 2
gauss = (b - a) / 2 * sum [c i * f (sub (xs !! i)) | i <- [0 .. 3]]

main = do
  print gauss
  print $ runge integrateSimpsons 4 1
  print $ runge integrateTrapezoid 2 1

```

---

## Результаты вычислительного эксперимента

$$Q^H = 1.392468989526053$$

$$Q^C = 1.392468998110868$$

$$Q^T = 1.3924689981257685$$

| КФ       | $n$ | $h$        | $Q(n)$             | $R(n)$                 |
|----------|-----|------------|--------------------|------------------------|
| Симпсона | 1   | 1.0        | 3.09297982856427   | -                      |
|          | 2   | 0.5        | 1.392146190610417  | -0.11338890919692353   |
|          | 4   | 0.25       | 1.3924437660220899 | 1.9838360778197856e-5  |
|          | 8   | 0.125      | 1.3924673509960468 | 1.5723315971290693e-6  |
|          | 16  | 0.0625     | 1.3924688942332293 | 1.0288247883257402e-7  |
|          | 32  | 0.03125    | 1.3924689916185156 | 6.4923524186374e-9     |
| Трапеций | 1   | 1.0        | 1.4184760670078265 | -                      |
|          | 2   | 0.5        | 1.3987286597097692 | -1.3164938198704827e-3 |
|          | 4   | 0.25       | 1.39401498944401   | -3.142446843839538e-4  |
|          | 8   | 0.125      | 1.3928542606080376 | -7.738192239815274e-5  |
|          | 16  | 6.25e-2    | 1.3925652358269314 | -1.9268318740417455e-5 |
|          | 32  | 3.125e-2   | 1.39249305267062   | -4.812210420753379e-6  |
|          | 64  | 1.5625e-2  | 1.3924750114568611 | -1.2027475839282431e-6 |
|          | 128 | 7.8125e-3  | 1.3924705014395398 | -3.0066782142531185e-7 |
|          | 256 | 3.90625e-4 | 1.3924693739530933 | -7.516576309522331e-8  |

## Выводы

Практический метод оценки численного интегрирования квадратурными формулами Рунге действительно позволяет найти приближенное значение интеграла с заданной точности, а квадратурная формула НАСТ построенная по методу Гаусса с весовой функцией равной единице позволяет найти

приближенное значение интеграла с соизмеримой точностью без итерационного процесса.