

PROJECT I  
SK5004  
PENGANTAR SAINS KOMPUTASI

Mohammad Rizka Fadhli  
20921004

21 October 2022

# Contents

<b>1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>5</b>
1.1	Masalah . . . . .	5
1.2	Bahasa Pemrograman . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Dasar Teori</b>	<b>6</b>
2.1	<i>Unconstrained Growth and Decay</i> . . . . .	6
2.2	<i>Finite Difference Equation</i> . . . . .	7
2.3	Algoritma Euler . . . . .	7
2.4	Algoritma Runge Kutta 4 <sup>th</sup> . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Model Matematika</b>	<b>10</b>
3.1	Diagram Model . . . . .	10
3.2	Persamaan Diferensial . . . . .	10
3.3	Algoritma Penyelesaian . . . . .	11
3.4	Program Model Matematika . . . . .	12
	3.4.1 Program dengan Metode Euler . . . . .	12
	3.4.2 Program dengan Metode Runge Kutta 4 <sup>th</sup> . . . . .	15
<b>4</b>	<b>Diskusi</b>	<b>15</b>
4.1	Simulasi . . . . .	15
4.2	Grafik Hasil Simulasi . . . . .	16
<b>5</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>17</b>

## List of Tables

1	Parameter Simulasi Program Euler . . . . .	14
2	Parameter di Soal . . . . .	15

## List of Figures

1	Ilustrasi Peluruhan . . . . .	6
2	Ilustrasi Pertumbuhan . . . . .	7
3	Diagram Model . . . . .	10
4	Hasil Simulasi Program Euler . . . . .	14
5	Ilustrasi Hasil Simulasi Menggunakan Parameter Soal . . . . .	16

# 1 Pendahuluan

Sains komputasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari penyelesaian berbagai masalah dalam sains melalui pendekatan komputasi. Salah satunya adalah mencari solusi dari persamaan diferensial yang merupakan fungsi kontinu menggunakan pendekatan yang bersifat diskrit. Sebagai pembahasan pada laporan ini, diberikan satu masalah persamaan diferensial berupa *unconstrained growth and decay* dari suatu permasalahan peluruhan dan pembentukan beberapa zat radioaktif lalu kemudian akan diselesaikan menggunakan metode pendekatan diskrit.

## 1.1 Masalah

Laju peluruhan suatu zat radioaktif bisa dituliskan dalam persamaan diferensial berikut ini:

$$\frac{dQ}{dt} = -rQ(t)$$

Untuk suatu  $r$  bernilai positif (*decay rate*) dan  $Q(t)$  adalah fungsi massa zat radioaktif terhadap waktu ( $t$ ). Suatu zat radioaktif bisa luruh membentuk zat radioaktif lainnya membuat rantai reaksi.

Buatlah model rantai reaksi radioaktif yang berisi 3 elemen: dari zat A luruh menjadi zat B dan luruh menjadi zat C!

## 1.2 Bahasa Pemrograman

Saya menggunakan bahasa pemrograman **R** versi 4.0.4 untuk membuat program dan melakukan simulasi untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

## 2 Dasar Teori

### 2.1 *Unconstrained Growth and Decay*

Model *unconstrained growth and decay* pada dasarnya merupakan model pertumbuhan atau peluruhan yang laju perubahannya proporsional dengan populasi (kondisi) saat ini. Populasi akan bertambah atau berkurang tanpa ada batasan atau hal yang menghalangi perubahannya. Pada masalah yang dihadapi, suatu zat radioaktif akan meluruh mengikuti persamaan diferensial berikut:


$$\frac{dQ}{dt} = -rQ(t)$$

dan akan bertambah juga mengikuti persamaan diferensial berikut:

$$\frac{dQ}{dt} = rQ(t)$$

Perbedaannya adalah pada nilai  $r$  yang kelak akan digunakan untuk masing-masing zat radioaktif  $A$ ,  $B$ , dan  $C$ .

Solusi analitik dari peluruhan adalah:  $P = P_0 e^{-rt}$



20921004  
Mohammad Rizka Fadhl

Figure 1: Ilustrasi Peluruhan

sedangkan solusi analitik dari pertumbuhan adalah:  $P = P_0 e^{rt}$




Figure 2: Ilustrasi Pertumbuhan

## 2.2 *Finite Difference Equation*

Pendekatan diskrit untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan komputer adalah dengan membuat persamaan kontinu di atas menjadi bentuk persamaan beda. Komputer tidak bisa menyelesaikan masalah pada  $t$  kontinu, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan diskrit berupa laju perubahan pada  $\Delta t$  yang relatif kecil. Bentuk umum persamaan beda adalah sebagai berikut:

$$\text{new value} = \text{old values} + \text{change in value}$$

Berdasarkan bentuk di atas, saya akan membuat dua algoritma untuk menyelesaikannya, yakni:

## 2.3 Algoritma Euler

Algoritma Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah sebagai berikut:

```
initialize
  sim_length
  population
```

```

rate
dt
compute:
  rate_per_step = rate * dt
  num_iter = sim_length / dt
for i: 1 to num_iter do
  population = population + rate_per_step * population
  t = i * dt
  print(t, population)

```

## 2.4 Algoritma Runge Kutta 4<sup>th</sup>

Bentuk umum dari metode Runge Kutta orde 4 adalah sebagai berikut:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^n b_i k_i$$

dimana:

1.  $y(t = 0)$  diketahui.
2.  $k_i$  adalah konstanta yang harus dicari.

Berikut adalah algoritmanya:

```

initialize
  f # fungsi persamaan diferensial
  x0
  y0
  h
  sim_length
  rate
  dt

compute:
  num_iter = sim_length / dt

for i: 1 to num_iter do
  compute:
    k1 = f(x0,y0)

```



```
k2 = f(x0 + 0.5*h,y0 + 0.5*k1*h)
k3 = f(x0 + 0.5*h,y0 + 0.5*k2*h)
k4 = f(x0 + h,y0 + k3*h)
y0 = y0 + (1/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) * h
x0 = x0 + h
print(x0,y0)
```

### 3 Model Matematika

Untuk membuat model matematika dari permasalahan ini, saya akan membuat diagram dari model sehingga hubungan antara ketiga zat radioaktif tersebut bisa terlihat dengan jelas.

#### 3.1 Diagram Model

Berikut ini adalah diagram model:




Figure 3: Diagram Model

Zat A akan luruh dengan laju sebesar  $r_A$  membentuk zat B dengan laju pertumbuhan sebesar  $r_A$  juga. Kemudian zat B akan luruh dengan laju sebesar  $r_B$  membentuk zat C dengan laju pertumbuhan sebesar  $r_B$  juga. Kemudian zat C akan luruh dengan laju sebesar  $r_C$ .

#### 3.2 Persamaan Diferensial

Berdasarkan diagram dan keterangan di atas, kita dapatkan bahwa:

1. Perubahan massa zat A hanya bergantung pada peluruhan saja.
2. Perubahan massa zat B bergantung pada pembentukan dan peluruhan.
3. Perubahan massa zat C bergantung pada pembentukan dan peluruhan.

Dari sini, maka didapatkan sistem persamaan diferensial sebagai berikut:

Model perubahan massa zat A:

$$\frac{dA}{dt} = -r_A A$$

Model perubahan massa zat B:

$$\frac{dB}{dt} = r_A A - r_B B$$

Model perubahan massa zat C:

$$\frac{dC}{dt} = r_B B - r_C C$$

### 3.3 Algoritma Penyelesaian

Berikut adalah algoritma penyelesaian dengan cara mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan beda hingga:

```
# definisi dan initial condition
r_a    # rate peluruhan A dan pertumbuhan B
r_b    # rate peluruhan B dan pertumbuhan C
r_c    # rate peluruhan C

q_a    # massa awal zat radioaktif A
q_b    # massa awal zat radioaktif B
q_c    # massa awal zat radioaktif C
t       # waktu awal t = 0

dt      # delta t
iter_length # panjang iterasi
num_iter = iter_length / dt # berapa banyak iterasi

# proses iterasi
for i in 1 to num_iter do
    # peluruhan A dan pertumbuhan B
    rate_1 = r_a * q_a[i-1] * dt

    # peluruhan B dan pertumbuhan C
    rate_2 = r_b * q_b[i-1] * dt

    # peluruhan C
```

```

rate_3 = r_c * q_c[i-1] * dt

# perhitungan massa zat A
q_a[i] = q_a[i-1] - rate_1
# perhitungan massa zat B
q_b[i] = q_b[i-1] + rate_1 - rate_2
# perhitungan massa zat C
q_c[i] = q_c[i-1] + rate_2 - rate_3
# perhitungan massa waktu
t[i] = t[i-1] + dt

print(t,q_a,q_b,q_c)

```

Algoritma di atas merupakan penerapan metode Euler untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial.

### 3.4 Program Model Matematika

Pada bagian ini, saya akan membuat dua program untuk menyelesaikan permasalahan ini, yakni:

#### 3.4.1 Program dengan Metode Euler

```

# INPUT dari user:
# rate peluruhan A dan pertumbuhan B
r_a = readline(prompt = "Rate peluruhan A: ") %>% as.numeric()
# rate peluruhan B dan pertumbuhan C
r_b = readline(prompt = "Rate peluruhan B: ") %>% as.numeric()
# rate peluruhan C
r_c = readline(prompt = "Rate peluruhan C: ") %>% as.numeric()
# massa awal zat radioaktif A
qa0 = readline(prompt = "massa awal zat radioaktif A: ") %>% as.numeric()
# massa awal zat radioaktif B
qb0 = readline(prompt = "massa awal zat radioaktif B: ") %>% as.numeric()
# massa awal zat radioaktif C
qc0 = readline(prompt = "massa awal zat radioaktif C: ") %>% as.numeric()
# delta t

```

```

dt0 = readline(prompt = "nilai delta t: ") %>% as.numeric()
# panjang iterasi
iter_length = readline(prompt = "seberapa panjang iterasi dilakukan: ") %>%
  as.numeric()

# proses perhitungan dengan metode Euler
q_a = c(qa0) # array massa zat radioaktif A
q_b = c(qb0) # array massa zat radioaktif B
q_c = c(qc0) # array massa zat radioaktif C
t = c(0)     # waktu awal t = 0
dt = dt0
num_iter = (iter_length / dt) + 1

# proses iterasi
for(i in 2:num_iter){
  # peluruhan A dan pertumbuhan B
  rate_1 = r_a * q_a[i-1] * dt
  # peluruhan B dan pertumbuhan C
  rate_2 = r_b * q_b[i-1] * dt
  # peluruhan C
  rate_3 = r_c * q_c[i-1] * dt

  # perhitungan massa zat A
  q_a[i] = q_a[i-1] - rate_1
  # perhitungan massa zat B
  q_b[i] = q_b[i-1] + rate_1 - rate_2
  # perhitungan massa zat C
  q_c[i] = q_c[i-1] + rate_2 - rate_3
  # perhitungan massa waktu
  t[i] = t[i-1] + dt
}

# membuat data output
df = data.frame(t,q_a,q_b,q_c)
# print output pada layar

```

```
print(df)
```

Berikut adalah *screenshot* saat program dijalankan dengan parameter sebagai berikut:

Table 1: Parameter Simulasi Program Euler

Parameter	Value
r_a	0.50
r_b	0.40
r_c	0.30
qa0	10.00
qb0	0.00
qc0	0.00
dt0	0.25
iter_length	5.00

```
> source("Program Euler.R")
Rate peluruhan A: .5
Rate peluruhan B: .4
Rate peluruhan C: .3
massa awal zat radioaktif A: 10
massa awal zat radioaktif B: 0
massa awal zat radioaktif C: 0
nilai delta t: .25
seberapa panjang iterasi dilakukan: 5
  t      q_a      q_b      q_c
1 0.00 10.0000000 0.000000 0.000000
2 0.25  8.7500000 1.250000 0.000000
3 0.50  7.6562500 2.218750 0.125000
4 0.75  6.6992188 2.953906 0.337500
5 1.00  5.8618164 3.495918 0.6075781
6 1.25  5.1290894 3.879053 0.9116016
7 1.50  4.4879532 4.132284 1.2311368
8 1.75  3.9269590 4.280050 1.5520299
9 2.00  3.4360892 4.342915 1.8636327
10 2.25 3.0065780 4.338134 2.1581517
11 2.50 2.6307558 4.280143 2.4301037
12 2.75 2.3019113 4.180973 2.6758603
13 3.00 2.0141724 4.050615 2.8932681
14 3.25 1.7624008 3.897325 3.0813345
15 3.50 1.5421007 3.727893 3.2399669
16 3.75 1.3493381 3.547866 3.3697586
17 4.00 1.1806709 3.361747 3.4718133
18 4.25 1.0330870 3.173156 3.5476020
19 4.50 0.9039511 2.984976 3.5988474
20 4.75 0.7909572 2.799472 3.6274315
21 5.00 0.6920876 2.618395 3.6353213
```

Figure 4: Hasil Simulasi Program Euler

Program tersebut saya simpan dengan nama **Program Euler.R** dan saya lampirkan bersamaan dengan laporan ini. Untuk menggunakannya, silakan buka **R** dan ketikkan perintah `source("Program Euler.R")`.

### 3.4.2 Program dengan Metode Runge Kutta 4<sup>th</sup>

## 4 Diskusi

Sekarang saya akan *run* program Euler menggunakan parameter yang ada di soal.

### 4.1 Simulasi

Berikut adalah parameter di soal:

Table 2: Parameter di Soal

Parameter	Value
r_a	0.0137
r_b	0.0510
r_c	0.0000
qa0	0.0000
qb0	0.0000
qc0	0.0000
dt0	0.5000
iter_length	10.0000

Massa zat A adalah  $S \times 10^{-8}$  dengan  $S$  adalah 2 digit terakhir NIM saya (20921004). Sehingga  $S = 4$ . *Rate* peluruhan untuk zat C saya buat sama dengan nol (karena tidak dinyatakan dalam soal).

##	t	q_a	q_b	q_c
## 1	0.0	4.000000e-08	0.000000e+00	0.000000e+00
## 2	0.5	3.972600e-08	2.740000e-10	0.000000e+00
## 3	1.0	3.945388e-08	5.391361e-10	6.987000e-12
## 4	1.5	3.918362e-08	7.956472e-10	2.073497e-11
## 5	2.0	3.891521e-08	1.043766e-09	4.102397e-11
## 6	2.5	3.864864e-08	1.283719e-09	6.764001e-11

```

## 7  3.0 3.838390e-08 1.515727e-09 1.003748e-10
## 8  3.5 3.812097e-08 1.740006e-09 1.390259e-10
## 9  4.0 3.785984e-08 1.956765e-09 1.833961e-10
## 10 4.5 3.760050e-08 2.166207e-09 2.332935e-10
## 11 5.0 3.734294e-08 2.368532e-09 2.885318e-10
## 12 5.5 3.708714e-08 2.563934e-09 3.489294e-10
## 13 6.0 3.683309e-08 2.752600e-09 4.143097e-10
## 14 6.5 3.658078e-08 2.934716e-09 4.845010e-10
## 15 7.0 3.633020e-08 3.110459e-09 5.593363e-10
## 16 7.5 3.608134e-08 3.280004e-09 6.386530e-10
## 17 8.0 3.583419e-08 3.443521e-09 7.222931e-10
## 18 8.5 3.558872e-08 3.601175e-09 8.101028e-10
## 19 9.0 3.534494e-08 3.753128e-09 9.019328e-10
## 20 9.5 3.510283e-08 3.899536e-09 9.976376e-10
## 21 10.0 3.486237e-08 4.040552e-09 1.097076e-09

```

## 4.2 Grafik Hasil Simulasi

Berikut ini adalah grafiknya jika saya perpanjang nilai  $t$ -nya menjadi 300 dan  $dt = 0.05$  :




Figure 5: Ilustrasi Hasil Simulasi Menggunakan Parameter Soal



Terlihat bahwa zat A luruh sepenuhnya membentuk zat B yang kemudian luruh sepenuhnya sehingga hanya menyisakan zat C yang terus bertumbuh hingga massanya sebesar  $Q_A(t = 0)$ .

## 5 Kesimpulan