Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú Processo Seletivo Simplificado • Edital 003/2020

http://2020saudebalneariocamboriu.fepese.org.br

# CADERNO DE PROVA

## 3S15 Médico ESF

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este caderno de prova.
- um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

## Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



18 de janeiro



35 questões



19h20 às 22h20



3h de duração\*





a. □ V•V•F•V•F
b. ☑ V•V•F•F•V
c. □ V•F•V•F•V
d. □ F•V•F•V•F
e. □ F•F•V•V•F

<b>4.</b> Assinale a alternativa em que a vírgula foi corretamente usada e a justificativa para seu uso também está correta.	Conhecimentos Atuais 5 questões
<ul> <li>a.  Estão produzindo, todavia peças esculpidas lindíssimas. (separar oração subordinada)</li> <li>b.  Toda beleza advém, por óbvio do olhar, de quem a vê. (separar elemento intercalado)</li> </ul>	<b>6.</b> Assinale a alternativa que indica <b>corretamente</b> órgão normativo e deliberativo da Organização das Nações Unidas (ONU), onde todos os países membros têm representação igualitária.
<ul> <li>c.  A surpreendente poesia daquele autor para um ovo, despertou a curiosidade, pela leitura, de seus outros poemas. (separar termos em orações coordenadas assindéticas)</li> <li>d.  A ventania levou árvores, e telhados, e pon-</li> </ul>	<ul> <li>a. ☑ Assembleia-Geral.</li> <li>b. ☐ Conselho de Segurança.</li> <li>c. ☐ Conselho Econômico e Social.</li> <li>d. ☐ Conselho de Administração Fiduciária.</li> <li>e. ☐ Corte Internacional de Justiça.</li> </ul>
tes, e animais. (separar entre si elementos subordinados) e. O ovo, por causa de sua perfeição, foi exaltado por um poeta. (marca intercalação de um adjunto adverbial)	7. Assinale a alternativa que indica corretamente organismo internacional composto por vários países com sede em Paris que se constitui em um fórum dedicado à promoção de padrões internacionais em questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais.
<b>5.</b> Os períodos listados na coluna 2 apresentam em sua oração subordinada um dos sentidos indicados na coluna 1.	<ul> <li>a.  Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).</li> <li>b.  Comunidade Econômica Europeia (CEE).</li> <li>c.  Organização Mundial do Comércio (OMC).</li> </ul>
Relacione corretamente as colunas 1 e 2.	d. 🗹 Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
<ol> <li>Coluna 1 Sentidos</li> <li>Causa</li> <li>Consequência</li> <li>Concessão</li> </ol>	mento Econômico (OCDE).  e. Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).
4. Condição 5. Finalidade	<ul> <li>8. Assinale a alternativa correta.</li> <li>a.   A Europa é o maior continente do mundo.</li> </ul>
<ul> <li>Coluna 2 Períodos</li> <li>( ) Como ainda possuíam um pouco de gentileza, começaram a receber bem os convidados.</li> <li>( ) A alegria morava tão vizinha que, de insano, pensei que fosse minha.</li> <li>( ) Se o poeta olhasse a natureza, veria muita</li> </ul>	<ul> <li>b. A América é o menor continente do mundo.</li> <li>c. A Antártida é o menor continente do mundo.</li> <li>d. A África é o maior continente do mundo e com a população mais numerosa.</li> <li>e. A Ásia é o maior continente do mundo e também o mais populoso.</li> </ul>
<ul> <li>beleza.</li> <li>( ) Trazia o livro na mochila para que ficasse resguardado da chuva.</li> <li>( ) Por mais que não quisesse, teve que aprender gramática normativa.</li> </ul>	<ul> <li>9. Este Oceano em algumas localidades é também chamado de "Mar das Índias", em referência às Índias Orientais. Indique-o:</li> <li>a. ☐ Oceano Ártico.</li> <li>b. ☑ Oceano Índico.</li> </ul>
Assinale a alternativa que indica a sequência <b>correta</b> , de cima para baixo.  a.   1 · 2 · 4 · 5 · 3  b.  1 · 4 · 2 · 3 · 5  c.  2 · 3 · 1 · 4 · 5  d.  4 · 2 · 5 · 1 · 3  e.  5 · 1 · 3 · 4 · 2	c.

3S15 Médico ESF	
<ul> <li>10. Sobre a econômia catarinense, é correto afirmar:</li> <li>a. A única atividade relevante é o turismo.</li> </ul>	<b>13.</b> Analise as afirmativas abaixo sobre a criação de Gráficos no MS Excel do Office 365 em português.
<ul> <li>a.  A unica atividade relevante e o turismo.</li> <li>b.  Baseia-se apenas no turismo e na hotelaria.</li> <li>c.  Pouco se caracteriza como Estado produtor.</li> <li>d.  É pouco diversificada com algumas atividades centralizadas nas regiões.</li> <li>e.  É bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões do Estado.</li> </ul>	<ol> <li>Não é possível criar um gráfico de Dispersão utilizando dados dentro de uma tabela dinâmica.</li> <li>Criar um gráfico de Combinação requer ao menos duas séries de dados.</li> <li>Criar um gráfico de Mapa requer ao menos duas séries de dados.</li> </ol>
Noções de Informática 5 questões	Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas <b>corretas</b> .
11. Analise as afirmativas abaixo sobre a inserção de sumários pelo MS Word do Office 365 em português.	<ul> <li>a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2.</li> <li>b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.</li> <li>c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.</li> <li>d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.</li> </ul>
<ol> <li>É preciso finalizar todas as páginas de um documento antes de inserir o sumário.</li> </ol>	e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
<ol> <li>Ao inserir um sumário, o comportamento padrão do MS Word é atualizá-lo automaticamente sempre que algo mudar no documento.</li> <li>Pode-se definir a quantidade de níveis que o sumário irá exibir, suprimindo, por exemplo, os subtítulos.</li> </ol>	<ul> <li>14. Qual Guia e opção possibilitam ao usuário definir o tema do Office, que pode ser preto, branco ou até cinza escuro, a partir do MS Word do Office 365 em português?</li> <li>a. ☑ Arquivo ▶ Conta</li> <li>b. ☐ Arquivo ▶ Opções</li> </ul>
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.	c. ☐ Arquivo ▶ Informações d. ☐ Exibir ▶ Tema do Office e. ☐ Design ▶ Tema do Office
<ul> <li>a. ☑ É correta apenas a afirmativa 3.</li> <li>b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.</li> <li>c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.</li> <li>d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.</li> <li>e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.</li> </ul>	<ul> <li>15. Qual modo de exibição do MS Word do Office 365 em português é útil para criar títulos e mover parágrafos inteiros dentro do documento?</li> <li>a.  Rascunho</li> </ul>
<b>12.</b> Ao utilizar o recurso de Enviar para, disponível a partir do clique com botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows 10 Pro em português a partir do Explorador de Arquivos, e selecionar Área de trabalho, o comportamento padrão do Windows é:	b. ☐ Lista de títulos c. ☐ Modo de leitura d. ☑ Estrutura de tópicos e. ☐ Itens de Formatação
<ul> <li>a.  Mover a pasta.</li> <li>b. Compactar a pasta.</li> <li>c. Criar uma cópia da pasta.</li> <li>d. Exibir uma mensagem de erro.</li> <li>e. Criar um atalho para a pasta.</li> </ul>	

**Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú •** Processo Seletivo Simplificado • Edital 003/2020

#### Saúde Pública

12 questões

como melho dos ao estrat	programa do Ministério da Saúde que tem objetivo incentivar os gestores e as equipes a orar a qualidade dos serviços de saúde ofereci- os cidadãos do território, com um conjunto de égias de qualificação, acompanhamento e ava- do trabalho das equipes de saúde é a(o):
a.	Política Nacional de Promoção da Saúde. Política Nacional de Humanização das Equipes de Saúde. Programa de Estratégia de Saúde da Família (PSF). Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB).
a com (NASF	ssinale a alternativa que se refere <b>corretamente</b> posição Núcleos de Apoio à Saúde da Família ) na sua terceira modalidade de conformação de e, o NASF 3.
a. 🗹 b. 🗆 c. 🖂 d. 🖂 e. 🖂	
exem <sub> </sub>	s equipes de Estratégia de Saúde da Família, olificam a importância do trabalho em equipe, muitas atividades são desenvolvidas por todos mbros e cada um por sua vez possui atribuições íficas.
Por ex	emplo, é uma atribuição específica do médico:
	Visita domiciliar. Internação domiciliar. Realizar consulta médica e pequenas cirurgias ambulatoriais. Participação de grupos comunitários. Participação de campanhas de prevenção da doença e promoção da saúde.

**19.** Em relação aos elementos conceituais na atenção primária, os diferentes níveis de prevenção da história natural da doença, ajudam na adoção de políticas públicas de prevenção de determinadas doenças.

Analise as afirmativas abaixo sobre os níveis de atenção.

- 1. A prevenção primordial da doença objetiva evitar a instalação de seus fatores de risco.
- 2. A prevenção primária da doença visa eliminar seus fatores de risco.
- 3. A prevenção secundária busca a detecção e o manejo precoce da doença em sua fase assintomática.
- 4. A prevenção terciária promove a reabilitação e a prevenção de complicações em indivíduos iá doentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. 🔲	Sao corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. 🗹	São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
tégia (	a política Nacional da Atenção Básica, a Estra de Saúde da Família, tem o financiamento da

- tégia de Saúde da Família, tem o financiamento das ações das Unidades de Saúde da Família na programação ambulatorial, sob a responsabilidade:
- a. Dos governos em nível municipal.b. Dos governos em nível estadual.
- c. Dos governos em nível federal.
- d. Dos colegiados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de saúde (CONASEMS).
- e. Dos colegiados do Conselho Nacional de Secretários (CONAS).
- **21.** A instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, cuja missão é fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público, é o:

a	Fundo	Estadual	dе	Saride
a.	rundo	Estaduai	ue	Sauue.

- b. Conselho Nacional de Saúde.
- c. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- d. 

  Conferência Nacional de Saúde.
- e. Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde da Família.

e. Um médico generalista ou de família, médico

e um auxiliar de enfermagem.

pediatra, médico ginecologista, um enfermeiro

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú • Processo Seletivo Sin 3S15 Médico ESF	
23T3 MEGICO CSE	
<b>27.</b> A gestão do SUS é executada nas 3 esferas de governo, cada um com suas respectivas atribuições, regionalizadas e hierarquizadas.  Na Atenção Primária, a porta de entrada no sistema de saúde e atendimento à população, é feita:	<b>30.</b> Na semiologia cardíaca , a ausculta das bulhas cardíacas anormais e ruídos adventícios (sopros, estalidos, etc.) permitem o diagnóstico clínico de várias doenças.  Na ausculta cardíaca, a diástole corresponde:
<ul> <li>a.  Pelo sistema de saúde complementar.</li> <li>b. Pela rede de ambulatórios nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).</li> <li>c. Pelas unidades locais de Saúde e Estratégia de Saúde da Família.</li> <li>d. Pelos ambulatórios de especialidades básicas e unidades de pronto atendimento (UPAs).</li> <li>e. Pela rede hospitalar pública e clinicas particulares e filantrópicas credenciadas pelo SUS.</li> </ul>	<ul> <li>a. Nem a diástole nem a sístole correspondem na ausculta, ao som das bulhas.</li> <li>b. Intervalo de tempo entre a primeira e a segunda bulha do ciclo seguinte.</li> <li>c. Ao som de fechamento da válvula mitral na 2ª bulha.</li> <li>d. Ao intervalo de tempo entre a segunda bulha e a segunda bulha do ciclo seguinte.</li> <li>e. Ao intervalo de tempo entre a segunda bulha e a primeira do ciclo seguinte.</li> </ul>
Conhecimentos Específicos 8 questões	31. Os distúrbios depressivos são um dos motivos
<ul> <li>28. Em epidemiologia clínica, a relação dos agentes etiológicos de doenças infecto contagiosas com o hospedeiro de patogenicidade, é definida como:</li> <li>a. ✓ A capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais da doença.</li> <li>b. ☐ A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.</li> <li>c. ☐ A capacidade do agente de causar a morte do hospedeiro.</li> </ul>	prevalentes de atendimento na Atenção Básica.  Seu tratamento farmacológico inclui o uso de drogas que pertencem ao grupo dos Inibidores da Monoaminooxidase (IMAO). Indique-os:  a. ☐ Fluoxetina, sertralina e citalopram.  b. ☐ Serotonina, noradrenalina e dopamina.  c. ☐ Imipramina, desipramina e amitriptilina.  d. ☐ Amineptina, bupropion e minaprina.  e. ☑ Iproniazida, fenilzina e clorgilina.
<ul> <li>d.  A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais, com capacidade de se multiplicar e produzir toxinas, etc.</li> <li>e.  A capacidade do agente de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar em um outro hospedeiro.</li> </ul>	<b>32.</b> As manifestações neurológicas mais frequentemente encontradas no lúpus eritematoso sistêmico são decorrentes de alterações de pequenas artérias e arteríolas encefálicas e meníngeas.  Os distúrbios do sistema nervoso periférico são mais
<b>29.</b> Secretaria de Saúde de Santa Catarina estima que cerca de que 5 mil pessoas podem ter contraído a doença de Chagas após consumirem caldo de cana em quiosques às margens da BR-101, entre os municípios de Piçarras e Itajaí, em 2005.	raramente vistos e, nesses casos são associados a:  a. ☐ Artrite reumatóide.  b. ☐ Claudicação intermitente.  c. ☐ Púrpura trombocitopênica.  d. ☑ Síndrome de Guillain-Barré.  e. ☐ Arterite de Takayasu de membros inferiores.
Considerando que a população exposta na época foi de 650.000 pessoas, a taxa de incidência dessa doença por 1000 habitantes, neste período e nesta região foi de foi de:	Artenic de lakayasa de membros interioles.
a. □ 0,76 b. ☑ 7,69 c. □ 13,0 d. □ 76,92 e. □ 113,0	

33. As reações alérgicas de hipersensibilidade tipo I são também conhecidas como imediata ou hipersensibilidade e são mediadas por anticorpos em resposta a antigenos exógenos.  As manifestações dermatológicas em resposta à exposição a analgésicos antiinflamatórios (salicilatos) costumam, mais frequentemente, produzir com reações cutâneas tipo:  a. ☐ Eritrodermia. b. ☐ Eczemas. c. ☑ Urticária. d. ☐ Exantema maculopapular. e. ☐ Petêquias por púrpura trombocitopênica.  34. As infecções do trato urinário são queixas frequentes na Atenção Básica, tanto em mulheres de vida sexual ativa quanto no ciclo gravidico-puerperal.  Neste, gestantes com disúria dor e dificuldade, polaciúria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o): a. ☑ Escherichia coli. b. ☐ Diplococcus genoreæ. c. ☐ Estafiolococcus ureus. d. ☐ Clamydia trachomoatis. e. ☐ Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1 c. A meta para o tratamento da hiperglicemia previas de: a. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias. b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias. b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias. c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao més anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores. c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao més anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores. c. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao més anterior à coleta e 10% ao terceiro e quarto meses anteriores.	<b>Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú •</b> Processo Seletivo Sim	plificado • Edital 003/2020
são também conhecidas como imediata ou hipersensibilidade e são mediadas por anticorpos em resposta a antígenos exógenos.  As manifestações dermatológicas em resposta à exposição a analgesicos antiinflamatórios (salicilatos) costumam, mais frequentemente, produzir com reações cutâneas tipo:  a. □ Eritrodermia. b. □ Eczemas. c. ☑ Urticária. d. □ Exantema maculopapular. e. □ Petéquias por púrpura trombocitopênica.  34. As infecções do trato urinário são queixas frequentes na Atenção Básica, tanto em mulheres de vida sexual ativa quanto no ciclo gravidico-puerperal.  Neste, gestantes com disúria dor e dificuldade, polacidiria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o): a. ☑ Escherichia coli. b. □ Diplococcus gonorreae. c. □ Estañolococcus aureus. d. □ Clamydio trachomoatis. e. □ Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia a tualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de: a. □ A média das glicemias diárias dos últimos 30 días. b. □ A média das glicemias diárias dos últimos 30 días. b. □ A média das glicemias diárias dos últimos 30 días. c. □ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao més anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores. c. □ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao més anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores. c. □ 25% correspondente ao més que precedeu o exame, 15% ao més anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anterior e coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.	3S15 Médico ESF	
são também conhecidas como imediata ou hipersensibilidade e são mediadas por anticorpos em resposta a antígenos exógenos.  As manifestações dermatológicas em resposta à exposição a analgesicos antiinflamatórios (salicilatos) costumam, mais frequentemente, produzir com reações cutâneas tipo:  a. □ Eritrodermia. b. □ Eczemas. c. ☑ Urticária. d. □ Exantema maculopapular. e. □ Petéquias por púrpura trombocitopênica.  34. As infecções do trato urinário são queixas frequentes na Atenção Básica, tanto em mulheres de vida sexual ativa quanto no ciclo gravidico-puerperal.  Neste, gestantes com disúria dor e dificuldade, polacidiria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o): a. ☑ Escherichia coli. b. □ Diplococcus gonorreae. c. □ Estañolococcus aureus. d. □ Clamydio trachomoatis. e. □ Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia a tualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de: a. □ A média das glicemias diárias dos últimos 30 días. b. □ A média das glicemias diárias dos últimos 30 días. b. □ A média das glicemias diárias dos últimos 30 días. c. □ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao més anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores. c. □ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao més anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores. c. □ 25% correspondente ao més que precedeu o exame, 15% ao més anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anterior e coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.		
sição a analgésicos antiinflamatórios (salicilatos) costumam, mais frequentemente, produzir com reações cutáneas tipo:  a. ☐ Eritrodermia. b. ☐ Eczemas. c. ☐ Urticária. d. ☐ Exantema maculopapular. e. ☐ Petéquias por púrpura trombocitopênica.  34. As infeçções do trato urinário são queixas frequentes na Atenção Básica, tanto em mulheres de vida sexual ativa quanto no ciclo gravídico-puerperal.  Neste, gestantes com disúria dor e dificuldade, polaciúria, cujos exames complementares demonstram a presença de infeçção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o): a. ☑ Escherichia coli. b. ☐ Diplococcus gonorreae. c. ☐ Estafolococcus aureus. d. ☐ Clamydia trachomoatis. e. ☐ Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de: a. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 od alas. b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses. c. ☐ 25% correspondente ao més que precedeu o exame, 25% ao més anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores. c. ☐ 25% correspondente ao més que precedeu o exame, 15% ao més anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.	são também conhecidas como imediata ou hipersensibilidade e são mediadas por anticorpos em resposta	
b. ☐ Urticária. d. ☐ Exatema maculopapular. e. ☐ Petéquias por púrpura trombocitopênica.  34. As infecções do trato urinário são queixas frequentes na Atenção Básica, tanto em mulheres de vida sexual ativa quanto no ciclo gravidico-puerperal.  Neste, gestantes com disúria dor e dificuldade, polaciúria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o): a. ☑ Escherichia coli. b. ☐ Diplacoccus gonorreae. c. ☐ Estafiolococcus aureus. d. ☐ Clamydia trachomoatis. e. ☐ Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de: a. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 o dias. d média das glicemias diárias dos últimos 3 meses. c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores. e. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.	sição a analgésicos antiinflamatórios (salicilatos) costumam, mais frequentemente, produzir com reações	
quentes na Átenção Básica, tanto em mulheres de vida sexual ativa quanto no ciclo gravídico-puerperal.  Neste, gestantes com disúria dor e dificuldade, polaciúria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o):  a.   Escherichia coli.  b.   Diplococcus gonorreae.  c.   Stafiolococcus aureus.  d.   Clamydia trachomoatis.  e.   Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de:  a.   A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias.  b.   A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses.  c.   25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e.   75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e.   75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao	<ul><li>b. ☐ Eczemas.</li><li>c. ☑ Urticária.</li><li>d. ☐ Exantema maculopapular.</li></ul>	
quentes na Átenção Básica, tanto em mulheres de vida sexual ativa quanto no ciclo gravídico-puerperal.  Neste, gestantes com disúria dor e dificuldade, polaciúria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o):  a.   Escherichia coli.  b.   Diplococcus gonorreae.  c.   Stafiolococcus aureus.  d.   Clamydia trachomoatis.  e.   Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de:  a.   A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias.  b.   A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses.  c.   25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e.   75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e.   75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao		
ciúria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o):  a.	quentes na Atenção Básica, tanto em mulheres de vida	
a presença de infecção do trato urinário baixo, tem como principal agente etiológico a(o):  a.		
b. ☐ Diplococcus gonorreae. c. ☐ Estafiolococcus aureus. d. ☐ Clamydia trachomoatis. e. ☐ Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de: a. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias. b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses. c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores. d. ☑ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores. e. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao	a presença de infecção do trato urinário baixo, tem	Coluna
b. ☐ Diplococcus gonorreae. c. ☐ Estafiolococcus aureus. d. ☐ Clamydia trachomoatis. e. ☐ Ureaplasma urealiticum.  35. Na Atenção Básica o acompanhamento de pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de: a. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias. b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses. c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores. d. ☑ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores. e. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao	a. 🗹 Escherichia coli.	
pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de:  a.  A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias.  b. A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses.  c. 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.  d. 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e. 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao	<ul> <li>b. ☐ Diplococcus gonorreae.</li> <li>c. ☐ Estafiolococcus aureus.</li> <li>d. ☐ Clamydia trachomoatis.</li> </ul>	em Branco.
pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a determinação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente recomendada é alcançar HbA1c menor que 7%.  Esse valor reflete as glicemias prévias de:  a.  A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias.  b. A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses.  c. 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.  d. 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e. 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao		/
<ul> <li>a. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 30 dias.</li> <li>b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses.</li> <li>c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.</li> <li>d. ☑ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.</li> <li>e. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao</li> </ul>	pacientes com diabetes mellitus tipo II em tratamento, se baseia na monitorização da hiperglicemia e a deter- minação da glico-hemoglobina glicada HbA1c. A meta para o tratamento da hiperglicemia atualmente reco-	(rascunno)
30 dias.  b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses.  c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.  d. ☑ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao	Esse valor reflete as glicemias prévias de:	
<ul> <li>b. ☐ A média das glicemias diárias dos últimos 3 meses.</li> <li>c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.</li> <li>d. ☑ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.</li> <li>e. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao</li> </ul>	5	
c. ☐ 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao terceiro e quarto meses anteriores.  d. ☑ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.  e. ☐ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao	b. A média das glicemias diárias dos últimos	
<ul> <li>d.   ✓ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores.</li> <li>e.   ✓ 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao</li> </ul>	c. 25% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 50% ao	
e.	d. ☑ 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao	
terceno e quarto meses antenores.	e. 75% correspondente ao mês que precedeu o exame, 15% ao mês anterior à coleta e 10% ao	
	terceno e quarto meses antenores.	



#### Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha**. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



### GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

	19	
:	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	·	





Campus Universitário • UFSC 88040-900 • Florianópolis • SC Fone/Fax: (48) 3953-1000 http://www.fepese.org.br