

Линдавит

лактация

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Состав: 1 капсула содержит:

активные вещества:

| | |
|--|-----------|
| Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 140,00 мг |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 100,00 мг |
| Кальций (Карбонат кальция) | 120,00 мг |
| Витамин С (Аскорбат кальция) | 66,112 мг |
| Витамин В3 (Никотинамид) | 16,00 мг |
| Витамин Е (D-альфа токоферол) | 12,00 мг |
| Цинк (Сульфат цинка) | 10,00 мг |
| Витамин В5 (D-кальция пантотенат) | 6,000 мг |
| Железо (Микроинкапсулированное железо) | 2,100 мг |
| Витамин В6 (Пиридоксина хлоридат) | 1,400 мг |
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 1,400 мг |
| Витамин В1 (Тиамина мононитрат) | 1,100 мг |
| Йод (Йодид калия) | 0,200 мг |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 0,200 мг |
| Витамин D3 1,0 М (Холекальциферол) | 0,200 мг |
| D-биотин | 0,050 мг |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) | 0,025 мг |

вспомогательные вещества:

пчелиный воск, состав оболочки: бычий желатин, глицерин, краситель оксид Negro, краситель оксид Rojo, краситель E-122.

Область применения:

В период кормления грудью потребность в некоторых витаминах и микроэлементах у женщины возрастает. Во-первых, ей необходимо самой восстановить силы после беременности и родов, а во-вторых, обеспечить своему малышу идеальное питание, содержащее все необходимое для его роста и развития.

Линдавит лактация - это биологически активная добавка к пище, рекомендованная в качестве дополнительного источника витаминов и микроэлементов. Она восполнит дефицит полезных веществ во время беременности и кормления. А прием комплекса за 2-3 месяца до предполагаемой беременности поможет подготовить организм к ее наступлению.

В состав комплекса входит: йод, который играет важную роль в развитии нервной системы будущего ребенка, докозагексаеновая кислота и эйкозапентаеновая кислота важна для формирования мозга и зрения ребенка, также полезны для мозгового кровообращения. Фолиевая кислота, от которой зависит нормальное развитие плода, своевременность родов и быстрое восстановление женщины после них. Кальций, необходимый для образования не только костей и зубов, но и нервной системы, сердца и мышц будущего ребенка. Железо, которое способствует профилактике анемии.

Способ применения и дозы:

Линдавит лактация принимают внутрь по 1 капсуле в день, во время еды с небольшим количеством жидкости.

Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в качестве замены разнообразного и сбалансированного питания.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Не рекомендуется принимать другие витаминные препараты в одно и то же время с данным препаратом.

Условия отпуска:

без рецепта.

Форма выпуска и упаковка:

15 капсул в блистере, по 2 блистера с инструкцией по применению на государственном и русском языках в картонной упаковке.

Условия хранения:

хранить в плотно закрытой упаковке, в защищенном от света месте, при температуре 15 - 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 36 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.95.003.E.000760.09.17



Belinda

Владелец торговой марки:

Belinda Laboratories LLP.,
Лондон, Великобритания

Производитель:

Laboratorios Liconsa S.A.,
Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo
Гвадалахара, Испания.

**Организация уполномоченная
принимать претензии от потребителей:**

ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «Old Square»
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com

Линдавит

лактация

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПА

Құрамы: 1 капсуласының құрамында:

белсенді заттектері:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Эйкозапентаен қышқылы (EPA) | 140,00 мг |
| Докозагексаен қышқылы (DHA) | 100,00 мг |
| Кальций (Кальций карбонаты) | 120,00 мг |
| C дәрумені (Кальций аскорбаты) | 66,112 мг |
| B3 дәрумені (Никотинамид) | 16,00 мг |
| E дәрумені (D-альфа токоферол) | 12,00 мг |
| Мырыш (Мырыш сульфаты) | 10,00 мг |
| B5 дәрумені (D-кальций Пантотенаты) | 6,000 мг |
| Темір (Микроинкапсуляцияланған темір) | 2,100 мг |
| B6 дәрумені (Пиридоксин хлоридраты) | 1,400 мг |
| B2 дәрумені (Рибофлавин) | 1,400 мг |
| B1 дәрумені (Тиамин мононитраты) | 1,100 мг |
| Йод (Калий йодиді) | 0,200 мг |
| B9 дәрумені (Фолий қышқылы) | 0,200 мг |
| D3 дәрумені 1,0 M (Холекальциферол) | 0,200 мг |
| D-биотин | 0,050 мг |
| B12 дәрумені (Цианокобаламин) | 0,025 мг |

қосымша заттектері:

ара балауызы, қабығының құрамы: өгіз желатині, глицерин, оксид Negro бояғышы, оксид Rojo бояғышы, E-122 бояғышы.

Қолдану аясы:

Бала емізу кезеңінде әйелдің кейбір дәрумендер мен микроэлементтерге қажеттілігі артады. Біріншіден, әйелдің өзіне жүктілік пен босанудан кейін күшін қалпына келтіру, екіншіден, сәбидің өсуі мен дамуына барлық қажетті заттектер бар оңтайлы тамақтануды қамтамасыз ету қажет.

Линдавит лактация - тағамға биологиялық белсенді қоспа, дәрумендер мен микроэлементтердің қосымша көзі ретінде ұсынылады. Жүктілік пен бала емізу кезінде пайдалы заттектердің тапшылығын толықтырады. Ал кешенді жоспарланатын жүктілікке дейін 2-3 ай бұрын қабылдау организмді жүктілікке дайындайды.

Кешеннің құрамына кіреді: йод - болашақ сәбидің жүйке жүйесінің дамуында маңызды роль атқарады; докозагексаен және эйкозапентаен қышқылдары – сәбидің миы мен көруінің қалыптасуы үшін маңызды, сондай-ақ, мидың қан айналымы үшін пайдалы; фолий қышқылы – ұрықтың қалыпты дамуы, босанудың уақытылығы және одан кейін әйелдің тез қалпына келуі осы заттекке тәуелді; кальций – болашақ сәбидің сүйегі мен тісінің, жүйке жүйесінің, жүрегі мен бұлшық етінің түзілуіне қажет; темір – анемияның алдын алуға ықпал етеді.

Қолдану тәсілі және мөлшерлемесі:

Линдавит лактация ішуге арналған, күніне 1 капсуладан, тағамға қосып, аздаған сұйықтық ішумен қабылдау қажет. Тағамға биологиялық белсенді қоспа алуан түрлі және үйлесімді тамақтануды алмастыру үшін қолданылмайды.

Қарсы көрсетімдері:

Препараттың құрамбөліктеріне асқан сезімталдық. Ұсынылатын тәуліктік мөлшерлемесінен асыруға болмайды. Басқа дәрумендік препараттарды осы препаратпен бір мезгілде қабылдау ұсынылмайды.

Босатылу шарттары:

рецептсіз.

Шығарылу түрі және қаптамасы:

15 капсуладан блистерде, 2 блистерден мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қаптамға салынған.

Сақтау шарттары:

тығыз жабылған қаптамасында, күн сәулесінен қорғалған жерде, 15 - 25°C аралығындағы температурада сақтау қажет. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі: 36 ай.

Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №:

KZ.16.01.95.003.E.000760.09.17



Belinda

Сауда белгісінің иесі:
Belinda Laboratories LLP.,
Лондон, Ұлыбритания

Өндіруші:
Laboratorios Liconsa S.A.,
Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo
Гвадалахара, Испания.

Тұтынушылардан шағым-талаптарды қабылдауға өкілетті ұйым:
«Cepheus Medical» ЖШС (Цефей Медиал)
050000, Алматы қ, Панфилов көшесі, 98 үй, «Old Square» БО
Тел.: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com