

Линдавит

лактация

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Состав: 1 капсула содержит:

активные вещества:

| | |
|--|-----------|
| Эйкозапентаеновая кислота (ЕРА) | 140,00 мг |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 100,00 мг |
| Кальций (Карбонат кальция) | 120,00 мг |
| Витамин С (Аскорбат кальция) | 66,112 мг |
| Витамин В3 (Никотинамид) | 16,00 мг |
| Витамин Е (D-альфа токоферол) | 12,00 мг |
| Цинк (Сульфат цинка) | 10,00 мг |
| Витамин В5 (D-кальция пантотенат) | 6,000 мг |
| Железо (Микроинкапсулированное железо) | 2,100 мг |
| Витамин В6 (Пиридоксина хлоридрат) | 1,400 мг |
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 1,400 мг |
| Витамин В1 (Тиамина мононитрат) | 1,100 мг |
| Йод (Йодид калия) | 0,200 мг |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 0,200 мг |
| Витамин D3 1,0 М (Холекальциферол) | 0,200 мг |
| D-биотин | 0,050 мг |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) | 0,025 мг |

вспомогательные вещества:

пчелиный воск, состав оболочки: бычий желатин, глицерин, краситель оксид Negro, краситель оксид Rojo, краситель E-122.

Область применения:

В период кормления грудью потребность в некоторых витаминах и микроэлементах у женщины

возрастает. Во-первых, ей необходимо самой восстановить силы после беременности и родов, а во-

вторых, обеспечить своему малышу идеальное питание, содержащее все необходимое для его роста и развития.

Линдавит лактация - это биологически активная добавка к пище, рекомендованная в качестве

дополнительного источника витаминов и микроэлементов. Она восполнит дефицит полезных веществ во

время беременности и кормления. А прием комплекса за 2–3 месяца до предполагаемой беременности

поможет подготовить организм к ее наступлению.

В состав комплекса входит: йод, который играет важную роль в развитии нервной системы будущего

ребенка, докозагексаеновая кислота и эйкозапентаеновая кислота важна для формирования мозга и

зрения ребенка, также полезны для мозгового кровообращения. Фолиевая кислота, от которой зависит

нормальное развитие плода, своевременность родов и быстрое восстановление женщины после них.

Кальций, необходимый для образования не только костей и зубов, но и нервной системы, сердца и мышц

будущего ребенка. Железо, которое способствует профилактике анемии.

Способ применения и дозы:

Линдавит лактация принимают внутрь по 1 капсуле в день, во время еды с небольшим количеством

жидкости.

Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в качестве замены разнообразного и сбалансированного питания.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Не рекомендуется принимать другие витаминные препараты в одно и то же время с данным препаратом.

Условия отпуска:

без рецепта.

Форма выпуска и упаковка:

15 капсул в блистере, по 2 блистера с инструкцией по применению на государственном и русском языках в картонной упаковке.

Условия хранения:

хранить в плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте, при температуре 15 - 25 °С. Хранить

в недоступном для детей месте!

Срок годности: 36 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

№ свидетельства государственной регистрации:

KZ.16.01.95.003.E.000760.09.17



Владелец торговой марки:
Belinda Laboratories LLP.,
Лондон, Великобритания

Производитель:
Laboratorios Liconsa S.A.,
Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo
Гвадалахара, Испания.

**Организация уполномоченная
принимать претензии от потребителей:**
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «Old Square»
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com