

Premavit

Премавит

Инструкция по применению

Премавит рекомендуется в периоды повышенной потребности фолиевой кислоты: женщинам в период беременности и планирующим беременность, в случае дефицита фолиевой кислоты в диете, при усталости и утомлении, а также в период инфекций.

Потребление дополнительной фолиевой кислоты увеличивает фолатный статус у матери.

У матери низкий фолатный статус является фактором риска в развитии дефектов нервной трубки у развивающегося плода. Фолиевая кислота и витамин B12 в составе препарата Премавит - принимают участие в процессе клеточного деления. Фолаты участвуют в процессе деления клеток во всем организме, способствуют росту материнской ткани во время беременности и помогают в правильном синтезе аминокислот и продуцировании крови. Витамин B12 способствует нормальному образованию красных кровяных телец. Фолиевая кислота и витамин B12, также помогают в правильном функционировании иммунной системы и способствует снижению чувства усталости и истощения.

Кроме того, фолиевая кислота и витамин B12 способствуют поддержке правильного метаболизма гомоцистеина, чья повышенная концентрация в крови считается фактором развития ряда заболеваний. *

Важно: Наличие фолиевой кислоты в организме матери является ключевым в те дни, когда большинство женщин еще не знают о своей беременности! Поэтому рекомендуется прием пищевых добавок всем женщинам репродуктивного возраста.

СОСТАВ:

Ингредиенты	1 таблетка содержит	% РСН * в 1 таблетке
Фолиевая кислота	400 мкг	200
Витамин B12 (цианокобаламин)	2 мкг	80

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза - 107,4 мг, картофельный крахмал - 7,4 мг, стеарат магния - 1,2 мг, диоксид кремния - 0,6 мг.

ПОКАЗАНИЯ:

- профилактика развития дефектов нервной трубки во время беременности;
- процесс планирования беременности;
- профилактика дефектов развития плода;
- профилактика анемии;
- правильное формирование плаценты во время беременности;

- для повышения иммунитета.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- повышенная индивидуальная чувствительность к препарату;
- злокачественные новообразования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутрь. Рекомендуемая суточная доза: 1 - 2 таблетки в день.

Для профилактики развития дефектов нервной трубки у плода в I триместре беременности: по 1 - 2 таблетки в день.

При планировании беременности принимать минимум 1 месяц до зачатия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Суточная норма приема фолиевой кислоты по рекомендации ВОЗ составляет 400 мкг в сутки, за один месяц до зачатия и до трех месяцев после зачатия.

УПАКОВКА: 60 таблеток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

4 года. Не использовать по истечении срока годности.



Произведено для:
LADY HEALTHCARE LLP
Лондон, Великобритания
Производитель:
PHARMACY Laboratories,
57, ul. Wisłowa, 04-830
Варшава, Польша