

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
L-ЛЕДИЗИН
L-LADYZIN

Торговое название:

L-ЛЕДИЗИН (L-LADYZIN)

Действующее вещество (МНН):

L-лизина основание,эсцин.

Форма выпуска: раствор для инъекций. По 5 мл раствора в ампулах № 5х2.

Состав:

1 мл раствора содержит:

Действующие вещества: L-лизинаосновани -0,12 мг;

Эсцин - 0,88 мг.

Вспомогательные вещества: этанол 96%, пропиленгликоль, вода для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа:

Капилляростабилизирующие средства.

АТХ код: C05CX.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает противовоспалительное, противоотечное и обезболивающее действие.

Эсцин понижает активность лизосомальных гидролаз, что предупреждает расщепление мукополисахаридов в стенках капилляров и в соединительной ткани, которая их окружает, и таким образом нормализует повышенную сосудисто-тканевую проницаемость и оказывает антиэкссудативное (противоотечное) и обезболивающее действие. Препарат повышает тонус сосудов, оказывает умеренный иммунокорригирующий и гипогликемический эффекты.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания к применению:

Посттравматические, интра- и послеоперационные отеки любой локализации: тяжелые отеки головного и спинного мозга, в т.ч. с внутричерепными кровоизлияниями, повышением внутричерепного давления и явлениями отека-набухания; ликворо-венозные нарушения при хронических нарушениях мозгового кровообращения и вегето-сосудистой дистонии; отеки мягких тканей с вовлечением опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся локальными расстройствами их кровоснабжения и болевым синдромом; отечно-болевые синдромы позвоночника, туловища, конечностей; тяжелые нарушения венозного кровообращения нижних конечностей при остром тромбозе, сопровождающиеся отечно-воспалительным синдромом.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят строго внутривенно медленно (внутриартериальное введение не допускается!) в суточной дозе 5-10 мл. Рекомендовано внутривенное капельное введение. При приготовлении инфузионного раствора L-ледицин разводят в 15-50 мл 0,9% раствора натрия хлорида.

При состояниях, угрожающих жизни больного (острая черепно-мозговая травма, интра- и послеоперационные отеки головного и спинного мозга с явлениями отека-набухания, отечность больших размеров вследствие обширных травм мягких тканей и опорно-двигательного аппарата), суточную дозу увеличивают до 20 мл разделив на 2 введения. Максимальная суточная доза для взрослых - 25 мл.

У детей разовая доза составляет: *1-5 лет* – 0,22 мг

L-Ледизина на 1 кг массы тела; *5-10 лет* – 0,18 мг/кг; *10 лет и старше* – 0,15 мг/кг массы тела. Препарат вводят 2 раза в сутки.

Длительность курса лечения - от 2 до 8 дней, в зависимости от состояния больного и эффективности терапии.

Побочные действия:

При индивидуальной повышенной чувствительности к эсцину у отдельных больных возможны:

аллергические реакции: кожная сыпь (папулезная, петехиальная, эритематозная), зуд, гиперемия кожи лица, лихорадка, крапивница, в единичных случаях - отек Квинке, анафилактический шок;

со стороны центральной и периферической нервной системы:

головная боль, головокружение, тремор, парестезии, в единичных случаях — шаткая походка, нарушение равновесия, кратковременная потеря сознания;

со стороны печени и билиарной системы: повышение уровня трансаминаз и билирубина;

со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, в единичных случаях - рвота, диарея, боль в животе;

со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, артериальная гипертензия, тахикардия, боль за грудиной;

со стороны органов дыхания: в единичных случаях - чувство нехватки воздуха, одышка, бронхообструкция, сухой кашель;

местные реакции: чувство жжения по ходу вены при введении, флебит, боль и отек в месте введения;

другие: общая слабость, озноб, чувство жара, боль в пояснице, потливость.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к L-Ледизину и/или другим компонентам препарата.
- тяжелые нарушения функции почек;
- тяжелые нарушения функции печени;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 1 года;

Лекарственные взаимодействия:

При лечении L-Ледизином возможно назначение других лекарственных средств при соответствующих показаниях (противовоспалительных, анальгетиков, противомикробных).

Препарат не следует применять одновременно с аминогликозидами из-за возможности повышения их нефротоксичности. В случае длительной терапии антикоагулянтами, которая проводилась перед назначением L-Ледизина, или при необходимости одновременного применения L-Ледизина и антикоагулянтов, необходимо проводить коррекцию дозы последних (снижать дозу) и контролировать протромбиновый индекс.

Связывание эсцина с белком плазмы затрудняется при одновременном применении антибиотиков цефалоспоринового ряда, что может повышать концентрацию свободного эсцина в крови с риском развития побочных эффектов последнего.

Особые указания:

У отдельных больных с гепатохолециститом при назначении препарата возможно кратковременное повышение активности трансаминаз и билирубина (прямой фракции), не представляющее угрозы для больных и не требующее отмены препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Применение препарата в период беременности или кормления грудью противопоказано (на время лечения следует прекратить кормление грудью).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

На данный момент сообщений нет, однако при применении препарата следует учитывать возможность развития предполагаемых побочных реакций со стороны нервной системы.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 1 года.

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Передозировка:

Симптомы: жар, тахикардия, тошнота, изжога, боль в эпигастрии.

Лечение: симптоматическая терапия.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту врача.

Произведено для:
LADY HEALTHCARE LLP
Лондон, Великобритания

Производитель:
ООО «Биополюс»,
Грузия