


МИЛДРОКАРД



Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства

Торговое название: Милдрокард.

Международное непатентованное название: Мельдоний.

Лекарственная форма: капсулы.

Состав: 1 капсула содержит:

3-(2,2,2-Триметилгидразиний)-пропионата дигидрат - 250мг или 500мг.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, аэросил, кальция стеарат.

Фармакотерапевтическая группа: Метаболическое средство.

АТХ Код: C01EB22 .

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Мельдоний является предшественником карнитина, структурным аналогом гамма-бутиробетаина (ГББ), вещества, которое находится в каждой клетке организма человека.

В условиях повышенной нагрузки мельдоний восстанавливает равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках, защищая их от повреждения; оказывает также тонизирующее влияние. В результате его применения повышается устойчивость организма к нагрузкам и способность быстро восстанавливать энергетические резервы.

Препарат обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему (ЦНС) — повышение двигательной активности и физической выносливости. Благодаря этим свойствам мельдоний используют в том числе для повышения физической и умственной работоспособности.

Фармакокинетика:

После приема внутрь препарат быстро всасывается, биодоступность - 78 %. Максимальная концентрация (C_{max}) в плазме крови достигается через 1-2 часа после приема внутрь. Метаболизируется в организме главным образом в печени с формированием двух основных метаболитов, которые выводятся почками. Период полувыведения (T_{1/2}) при приеме внутрь зависит от дозы, составляет 3-6 часов.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии в следующих случаях:

- при физических и психо-эмоциональных перегрузках, сопровождающихся снижением работоспособности;
- в период восстановления после перенесенных цереброваскулярных заболеваний, черепно-мозговой травмы и энцефалита (по рекомендациям врача).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к препарату;
- повышенное внутричерепное давление;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (безопасность не подтверждена).

Беременность и кормление грудью:

Милдрокард не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Суточная доза для взрослых составляет 500 мг (2 капсулы). Всю дозу применяют с утра в один прием или разделив ее на 2 приема. Курс лечения - 10-14 дней.

При необходимости лечение повторяют через 2-3 недели.

В связи с возможным возбуждающим эффектом препарат рекомендуется применять в первой половине дня.

Побочные действия:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, гипотензия, гипертензия, дискомфорт и боль в груди, холодный пот, бледность.

Со стороны крови и лимфатической системы: эозинофилия.

Со стороны органов дыхания: одышка.

Со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение, раздражительность, нарушение сна, шум в ушах, нарушения чувствительности и координации, тремор, нарушение зрения, обморок.

Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек, кожные аллергические реакции (покраснение кожи, высыпания, зуд, припухлость).

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диспепсия, запор, боль в животе, сухость во рту, металлический привкус во рту.

Общие нарушения: общая слабость, потливость, чувство жара, гиперемия кожи, мышечная слабость, артралгия, боль в пояснице. Повышение температуры тела, чувство першения в горле и сухой кашель требуют дальнейших наблюдений, так как могут быть симптомами вирусных заболеваний.

Передозировка:

Сведения о передозировке препаратом отсутствуют.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами:

Милдрокард усиливает действие антиангинальных средств, некоторых гипотензивных препаратов и сердечных гликозидов.

Препарат совместим с антикоагулянтами, антиагрегантами, бронхолитиками, антиаритмическими, антиангинальными и диуретическими средствами.

При совместном применении препарата Милдрокард с нитроглицерином, нифедипином, альфа-адреноблокаторов, гипотензивных средств и периферических вазодилататоров, возможно развитие умеренной тахикардии и артериальной гипотензии.

Особые указания:

С осторожностью следует принимать препарат длительное время лицам с хроническими заболеваниями печени и почек. В связи с возможностью развития возбуждающего эффекта препарат рекомендуется применять в первой половине дня.

Форма выпуска:

10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и алюминиевой фольги (блистер), 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, не доступных для детей.

Срок годности:

4 года. Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

По рецепту врача.



Произведено для:
LADY HEALTHCARE LLP
Лондон, Великобритания
Производитель:
ООО «Биополус»
Грузия