¿POR QUÉ ESTA DIETA?

Comer así baja la presión

−11 mmHg

En personas con presión alta, la dieta DASH bajó la presión máxima en unos 11 puntos. Es un efecto parecido al de un medicamento, y se nota en 2 a 4 semanas.

¿Cómo funciona?

Las verduras, frutas y legumbres traen **potasio y fibra**, que ayudan a relajar las arterias.

Los lácteos descremados aportan **calcio** sin grasa saturada.

Con **menos sal**, el cuerpo retiene menos líquido y la presión baja aún más.

Sigue tomando tus remedios. La dieta los acompaña, no los reemplaza.

Basado en los estudios DASH (1997) y DASH-Sodio (2001) y en la guía europea de hipertensión 2024.

MIS CONTROLES

Registro de mi presión

Mi meta de presión menos de ____ / ____

FECHA	PRESIÓN	¿CÓMO ME FUE CON LA DIETA?

Próximo control: _____

Médico/a: _____


Centro de salud: _____

Material educativo general. No reemplaza la indicación de tu médico ni la evaluación de un nutricionista. Revisado nov. 2026.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN · PRESIÓN ARTERIAL

Dieta DASH

Mi plan para bajar la presión



Nombre: _____

Fecha: _____

MI DÍA EN PORCIONES

¿Cuánto comer?

Para un adulto de unas 2.000 calorías. Marca un círculo por cada porción.

Verduras
4–5 al día
1 taza cruda o ½ taza cocida
○ ○ ○ ○ ○

Frutas
4–5 al día
1 fruta mediana o ½ taza picada
○ ○ ○ ○ ○

Cereales integrales
6–8 al día
1 rebanada de pan, ½ taza de arroz, fideos o avena
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lácteos descremados
2–3 al día
1 taza de leche, 1 yogurt, 1 lámina de quesillo
○ ○ ○

Pescado, pollo, huevo
Hasta 2 al día
Media palma (75 g) o 1 huevo
○ ○

Aceites y palta
2–3 al día
1 cdta de aceite o 2 cdas de palta
○ ○ ○

Legumbres y frutos secos
4–5 a la semana
½ taza cocida o 1 puñado sin sal
○ ○ ○ ○ ○ por semana

Dulces
Máx. 5 a la semana
1 cda de azúcar, mermelada o miel
○ ○ ○ ○ ○ por semana

LO MÁS IMPORTANTE



Sal: menos de 1 cucharadita al día

En total, sumando la que ya viene en los alimentos. La mayor parte no sale del salero.

- Pan y marraqueta
- Embutidos
- Quesos maduros
- Caldos en cubo
- Snacks
- Salsa de soya

ALTO EN SODIO

Si ves este sello, busca otra opción o cómelo solo de vez en cuando.

El semáforo

Todos los días
Verduras, frutas enteras, porotos, lentejas, garbanzos, avena, arroz y pan integral, leche y yogurt descremados, pescado, pollo sin piel, huevo, nueces sin sal, aceite de oliva, palta, hierbas y limón.

Con moderación
Pan blanco y marraqueta, quesos (mejor quesillo o fresco), carne roja magra 1 a 2 veces por semana, jugos de fruta, mantequilla, legumbres en lata enjuagadas.

Evitar
Jamón, salame, longaniza y vienesas, cubos de caldo y sopas en sobre, snacks salados, comida rápida, bebidas azucaradas, pasteles y galletas.

ACORDADO EN LA CONSULTA

Mis metas

Tu médico marca 2 o 3 para empezar. Cuando ya sean costumbre, suma otra.

- ☐ Sacar el salero de la mesa
- ☐ Una verdura en el almuerzo y otra en la cena
- ☐ Fruta de postre en vez de dulce
- ☐ Cambiar a leche y yogurt descremados
- ☐ Legumbres 2 veces por semana
- ☐ Cambiar embutidos por huevo, pollo o quesillo
- ☐ Bajar el pan a ____ al día
- ☐ Cocinar sin cubos de caldo ni sopas en sobre
- ☐ Otra: _____

Avisa a tu médico si...

- Tienes enfermedad renal o te dijeron que tu potasio está alto.
- Te sientes mareado o débil al levantarte.
- Tienes diabetes con insulina, celiaquía o intolerancia a la lactosa: la dieta se adapta.

Trucos: da sabor con ajo, cebolla, limón, orégano, comino o merkén sin sal. El gusto se acostumbra a menos sal en 2 a 3 semanas.