¿QUÉ SON LOS FODMAP?

Azúcares que fermentan

Son azúcares que el intestino absorbe mal. Llegan al colon, atraen agua y fermentan: eso da gases, hinchazón, dolor y cambios en las deposiciones. No hacen daño, pero en el colon irritable el intestino es más sensible.

- **O** — **Oligosacáridos:** trigo, cebolla, ajo, porotos, lentejas
- **D** — **Disacáridos:** lactosa de la leche y el yogurt
- **M** — **Monosacáridos:** miel, manzana, pera, sandía
- **P** — **Polioles:** palta, ciruela, champiñones, dulces "sin azúcar"

7 de 10 personas con colon irritable mejoraron en un estudio. No le sirve a todos: por eso es una prueba.

No es para siempre ni es una dieta sin gluten.

Basado en estudios de Monash University y en las guías británica y americana de colon irritable (2021).

MI CALENDARIO

Mis 3 etapas

1 **Quitar · 2 a 6 semanas**
Desde _____ hasta _____

2 **Probar de a uno · 6 a 8 semanas**
Desde _____ hasta _____

3 **Mi dieta personal**
Como de todo, limitando solo lo que me hizo mal.

Al terminar la etapa 1, ¿mejoré?

- ☐ Sí: paso a la etapa 2
- ☐ No: vuelvo a comer normal y lo converso con mi médico

Próximo control: _____

Médico/a: _____


Nutricionista: _____

Material educativo general. No reemplaza la indicación de tu médico ni la evaluación de un nutricionista. Revisado nov. 2026.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN · COLON IRRITABLE

Dieta baja en FODMAP

Mi plan para descubrir qué me cae mal



Nombre: _____

Fecha: _____

ETAPA 1

Cambia esto por esto

Pan de trigo, marraqueta, fideos	→ Pan de masa madre auténtica o sin gluten, arroz, papa, avena, quínoa
Cebolla y ajo	→ Parte verde del cebollín y del puerro, ciboulette, aceite con sabor a ajo
Leche, yogurt, quesillo	→ Leche y yogurt sin lactosa, quesos maduros
Manzana, pera, sandía, mango, durazno	→ Plátano firme, naranja, mandarina, kiwi, frutillas, piña
Porotos, lentejas, garbanzos	→ ¼ taza en lata bien enjuagados, tofu firme, huevo
Champiñones, coliflor	→ Zanahoria, zapallo italiano, pepino, lechuga, tomate, espinaca
Miel, dulces "sin azúcar"	→ Azúcar común en poca cantidad
Palta en cantidad	→ Hasta ⅛ de palta por comida

Carnes, pescados, huevos y aceites no tienen FODMAP. Ojo con cebolla y ajo en polvo e inulina en caldos, aliños y panes.

ETAPA 2

Mi registro de pruebas

Un grupo a la vez, 3 días de menos a más. Anota tus síntomas de **0** (nada) a **10** (muy fuerte). Si te cae mal, para y descansa 2 a 3 días antes del siguiente.

GRUPO · ALIMENTO	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Lactosa · leche			
Fructosa · miel			
Sorbitol · palta			
Manitol · champiñones			
Trigo · pan de molde			
Cebolla · cocida			
Ajo			
Legumbres · lentejas			

Lo que me hizo mal

_____

_____

ACORDADO EN LA CONSULTA

Mis indicaciones

- ☐ Examen de celiaquía antes de dejar el trigo
- ☐ Etapa 1 por ____ semanas
- ☐ Hora con nutricionista
- ☐ Comer a horarios regulares, sin saltarse comidas
- ☐ Menos café, alcohol y bebidas con gas
- ☐ Mantener fibra: avena, kiwi, zanahoria, chía o linaza
- ☐ Tomar 6 a 8 vasos de agua al día
- ☐ Otra: _____

Consulta antes si...

- Bajas de peso sin querer o ves sangre en las deposiciones.
- Los síntomas te despiertan en la noche.
- Has tenido problemas con la comida o con tu peso.

Etapa 1 no es para siempre: si no mejoras en 6 semanas, la dieta no es para ti.