Azúcares que fermentan

Son azúcares que el intestino absorbe mal. Llegan al colon, atraen agua y fermentan: eso da gases, hinchazón, dolor y cambios en las deposiciones. No hacen daño, pero en el colon irritable el intestino es más sensible.

- **O** — **Oligosacáridos:** trigo, cebolla, ajo, porotos, lentejas
- **D** — **Disacáridos:** lactosa de la leche y el yogurt
- **M** — **Monosacáridos:** miel, manzana, pera, sandía
- **P** — **Polioles:** palta, ciruela, champiñones, dulces "sin azúcar"

7 de 10 personas con colon irritable mejoraron en un estudio. No le sirve a todos: por eso es una prueba.

No es para siempre ni es una dieta sin gluten.

Basado en estudios de Monash University y en las guías británica y americana de colon irritable (2021).

Mis 3 etapas

1 **Quitar · 2 a 6 semanas**
Desde _____ hasta _____

2 **Probar de a uno · 6 a 8 semanas**
Desde _____ hasta _____

3 **Mi dieta personal**
Como de todo, limitando solo lo que me hizo mal.

Al terminar la etapa 1, ¿mejoré?

- ☐ Sí: paso a la etapa 2
- ☐ No: vuelvo a comer normal y lo converso con mi médico

Próximo control: _____


Médico/a: _____

Nutricionista: _____

Material educativo general. No reemplaza la indicación de tu médico ni la evaluación de un nutricionista. Revisado nov. 2026.

Dieta baja en FODMAP

Mi plan para descubrir qué me cae mal



Nombre: _____

Fecha: _____

ETAPA 1

Cambia esto por esto

~~**Pan de trigo, marraqueta, fideos**~~	→ Pan de masa madre auténtica o sin gluten, arroz, papa, avena, quínoa
~~**Cebolla y ajo**~~	→ Parte verde del cebollín y del puerro, ciboulette, aceite con sabor a ajo
~~**Leche, yogurt, quesillo**~~	→ Leche y yogurt sin lactosa, quesos maduros
~~**Manzana, pera, sandía, mango, durazno**~~	→ Plátano firme, naranja, mandarina, kiwi, frutillas, piña
~~**Porotos, lentejas, garbanzos**~~	→ ¼ taza en lata bien enjuagados, tofu firme, huevo
~~**Champiñones, coliflor**~~	→ Zanahoria, zapallo italiano, pepino, lechuga, tomate, espinaca
~~**Miel, dulces "sin azúcar"**~~	→ Azúcar común en poca cantidad
~~**Palta en cantidad**~~	→ Hasta ⅛ de palta por comida

Carnes, pescados, huevos y aceites no tienen FODMAP. Ojo con cebolla y ajo en polvo e inulina en caldos, aliños y panes.

ETAPA 2

Mi registro de pruebas

Un grupo a la vez, 3 días de menos a más. Anota tus síntomas de **0** (nada) a **10** (muy fuerte). Si te cae mal, para y descansa 2 a 3 días antes del siguiente.

GRUPO · ALIMENTO	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Lactosa · leche			
Fructosa · miel			
Sorbitol · palta			
Manitol · champiñones			
Trigo · pan de molde			
Cebolla · cocida			
Ajo			
Legumbres · lentejas			

Lo que me hizo mal

_____

_____

ACORDADO EN LA CONSULTA

Mis indicaciones

- ☐ Examen de celiaquía antes de dejar el trigo
- ☐ Etapa 1 por ____ semanas
- ☐ Hora con nutricionista
- ☐ Comer a horarios regulares, sin saltarse comidas
- ☐ Menos café, alcohol y bebidas con gas
- ☐ Mantener fibra: avena, kiwi, zanahoria, chía o linaza
- ☐ Tomar 6 a 8 vasos de agua al día
- ☐ Otra: _____

⚠ Consulta antes si...

- Bajas de peso sin querer o ves sangre en las deposiciones.
- Los síntomas te despiertan en la noche.
- Has tenido problemas con la comida o con tu peso.

Etapa 1 no es para siempre: si no mejoras en 6 semanas, la dieta no es para ti.