¿POR QUÉ ESTA DIETA?

## Comer así baja la presión

**−11 mmHg**

En personas con presión alta, la dieta DASH bajó la presión máxima en unos 11 puntos. Es un efecto parecido al de un medicamento, y se nota en 2 a 4 semanas.

### ¿Cómo funciona?

Las verduras, frutas y legumbres traen **potasio y fibra**, que ayudan a relajar las arterias.

Los lácteos descremados aportan **calcio** sin grasa saturada.

Con **menos sal**, el cuerpo retiene menos líquido y la presión baja aún más.

**Sigue tomando tus remedios. La dieta los acompaña, no los reemplaza.**

Basado en los estudios DASH (1997) y DASH-Sodio (2001) y en la guía europea de hipertensión 2024.

PARA RECORDAR

## Un día DASH a la chilena

| | |
|---|---|
| DESAYUNO | Avena cocida en leche descremada, con plátano y un puñadito de nueces. |
| MEDIA MAÑANA | Una manzana o una naranja. |
| ALMUERZO | Lentejas con zapallo y verduras, sin cubo de caldo. Ensalada chilena con limón y aceite de oliva. Fruta de postre. |
| ONCE | Pan integral pequeño con palta y quesillo. Té o café sin azúcar. |
| CENA | Pollo al horno sin piel, verduras salteadas y ½ taza de arroz integral. |
| NOCHE | Un yogurt descremado sin azúcar. |

### Guía completa en tu celular

Escanea el código para ver la ficha de la dieta DASH, con más ejemplos y trucos. También la puedes imprimir.

`dietario.vercel.app/dash`

**Indicaciones de tu médico**

_____

_____


**Mi meta de presión: menos de** _____

**Próximo control:** _____



# Dieta DASH

## Mi plan para bajar la presión




**Nombre:** _____

**Fecha:** _____

CUÁNTO COMER

# Tus porciones del día

Referencia para un adulto de unas 2.000 calorías. Tu médico o nutricionista puede ajustarla.

**Verduras**
**4–5 al día**
1 taza cruda o ½ taza cocida

**Frutas**
**4–5 al día**
1 fruta mediana o ½ taza picada

**Cereales integrales**
**6–8 al día**
1 rebanada de pan, ½ taza de arroz, fideos o avena

**Lácteos descremados**
**2–3 al día**
1 taza de leche, 1 yogurt, 1 lámina de quesillo

**Pescado, pollo, huevo**
**Hasta 2 al día**
Media palma (75 g) o 1 huevo

**Aceites y palta**
**2–3 al día**
1 cdta de aceite o 2 cdas de palta

**Legumbres y frutos secos**
**4–5 a la semana**
½ taza cocida o 1 puñado sin sal

**Dulces**
**Máx. 5 a la semana**
1 cda de azúcar, mermelada o miel

LO MÁS IMPORTANTE




**Sal: menos de 1 cucharadita al día**
En total, sumando la que ya viene en los alimentos. La mayor parte no sale del salero.

### Dónde se esconde la sal

- Pan y marraqueta
- Jamón, salame, vienesas
- Quesos maduros
- Cubos de caldo y sopas en sobre
- Papas fritas y snacks
- Salsa de soya y kétchup




Si ves este sello, busca otra opción o cómelo solo de vez en cuando.

### Da sabor sin sal

Ajo, cebolla, limón, orégano, comino, pimienta, hierbas frescas y merkén sin sal.

### Trucos que funcionan

- Saca el salero de la mesa.
- Agrega una verdura al almuerzo y otra a la cena.
- Compara el sodio de las etiquetas entre marcas.
- Cocina en casa más seguido.
- El gusto se acostumbra a menos sal en 2 a 3 semanas.

QUÉ COMER

# El semáforo

### ✓ Todos los días

- Verduras de todos los colores
- Frutas enteras
- Porotos, lentejas, garbanzos
- Avena, arroz y pan integral
- Leche y yogurt descremados
- Pescado
- Pollo sin piel, huevo
- Nueces y almendras sin sal
- Aceite de oliva o canola
- Palta

### ! Con moderación

- Pan blanco y marraqueta (traen sal)
- Quesos: mejor quesillo o queso fresco
- Carne roja magra, 1 a 2 veces por semana
- Jugos de fruta: mejor la fruta entera
- Mantequilla
- Legumbres en lata: enjuágalas antes

### ✕ Evitar

- Jamón, salame, longaniza
- Cubos de caldo, sopas en sobre
- Snacks salados
- Comida rápida
- Bebidas y jugos azucarados
- Pasteles y galletas

### Avisa a tu médico si...

- Tienes enfermedad renal o el potasio alto.
- Te sientes mareado al levantarte.
- Tienes diabetes con insulina, celiaquía o intolerancia a la lactosa.