Azúcares que fermentan

Son azúcares que el intestino absorbe mal. Llegan al colon, atraen agua y fermentan: eso da gases, hinchazón, dolor y cambios en las deposiciones. No hacen daño, pero en el colon irritable el intestino es más sensible.

- **O** — **Oligosacáridos:** trigo, cebolla, ajo, porotos, lentejas
- **D** — **Disacáridos:** lactosa de la leche y el yogurt
- **M** — **Monosacáridos:** miel, manzana, pera, sandía
- **P** — **Polioles:** palta, ciruela, champiñones, dulces "sin azúcar"

7 de 10 personas con colon irritable mejoraron en un estudio. No le sirve a todos: por eso es una prueba.

No es para siempre ni es una dieta sin gluten.

Basado en estudios de Monash University y en las guías británica y americana de colon irritable (2021).

Las 3 etapas

1 **Quitar · 2 a 6 semanas**
Cambia los alimentos altos en FODMAP por otros bajos. Si no mejoras en este plazo, la dieta no es para ti: vuelve a comer normal y consúltalo.

2 **Probar de a uno · 6 a 8 semanas**
Vuelve a comer un grupo a la vez, en cantidad creciente, y anota cómo te sientes.

3 **Tu dieta · para siempre**
Come de todo y limita solo lo que te hizo mal, en la cantidad que te hizo mal.

Guía completa en tu celular

Escanea el código para ver la ficha de la dieta baja en FODMAP, con más ejemplos y trucos. También la puedes imprimir.

`dietario.vercel.app/fodmap`

Indicaciones de tu médico

_____


_____

Etapa 1 por _____ semanas · Nutricionista: _____

Próximo control: _____

Dieta baja en FODMAP

Mi plan para descubrir qué me cae mal



Nombre: _____

Fecha: _____

ETAPA 1

Cambia esto por esto

~~**Pan de trigo, marraqueta, fideos**~~	→ Pan de masa madre auténtica o sin gluten, arroz, papa, avena, quínoa
~~**Cebolla y ajo**~~	→ Parte verde del cebollín y del puerro, ciboulette, aceite con sabor a ajo
~~**Leche, yogurt, quesillo**~~	→ Leche y yogurt sin lactosa, quesos maduros
~~**Manzana, pera, sandía, mango, durazno**~~	→ Plátano firme, naranja, mandarina, kiwi, frutillas, piña
~~**Porotos, lentejas, garbanzos**~~	→ ¼ taza en lata bien enjuagados, tofu firme, huevo
~~**Champiñones, coliflor**~~	→ Zanahoria, zapallo italiano, pepino, lechuga, tomate, espinaca
~~**Miel, dulces "sin azúcar"**~~	→ Azúcar común en poca cantidad
~~**Palta en cantidad**~~	→ Hasta ⅛ de palta por comida

ETAPA 1

Puedes comer tranquilo

Proteínas y grasas
Carnes, pollo, pescado, huevo, tofu firme y aceites. No tienen FODMAP.

Cereales y tubérculos
Arroz, papa, avena, quínoa, pan sin gluten.

Verduras
Zanahoria, zapallo italiano, pepino, lechuga, tomate, espinaca, pimentón, parte verde del cebollín.

Frutas (una por vez)
Plátano firme, naranja, mandarina, kiwi, frutillas, piña.

Lácteos
Leche y yogurt sin lactosa, quesos maduros (gauda, mantecoso, parmesano).

✕ Revisa las etiquetas
Evita productos con cebolla o ajo en polvo, inulina, fibra de achicoria, miel o endulzantes terminados en "-ol" (sorbitol, manitol). Suelen estar en caldos, aliños, panes y dulces "sin azúcar".

Errores frecuentes
- Quedarse en la etapa 1 para siempre.
- Confundirla con una dieta sin gluten.
- Quitar más alimentos de los necesarios.

ETAPA 2

Cómo volver a probar

1. **Un grupo a la vez.** Sigue la dieta y agrega solo el alimento de prueba.
2. **3 días, de menos a más**, como en la tabla. Anota tus síntomas.
3. **Si te cae mal, para.** Espera a estar sin síntomas.
4. **Descansa 2 a 3 días** antes del siguiente grupo.

GRUPO · ALIMENTO	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Lactosa · leche	¼ taza	½ taza	1 taza
Fructosa · miel	1 cdta	2 cdtas	1 cda
Sorbitol · palta	¼	⅓	½
Manitol · champiñón	¼ taza	½ taza	1 taza
Trigo · pan molde	½ reb.	1 reb.	2 reb.
Cebolla cocida	1 cda	2 cdas	¼ taza
Ajo	¼ diente	½	1 diente
Legumbres · lentejas	¼ taza	½ taza	¾ taza

⚠ Consulta antes si...
- Bajas de peso sin querer o ves sangre en las deposiciones.
- Los síntomas te despiertan en la noche.
- Has tenido problemas con la comida o con tu peso.