

Diyabetik Acillerde İlk Yardım

Acil Durum İlk Yardım Rehberi

Genel Bilgi ve Belirtiler

Diyabetik aciller, kan şekerinin aniden çok düşmesi (Hipoglisemi) veya çok yükselmesi (Hiperglisemi) durumlarında ortaya çıkar. İlk yardımda en sık karşılaşılan ve en acil olan durum **kan şekeri düşüklüğüdür**. Bilinci kapanan bir hastada beyin hücreleri şekersiz kalacağı için dakikalar içinde kalıcı hasar oluşabilir.

Belirtiler (Neye Dikkat Edilmeli?)

- **Şeker Düşmesi (Hipoglisemi):** Aniden başlayan soğuk terleme, titreme, çarpıntı, aşırı açlık hissi, sinirlilik, solukluk, baş dönmesi, kafa karışıklığı ve ileri seviyede bilinç kaybı.
- **Şeker Yükseliği (Hiperglisemi):** Kademeli başlar. Aşırı susama, sık idrara çıkma, ciltte kuruluk, yorgunluk, derin ve hızlı solunum, nefeste aseton (çürük elma) kokusu.

✓ YAPILMASI GEREKENLER

- Hastanın bilincini ve solunumunu kontrol edin.
- Eğer hastanın **bilinci AÇIK ise** ve yutkunabiliyorsa; derhal kana hızlı karışacak bir şeker verin (2-3 adet kesme şeker, 1 bardak meyve suyu veya şekerli su).
- Hastanın bilinci açık ama durumu 15 dakika içinde düzelmiyorsa şeker takviyesini tekrarlayın ve 112'yi arayın.
- Eğer hastanın **bilinci KAPALI ise**; hastayı güvenli yan yatış (koma) pozisyonuna getirin.

× YAPILMAMASI GEREKENLER

- Bilinci kapalı olan veya yutkunmakta zorlanan hastaya **KESKİNLİKLE ağızdan yiyecek veya içecek vermeyin** (boğulmaya neden olabilir).
- Emin olmadığınız durumlarda hastaya dışarıdan insülin enjekte etmeye çalışmayın (kan şekeri zaten düşükse ölümcül olabilir).
- Hastayı ayağa kaldırmaya veya yürütmeye zorlamayın.

- Hava yolunun açık olduğundan emin olun ve hemen 112 Acil Yardım'ı arayın.



ACİL BİR DURUMDA KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ RİSKE ATMADAN 112'Yİ ARAYIN!