

Sarılık Durumunda Bilgilendirme ve İlk Yardım

Acil Durum İlk Yardım Rehberi

Genel Bilgi ve Belirtiler

Sarılık (İkterus), bir hastalık değil; kanda 'bilirubin' adlı maddenin birikmesi sonucu cilt, göz akı ve mukozaların sarı renk almasıyla ortaya çıkan bir **belirtidir**. Ani gelişen sarılık durumlarında evde yapılacak bir 'ilk yardım' müdahalesinden ziyade, altında yatan ciddi karaciğer veya safra kesesi hastalıklarının tespiti için acil tıbbi başvuru gerekir.

Belirtiler (Neye Dikkat Edilmeli?)

- Göz aklarının (sklera) ve cildin belirgin şekilde sararması.
- İdrar renginin koyulaşması (çay rengi).
- Dışkı renginin açılması (camcı macunu rengi veya beyazımsı).
- Aşırı halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık.
- Mide bulantısı, kusma, karın sağ üst kısmında ağrı.
- Özellikle yenidoğan bebeklerde aşırı uyku hali, emmede isteksizlik (Yenidoğan Sarılığı).

✓ YAPILMASI GEREKENLER

- Yetişkin birinde ani sarılık geliştirse (özellikle ateş, şiddetli karın ağrısı veya bilinç bulanıklığı eşlik ediyorsa) derhal **Acil Servise başvurun**. Bu akut hepatit, safra yolu tıkanıklığı veya karaciğer yetmezliği işareti olabilir.
- Hastanın dinlenmesini sağlayın.
- Mide bulantısı ve kusma varsa hastanın sıvı kaybını (dehidrasyon) önlemek için yudum yudum temiz su içmesini sağlayın.

✗ YAPILMAMASI GEREKENLER

- Evde kendi kendinize bitkisel ilaçlar, kürler (limonlu su, maydanoz suyu vb.) uygulayarak doktora gitmeyi **geciktirmeyin**.
- Doktor tavsiyesi olmadan ağrı kesici (özellikle parasetamol) veya başka bir ilaç vermeyin (karaciğeri daha fazla yorabilir).
- 'Geçer' diyerek özellikle yenidoğanlardaki sarılığı ihmal etmeyin;

- **Yenidoğan bebeklerde:** Sarılık fark edildiğinde bebeęi sık sık emzirin (anne sütü bilirubinin atılmasını hızlandırır) ve vakit kaybetmeden çocuk doktoruna götürün. Işık tedavisi (Fototerapi) gerekebilir.

aşırı yüksek bilirubin beyne geçerek kalıcı zeka geriliğine ve işitme kaybına (Kernikterus) yol açabilir.



ACİL BİR DURUMDA KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ RİSKE ATMADAN 112'Yİ ARAYIN!