

Def. Dato lo spazio di prob. (Ω, \mathcal{A}, P) si dice
variabile aleatoria un'applicazione $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$
tali che $\forall t \in \mathbb{R}$ l'insieme $\{\omega: X(\omega) \leq t\} \in \mathcal{A}$.

Più in generale, è fondamentale per la v.a. la stime
di $P\{\omega \in \Omega: X(\omega) \in A\}$, ove $A \subset \mathbb{R}$.

L'applicazione $A \rightarrow P\{\omega: X(\omega) \in A\} = P\{X^{-1}(A)\}$
che associa ad ogni s.i. A di \mathbb{R} la prob. che X prenda
valori in A , si chiama legge o distribuzione della v.a. X

Es. Se rappresento di giocare alla roulette, sia
 X = ammontare del nostro capitale dopo n partite
 X è una v.a.

Oss.
~~Se~~ $\{\omega: X(\omega) > a\}$ è un evento $\forall a \in \mathbb{R}$, essendo il
complementare di $\{\omega: X(\omega) \leq a\}$.
Inoltre $\{\omega: a < X(\omega) \leq b\} = \{X(\omega) \leq b\} \cap \{X(\omega) > a\}$
è un evento finito \cap di eventi.
 $\{\omega: X(\omega) = n\}$, $n \in \mathbb{R}$, è un evento:
 $\{\omega: X(\omega) = n\} = \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \{\omega: n - \frac{1}{m} < X(\omega) \leq n\}$

Varievoli aleatorie discrete

2.

Supponiamo che X (v.a.) assuma solo un'infinità numerabile di valori: $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$

X è una v.a. discreta.

Dato una v.a. discreta X , costruiamo la funzione

$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definita da

$p(x) = P\{X=x\}$, $x \in \mathbb{R}$. $p(x)$ gode delle proprietà:

(i) $p(x) = 0$ tranne se $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$

(ii) $\sum_{x \in \mathbb{R}} p(x) = 1$

Chiameremo densità discreta una funzione p che soddisfa (i) e (ii).

Nel caso di una v.a. discreta, più semplicemente, si definisce $p_i = P\{X=x_i\}$, $i=1, 2, \dots$ funzione di probabilità.

Se $A \subset \mathbb{R}$:

$$P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} P(X=x_i) = \sum_{x_i \in A} p_i$$

Esempio (v.a. indicatrice)

Sia (Ω, \mathcal{A}, P) uno spazio di prob. e $A \in \mathcal{A}$. Sia 1_A la

funzione indicatrice di A : $1_A: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A \\ 0 & \text{se } \omega \notin A \end{cases}$$

$\Rightarrow X = 1_A$ è una v.a. discreta

$$p_1 = P\{X=1\} = P\{\omega \in \Omega: 1_A(\omega)=1\} = P(A)$$

$$p_0 = P\{X=0\} = P(A^c) = 1 - P(A)$$

1. Esempio (legge Binomiale)

Riprendiamo l'esempio della moneta equilibrata lanciata n volte: ora abbiamo calcolato la prob. che ~~nessun~~ esce K volte teste e $(n-K)$ volte croce.

ε' un tipo severa miceno-dunicea.

Podemos $X_K = 1$ se el K-ésimo lanzamiento es éxito.
 $X_K = 0$ " " " " " "

Then $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is a v.a. b/c

che $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ ~~es~~ ~~per~~ $p \in (0,1)$

Dunque la funzione di prob. della v.e. discreta $X \in \{0, 1, \dots, n\}$ è $P_K = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

(distrib. binomiale de parametri n e p : $B(n, p)$)

per $n=1$, X è definita da una v.a. che assume valori

$0 \leq 1$ con $p_0 = 1 - p$; $p_1 = p$.

(distrib. de Bernoulli ($B(1, p)$))

2. Esempio (schiuma succoso-lusuccoso senza rimpetto)

Esempio (Schema iniziale)

Un'urna contiene 8 palline rosse e 2 bianche. Ne vengono estratte 3 senza rimpasto. Qual è la prob. di estrarre al più 1 bianca?

Albero già visto che per la estrazione senza rimpicci
il n° totale X di palline bianche estratte ha distribuzione

signature:

$$P(X=K) = \frac{\binom{2}{K} \binom{8}{10-K}}{\binom{10}{3}} \Rightarrow P(X=0) = \frac{\binom{2}{0} \binom{8}{3}}{\binom{10}{3}}$$

$P(X=1) = \frac{\binom{2}{1} \binom{8}{2}}{\binom{10}{3}}$ e la prob. richiesta è la prob.

$$\text{da } A = \{\omega: X(\omega) \leq 1\} = \{X=0\} \cup \{X=1\}$$

$$P(A) = P(X=0) + P(X=1) = 0.933$$

3. Esempio (schema successo-insuccesso con ripetizione)

7 bulloni prodotti da una ditta sono difettosi con una probabilità del 20% e vengono messi in commercio in confezioni da 3 pezzi ciascuna. Qual è la prob. che in una confezione vi sia al più un bullone difettoso?

Supponiamo che il fatto che uno dei bulloni sia difettoso è indep. del fatto che lo sono o meno gli altri.

Usiamo lo schema successo-insuccesso con $n=3$ e $p=0.2$.

Il numero X di bulloni difettosi è una v.a. $B(3, 0.2)$

Dunque la prob. richiesta è:

$$P(X=0) + P(X=1) = \binom{3}{0} 0.8^3 + \binom{3}{1} 0.2 \cdot 0.8^2 = 0.896$$

Nei 2 esempi precedenti abbiamo osservato una v.a. X che conta quante volte un determinato fenomeno si verifica in una sequenza di prove ripetute

In entrambe le situazioni la prob. che il fenomeno si verifichi in ogni singola prova (il bullone difettoso o la pallina bianca estratta, resp.) è la stessa (0.2 - infatti in 10 palline (8+2), due sono le probabilità di estrazione 1 bianca). La differenza risiede nel fatto che nel 1° esempio le prove ripetute non sono indipendenti.

4. Esempio

Sapendo che il 30% dei passeggeri che hanno prenotato non si presenta alla partenza, una compagnia aerea accetta fino a 28 prenotazioni su un volo con la capacità di 24 posti. Qual è la prob. che (almeno) un passeggero che ha regolarmente prenotato resti a terra?

- Usiamo lo schema successo-insuccesso (binomiale)

Il n° X di passeggeri che si presentano è il n° di successi su 28 prove indipendenti, dove in ogni prova si ha successo con prob. $p = 1 - 0.3 = 0.7$.


X ha legge $B(28, 0.7)$. La prob. richiesta è:

$$P(X \geq 25) = \sum_{k=25}^{28} \binom{28}{k} 0.7^k 0.3^{28-k} = P(X=25) + P(X=26)$$


$$+ P(X=27) + P(X=28) = 0.0157.$$

Come si vede è piuttosto piccola!

Andamento distrib. Binomiale



Andamento di una f. di prob. (distrib. discreta) $B(8, 0.5)$



Andamento di una f. di prob. $B(8, 0.2)$

Il valore max non si trova lontano da MP

5. Esempio

Un dado viene lanciato più volte fino a che si ottiene 6.
Qual è la prob. che occorrono esattamente K lanci?

Se $T = \#$ lanci necessari;

$X_K = \#$ volte in cui si è ottenuto 6 nei primi K lanci.

L'evento "nei primi K lanci non è mai apparso il 6"

è dato da $\{T > K\}$ oppure $\{X_K = 0\}$.

Ma X_K ha distrib. $B(K, \frac{1}{6})$, dunque:

$$P(T > K) = P(X_K = 0) = \binom{K}{0} p^0 (1-p)^K = (1-p)^K = \left(\frac{5}{6}\right)^K$$

A noi serve $P(T = K)$; ma:

$$\{T = K\} \cup \{T > K\} = \{T > K-1\} \quad (\text{unione disgiunta})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(T = K) &= P(T > K-1) - P(T > K) = \\ &= (1-p)^{K-1} - (1-p)^K = p(1-p)^{K-1} = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{K-1} \end{aligned}$$

Se $K=1$, la prob. di ottenere un solo lancio perché esca un 6 è $\frac{1}{6}$, come è ovvio.

Si chiama distribuzione geometrica quella di una v.a. X che ha per funzione di ~~distribuzione~~ prob.

$$P(X=K) = P_K = p(1-p)^K, \quad K = 0, 1, 2, \dots, \quad p \in (0, 1)$$

Si ha, ovviamente,

$$\sum_{K=0}^{\infty} P_K = p \sum_{K=0}^{\infty} (1-p)^K = p \cdot \frac{1}{p} = 1$$

(ricordando la somma di una serie geometrica)

Nell'es. precedente $T-1$ ha distrib. geometrica di parametro

$$P. \quad (infatti P\{T-1=K\} = P\{T=K+1\} = p(1-p)^K)$$

Richiamiamo prima alcune cose sulle somme geometriche.

Si ha:

$$\sum_{i=0}^N q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q};$$

inoltre, se $|q| < 1$, la serie

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i$$

converge e risulta:

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1 - q} \quad (*)$$

Se X ha distribuzione Geometrica di parametro $p \in (0, 1)$, per $k \geq 0$:

$$P(X \geq k) = \sum_{i=k}^{\infty} p(1 - p)^i,$$

che, posto $j = i - k$, diventa:

$$\sum_{j=0}^{\infty} p(1 - p)^{j+k} = (1 - p)^k \sum_{j=0}^{\infty} p(1 - p)^j;$$

Siccome

$$\sum_{j=0}^{\infty} p(1 - p)^j = 1,$$

[infatti

$$\sum_{j=0}^{\infty} p(1 - p)^j = p \sum_{j=0}^{\infty} (1 - p)^j = p \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)} = \frac{p}{p} = 1,$$

grazie a (*)],
otteniamo infine:

$$P(X \geq k) = (1 - p)^k, \quad k = 0, 1, \dots$$

Allora, se T è l'istante di primo successo in una sequenza di prove indipendenti e Bernoulliane, in cui la probabilità del successo è costante, ed uguale a p , otteniamo, per $k = 1, 2, \dots$:

$$P(T > k) = P(T - 1 > k - 1) = P(T - 1 \geq k) = P(X \geq k) = (1 - p)^k,$$

dove abbiamo posto $T - 1 = X$, e la v.a. X ha distribuzione geometrica di parametro p .

Proprietà di mancanza di memoria di variabili aleatorie discrete

Una variabile aleatoria discreta Z a valori interi non negativi gode della proprietà di mancanza di memoria se per ogni n ed m interi non negativi:

$$P(Z > n + m | Z > n) = P(Z > m) \quad (A1)$$

1. Sia T l'istante di primo successo in una successione di prove ripetute di Bernoulli e indipendenti, in ciascuna delle quali la probabilità del successo è costante, ed è uguale a $p \in (0, 1)$; sappiamo che T ha distribuzione geometrica modificata di parametro p , ovvero $X = T - 1$ ha distribuzione geometrica di parametro p . Ebbene, T gode della proprietà di mancanza di memoria, ovvero vale (A1); infatti, si ha:

$$\begin{aligned} P(T > n + m | T > n) &= \frac{P(T > n + m, T > n)}{P(T > n)} = \frac{P(T > n + m)}{P(T > n)} \\ &= \frac{(1 - p)^{n+m}}{(1 - p)^n} = (1 - p)^m = P(T > m). \end{aligned}$$

Per illustrare il significato della proprietà di assenza di memoria, osserviamo che, se nelle prime n prove non si è avuto alcun successo, la probabilità che non si verifichi alcun successo fino alla prova $n + m$ non dipende da n , ossia da quanto si è atteso, ma solo dal numero m di prove ancora da effettuarsi.

Ad esempio, calcoliamo la probabilità che nel gioco del lotto il numero 34 non esca in n successive estrazioni su una ruota fissata. Denotiamo con E_k l'evento “nella k -esima estrazione esce il numero 34 sulla fissata ruota”, per $k = 1, 2, \dots$. Utilizzando lo schema successo-insuccesso in estrazioni senza rimpiazzo (distribuzione ipergeometrica), si trova facilmente che $P(E_k) = 1/18$. Sia ora T il numero minimo di estrazioni sulla ruota fissata, affinché si presenti per la prima volta il numero 34. Come si sa, T ha distribuzione geometrica modificata di parametro $p = 1/18$. Se indichiamo con A_n l'evento “il numero 34 non esce nelle prossime n estrazioni sulla ruota fissata”, allora

$$P(A_n) = P(T > n) = \left(1 - \frac{1}{18}\right)^n = \left(\frac{17}{18}\right)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

Osserviamo che la probabilità che il numero 34 non esca in n estrazioni successive è strettamente decrescente in n ; ciò significa che ritardi via via più lunghi diventano sempre meno probabili.

Comunque, dalla (A1) si ottiene:

$$P(A_{n+m} | A_n) = P(A_m)$$

ovvero, la probabilità che il numero 34 non esca nelle successive $n+m$ estrazioni, avendo osservato che esso non è uscito nelle prime n estrazioni, non dipende da n , cioè dal cosiddetto “ritardo” dell’evento.

2. Mostriamo ora che la geometrica modificata è l’unica distribuzione discreta, a valori interi positivi, che ha la proprietà di mancanza di memoria.

Infatti, supponiamo che per Z valga (A1); posto $q_h = P(Z > h)$, $h = 1, 2, \dots$ essa si scrive:

$$q_{n+m} = q_m \cdot q_n$$

Intanto, per $m = 0$ si ha $q_n = q_0 \cdot q_n$ e quindi, semplificando q_n , si ottiene $q_0 = P(Z > 0) = 1$. Inoltre, per $m = 1$, si ha $q_{n+1} = q_1 \cdot q_n$, e quindi, procedendo per induzione, si ottiene $q_n = P(Z > n) = q_1^n$. Allora $P(Z \geq n+1) = q_1^n$ e $P(Z \geq n) = q_1^{n-1}$. Ma $P(Z = n) = P(Z \geq n) - P(Z \geq n+1) = q_1^{n-1} - q_1^n = q_1^{n-1}(1 - q_1)$. Posto $p = 1 - q_1$, si ottiene infine:

$$P(Z = n) = p(1 - p)^{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

ovvero Z ha distribuzione geometrica modificata di parametro p .

3. Per una v.a. $X \sim \text{Geom}(p)$, la proprietà di mancanza di memoria, si può scrivere:

$$P(X = m + k | X \geq m) = P(X = k) \quad (\text{A2})$$

E’ facile verificare che (A2) vale, poiché:

$$\begin{aligned} P(X = m + k | X \geq m) &= \frac{P(X = m + k)}{P(X \geq m)} = \frac{p(1 - p)^{m+k-1}}{(1 - p)^m} = \\ &= p(1 - p)^{k-1} = P(X = k) \end{aligned}$$

Mostriamo ora, analogamente a quanto fatto prima, che la v.a. geometrica è l’unica v.a discreta a valori interi non negativi che soddisfa la proprietà (A2). Infatti, posto $p_k = P(X = k)$, la (A2) si può scrivere:

$$\begin{aligned} p_{m+k} &= p_k \sum_{k=m}^{\infty} p_k = p_k \left(1 - \sum_{k=0}^{m-1} p_k \right) \\ &= p_k(1 - p_0 - p_1 - \dots - p_{m-1}). \end{aligned}$$

Allora, per $m = 1$ si ottiene: $p_{k+1} = p_k(1 - p_0)$ e, procedendo per induzione:

$$p_k = p_0(1 - p_0)^k, \quad k = 0, 1, \dots$$

Posto $p_0 = p$, vediamo subito che quella sopra è la densità discreta di una v.a. geometrica di parametro p .

6. Distribuzione di Poisson

è la funzione di prob. di una v.e. X discreta
in cui:

$$p_k = P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1 \right)$$

Approssimazione di una legge binomiale

Sia $X \sim B(n, \frac{\lambda}{n})$ e studiamo il comportamento
della legge di X per $n \rightarrow \infty$.

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} =$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Dunque, se n è molto grande, se $X \sim B(n, p)$, la sua
legge può essere approssimata con ~~quella~~ una distrib.
di Poisson di parametro $\lambda = np$.

Esempio

La prob. di centrare un bersaglio è 0.001 per ogni colpo.
Qual è la prob. di centrare un bersaglio con due o più
pallottole se il n° dei colpi sparati è 5000?

Usiamo uno schema ~~di Bernoulli~~ di Bernoulli successo-rinuccesso,
di parametri n e $p = 0.001$.

La prob. richiesta è:

$$P(X \geq 2) = \sum_{k=2}^{5000} \binom{5000}{k} p^k (1-p)^{5000-k} = 1 - P(X=0) - P(X=1)$$

~~Allo~~

$$P(X=0) = \binom{5000}{0} (1-p)^{5000} \approx 0.00672$$

$$P(X=1) = \binom{5000}{1} p (1-p)^{4999} \approx$$

Si ha $np = 0.001 \cdot 5000 = 5$ e per l'approssimazione
di Poisson:

$$P(X=0) \sim e^{-5}$$

$$P(X=1) \sim 5e^{-5}$$

Dunque, la prob. richiesta è $\approx 1 - 6e^{-5} \approx 0.9596$.

Come si vede l'approx di Poisson è molto utile
del punto di vista computazionale (è ben difficile
calcolare $(1-p)^{5000}!$).

$$X \sim \text{Iper}(z, b, n)$$

In un'urna z palline rosse, b bianche.

n estrazioni senza rimpiazzo.

$X = \#$ palline rosse estratte

$$P(X=k) ? \quad k=0, 1, \dots, \min(z, n) \quad k \geq n-b$$

gruppi

rosse z	bianche b
--------------	----------------

numero
di
semplici

rosse k	bianche $n-k$
--------------	------------------

n. di
modi $\binom{z}{k} \binom{b}{n-k}$

n. totale
di possibili $\binom{z}{n} \binom{b}{n-k}$

$$\boxed{n-b \leq k \leq \min(z, n)}$$

$$\Rightarrow P(X=k) = \frac{\# \{X=k\}}{\# \Omega} ; \# \Omega = \# \text{ risultati possibili, n. di campioni possibili di } n \text{ palline rosse su } b+z = \binom{b+z}{n}$$

$$\text{allora: } P(X=k) = \frac{\binom{z}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{b+z}{n}}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{z}{k} \binom{b}{n-k} = \frac{1}{\binom{b+z}{n}} \sum_{k=0}^n \frac{z!}{k!(z-k)!} \cdot \frac{b!}{(n-k)!(b-n+k)!}$$