

## Contents

### 172

$$M = \langle X, I \rangle,$$

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Независимое множество - линейно независимое

Базы:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Цикл:  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

### 174

$$M = \langle X, I \rangle$$

$$M/x = \langle X \setminus x, \underbrace{\{A \setminus x \mid A \in I, x \in A\}}_{I_1}, \{x\} \in I$$

Пользуемся тем, что  $\forall A : x \notin A$ , выполняется  $A \cup x \in I \Leftrightarrow A \in I_1$

1.  $\{x\} \in I \Rightarrow \{x\} \setminus x = \emptyset \in I_1$
2.  $A \in I_1, B \subset A \Rightarrow A \cup x \in I, B \cup x \subset A \cup x \Rightarrow B \cup x \in I \Rightarrow B \in I_1$
3.  $A, B \in I_1, |A| > |B| \Rightarrow A \cup x, B \cup x \in I, |A \cup x| > |B \cup x| \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \exists y \in (A \cup x) \setminus (B \cup x) : B \cup \{x, y\} \in I \Rightarrow \exists y \in A \setminus B : B \cup y \in I_1$

### 175

$$M_1 = \langle X, I_1 \rangle, M_2 = \langle Y, I_2 \rangle, X \cap Y = \emptyset$$

$$M = \langle X \cup Y, \underbrace{\{A \cup B \mid A \in I_1, B \in I_2\}}_I \rangle$$

Пользуемся тем что, если  $A \in I$ , то  $\exists X_1 \in I_1, Y_1 \in I_2 : X_1 \cup Y_1 = A$   
и если  $X_1 \in I_1, Y_1 \in I_2$ , то  $X_1 \cup Y_1 \in I$

1.  $\emptyset \in I_1, \emptyset \in I_2 \Rightarrow \emptyset \cup \emptyset = \emptyset \in I$
2.  $A \in I, B \subset A \Rightarrow \exists X_1 \in I_1, Y_1 \in I_2 : X_1 \cup Y_2 = A$   
 $\exists X_2 \subseteq X_1, Y_2 \subseteq Y_1 : X_2 \cup Y_2 = B \Rightarrow X_2 \in I_1, Y_2 \in I_2 \Rightarrow B \in I$
3.  $A, B \in I, |A| > |B| \Rightarrow \exists X_1, X_2 \in I_1, Y_1, Y_2 \in I_2 : A = X_1 \cup Y_1, B = X_2 \cup Y_2$   
 (a)  $|X_1| > |X_2| : \Rightarrow \exists x \in X_1 \setminus X_2 : X_2 \cup x \in I_1 \Rightarrow (X_2 \cup x) \cup Y_2 = B \cup x \in I$   
 (b)  $|Y_1| > |Y_2|$  - аналогично

## 180

$$M = \langle X, I \rangle$$

$$M|_k = \langle X, \underbrace{\{A \mid A \in I, |A| \leq k\}}_{I_1} \rangle$$

Пользуемся тем, что  $|A| \leq k, A \in I \Leftrightarrow A \in I_1$

1.  $|\emptyset| = 0 \leq k \Rightarrow \emptyset \in I_1$
2.  $A \in I_1, B \subset A \Rightarrow A \in I \Rightarrow B \in I, |B| < |A| \leq k \Rightarrow B \in I_1$
3.  $A, B \in I_1, |A| > |B| \Rightarrow A, B \in I \Rightarrow \exists x \in A \setminus B : B \cup x \in I, |B \cup x| \leq |A| \leq k \Rightarrow B \cup x \in I_1$

## 192

1.  $\langle A \rangle \subseteq \langle\langle A \rangle\rangle$
2.  $x \in \langle\langle A \rangle\rangle \Rightarrow r(\langle A \rangle \cup x) = r(\langle A \rangle) = r(A)$   
Заметим, что  $A \cup x \subseteq \langle A \rangle \cup x$   
Тогда  $r(A \cup x) \leq r(\langle A \rangle \cup x) = r(A)$   
 $r(A \cup x) \leq r(A) \Rightarrow r(A) = r(A \cup x) \Rightarrow x \in \langle A \rangle$   
Так как это верно для всех  $x$  из  $\langle\langle A \rangle\rangle$ , то  $\langle\langle A \rangle\rangle \subseteq \langle A \rangle$

$$1, 2 \Rightarrow \langle\langle A \rangle\rangle = \langle A \rangle$$