

Коллоквиум 1

Илья Yaroshevskiy

20 апреля 2021 г.

Содержание

1	Топология	2
1.1	Топологическое пространство, открытое и замкнутое множество	2
1.2	Внутренность и замыкание множества	2
1.3	Топология стрелки	2
1.4	Дискретная топология	2
1.5	Топология на частично упорядоченном множестве	3
1.6	Индукцированная топология	3
1.7	Связность	3
2	Исчисление высказываний	3
2.1	Метапеременные, пропозициональные переменные, Высказывания	3
2.1.1	Язык	3
2.1.2	Мета и предметные	3
2.2	Схемы аксиом, доказуемость	3
2.2.1	Теория доказательств	3
2.3	Правило Modus Ponens, доказательство, вывод из гипотез	4
2.3.1	Правило Modus Ponens и доказательство	4
2.4	Множество истинностных значений, модель (оценка переменных), Оценка высказывания	4
2.4.1	Теория моделей	4
2.5	Общезначимость	4
2.6	Выполнимость	5
2.7	Невыполнимость	5
2.8	Следование	5
2.9	Корректность	5
2.10	Полнота	5
2.11	Противоречивость	5
2.12	Теорема о дедукции	5
2.13	Теорема о корректности	5
2.14	Теорема о полноте ИВ	5
3	Интуиционистское исчисление высказываний	5
3.1	Закон исключенного третьего	5
3.2	Закон снятия двойного отрицания	5
3.3	Закон Пирса	5
3.4	ВНК-интерпретация логических связок	5
3.4.1	Интуиционистская логика	5
3.5	Теорема Гливленко	6
3.6	Решетка	6
3.7	Дистрибутивная решетка	6
3.8	Импликативная решетка	6
3.9	Алгебра Гейтинга	6
3.10	Булева алгебра	6
3.11	Геделева алгебра	6
3.12	Операция $\Gamma(A)$	6
3.13	Алгебра Линденбаума	7
3.14	Свойство дизъюнктивности ИИВ	7
3.15	Свойство нетабличности ИИВ	7
3.16	Модель Крипке, Вынужденность	7

4	Исчисление предикатов	7
4.1	Предикатные и функциональные символы	7
4.1.1	Исчисление предикатов	7
4.2	Константы и пропозициональные переменные	8
4.3	Свободные и связанные вхождения предметных переменных в формулу	8
4.3.1	Вхождение	8
4.3.2	Свободные подстановки	8
4.4	Свобода для подстановки, Правила вывода для кванторов, аксиомы исчисления предикатов для кванторов, оценки и модели в исчислении предикатов	9
4.4.1	Теория доказательств	9
4.5	Теорема о дедукции для исчисления предикатов	9
4.6	Теорема о корректности для исчисления предикатов	9
4.7	Полное множество (бескванторных) формул	9
4.8	Модель для формулы	10
4.8.1	Теория моделей	10
4.9	Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов	10
4.10	Следствие из теоремы Гёделя о полноте исчисления предикатов	11
4.11	Неразрешимость	11
4.12	Исчисления предикатов (формулировка, что такое неразрешимость).	11
5	Арифметика и теории первого порядка	11
5.1	Теория первого порядка	11
5.2	Модели и структуры теорий первого порядка	11
5.3	Аксиоматика Пеано	11
5.4	Определение операций (сложение, умножение, возведение в степень)	11
5.5	Формальная арифметика (язык, схема аксиом индукции и общая характеристика остальных аксиом).	11

1 Топология

1.1 Топологическое пространство, открытое и замкнутое множество

Определение. Рассмотрим множество X — **носитель**. Рассмотрим $\Omega \subseteq 2^X$ — подмножество подмножеств X — **топология**.

1. $\bigcup X_i \in \Omega$, где $X_i \in \Omega$
2. $X_1 \cap \dots \cap X_n \in \Omega$, если $X_i \in \Omega$
3. $\emptyset, X \in \Omega$

1.2 Внутренность и замыкание множества

Определение.

$$(X)^\circ = \text{наиб.}\{w \mid w \subseteq X, w \text{ — откр.}\}$$

1.3 Топология стрелки

1.4 Дискретная топология

Пример. Дискретная топология: $\Omega = 2^X$ — любое множество открыто. Тогда $\langle \Omega, \leq \rangle$ — булева алгебра

1.5 Топология на частично упорядоченном множестве

1.6 Индуцированная топология

1.7 Связность

2 Исчисление высказываний

2.1 Метапеременные, пропозициональные переменные, Высказывания

2.1.1 Язык

1. Пропозициональные переменные

A'_i — большая буква начала латинского алфавита

2. Связки

$\underbrace{\alpha}_{\text{метапеременная}}, \beta$ — высказывания

Тогда $(\alpha \rightarrow \beta), (\alpha \& \beta), (\alpha \vee \beta), (\neg \alpha)$ — высказывания

2.1.2 Мета и предметные

- $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \varphi, \psi, \dots$ — метапеременные для выражений
- X, Y, Z — метапеременные для предметных переменных

Метавыражение: $\alpha \rightarrow \beta$

Предметное выражение: $A \rightarrow (A \rightarrow A)$ (заменяли α на A , β на $(A \rightarrow A)$)

Пример. Черным — предметные выражения, Синим — метавыражения

$$(X \rightarrow Y)[X := A, Y := B] \equiv A \rightarrow B$$

$$(\alpha \rightarrow (A \rightarrow X))[\alpha := A, X := B] \equiv A \rightarrow (A \rightarrow B)$$

$$(\alpha \rightarrow (A \rightarrow X))[\alpha := (A \rightarrow P), X := B] \equiv (A \rightarrow P) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

2.2 Схемы аксиом, доказуемость

2.2.1 Теория доказательств

Определение. Схема высказывания — строка соответствующая определению высказывания, с:

- метапеременными α, β, \dots

Определение. Аксиома — высказывания:

1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$
2. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$
3. $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \& \beta$
4. $\alpha \& \beta \rightarrow \alpha$
5. $\alpha \& \beta \rightarrow \beta$
6. $\alpha \rightarrow \alpha \vee \beta$
7. $\beta \rightarrow \alpha \vee \beta$
8. $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \vee \beta \rightarrow \gamma)$
9. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha$
10. $\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$

2.3 Правило Modus Ponens, доказательство, вывод из гипотез

2.3.1 Правило Modus Ponens и доказательство

Определение. Доказательство (вывод) — последовательность высказываний $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, где α_i :

- аксиома
- существует $k, l < i$, что $\alpha_k = \alpha_l \rightarrow \alpha$

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}$$

Пример. $\vdash A \rightarrow A$

1	$A \rightarrow A \rightarrow A$	(схема аксиом 1)
2	$A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A$	(схема аксиом 1)
3	$(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A)$	(схема аксиом 2)
4	$(A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A)$	(М.Р. 1 и 3)
5	$A \rightarrow A$	(М.Р. 2 и 4)

Определение. Доказательством высказывания β — список высказываний $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — доказательство
- $\alpha_n \equiv \beta$

2.4 Множество истинностных значений, модель (оценка переменных), Оценка высказывания

2.4.1 Теория моделей

- \mathcal{P} — множество предметных переменных
- $\llbracket \cdot \rrbracket : \mathcal{T} \rightarrow V$, где \mathcal{T} — множество высказываний, $V = \{\text{И}, \text{Л}\}$ — множество истинностных значений

1. $\llbracket x \rrbracket : \mathcal{P} \rightarrow V$ — задается при оценке $\llbracket \cdot \rrbracket^{A:=v_1, B:=v_2}$:

- $\mathcal{P} = v_1$
- $\mathcal{P} = v_2$

2. $\llbracket \alpha \star \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket \star \llbracket \beta \rrbracket$, где $\star \in [\&, \vee, \neg, \rightarrow]$



Пример.

$$\llbracket A \rightarrow A \rrbracket^{A:=\text{И}, B:=\text{Л}} = \llbracket A \rrbracket^{A:=\text{И}, B:=\text{Л}} \rightarrow \llbracket A \rrbracket^{A:=\text{И}, B:=\text{Л}} = \text{И} \rightarrow \text{И} = \text{И}$$

Также можно записать так:

$$\llbracket A \rightarrow A \rrbracket^{A:=\text{И}, B:=\text{Л}} = f_{\rightarrow}(\llbracket A \rrbracket^{A:=\text{И}, B:=\text{Л}}, \llbracket A \rrbracket^{A:=\text{И}, B:=\text{Л}}) = f_{\rightarrow}(\text{И}, \text{И}) = \text{И}$$

, где f_{\rightarrow} определена так:

a	b	f_{\rightarrow}
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	И
Л	Л	И

2.5 Общезначимость

Пример. $\models \alpha$ — α общезначимо

2.6 Выполнимость

2.7 Невыполнимость

2.8 Следование

Определение. Следование: $\Gamma \models \alpha$, если

- $\Gamma = \gamma_1, \dots, \gamma_n$
- Всегда когда все $\llbracket \gamma_i \rrbracket = \text{И}$, то $\llbracket \alpha \rrbracket = \text{И}$

2.9 Корректность

Определение. Теория Исчисление высказываний корректна, если при любом α из $\vdash \alpha$ следует $\models \alpha$

2.10 Полнота

Определение. Исчисление полно, если при любом α из $\models \alpha$ следует $\vdash \alpha$

2.11 Противоречивость

2.12 Теорема о дедукции

Теорема 2.1 (о дедукции). $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

2.13 Теорема о корректности

Теорема 2.2 (о корректности). Пусть $\vdash \alpha$

Тогда $\models \alpha$

2.14 Теорема о полноте ИВ

Теорема 2.3 (о полноте). Пусть $\models \alpha$, тогда $\vdash \alpha$

3 Интуиционистское исчисление высказываний

3.1 Закон исключенного третьего

3.2 Закон снятия двойного отрицания

3.3 Закон Пирса

3.4 ВНК-интерпретация логических связок

3.4.1 Интуиционистская логика

$A \vee B$ — плохо

Пример. Докажем: существует a, b , что $a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, но $a^b \in \mathbb{Q}$

Пусть $a = b = \sqrt{2}$. Рассмотрим $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

- Если да, то ОК
- Если нет, то возьмем $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, b = \sqrt{2}, a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$

ВНК-интерпретация. α, β

- $\alpha \& \beta$ — есть α, β
- $\alpha \vee \beta$ — есть α либо β и мы знаем какое
- $\alpha \rightarrow \beta$ — есть способ перестроить α в β
- \perp — конструкция без построения $\neg \alpha \equiv \alpha \rightarrow \perp$

3.5 Теорема Гливенко

3.6 Решетка

Определение. Фиксируем A

Частичный порядок — антисимметричное, транзитивное, рефлексивное отношение

Линейный — сравнимы любые 2 элемента

- $a \leq b \vee b \leq a$
- **Наименьший элемент** S — такой $k \in S$, что если $x \in S$, то $k \leq x$
- **Минимальный элемент** S — такой $k \in S$, что нет $x \in S$, что $x \leq k$

Определение.

- **Множество верхних граней** a и b : $\{x | a \leq x \& b \leq x\}$
- **Множество нижних граней** a и b : $\{x | x \leq a \& x \leq b\}$

Определение.

- $a + b$ — наименьший элемент множества верхних граней
- $a \cdot b$ — наибольший элемент множества нижних граней

Определение. Решетка $= \langle A, \leq \rangle$ — структура, где для любых a, b есть как $a + b$, так и $a \cdot b$, т.е. $a \in A, b \in B \implies a + b \in A$ и $a \cdot b \in A$

3.7 Дистрибутивная решетка

Определение. Дистрибутивная решетка если всегда $a \cdot (b + c) = ab + a \cdot c$

3.8 Импликативная решетка

Определение. Импликативная решетка — решетка, где для любых a, b есть $a \rightarrow b$

3.9 Алгебра Гейтинга

Определение. Псевдобулева алгебра (алгебра Гейтинга) — импликативная решетка с 0

3.10 Булева алгебра

Определение. Булева алгебра — псевдобулева алгебра, такая что $a + (a \rightarrow 0) = 1$


3.11 Гёделева алгебра

Определение. Гёделева алгебра — алгебра Гейтинга, такая что из $\alpha + \beta = 1$ следует что $\alpha = 1$ или $\beta = 1$

3.12 Операция $\Gamma(A)$

Определение. Пусть \mathfrak{A} — алгебра Гейтинга, тогда:

1. $\Gamma(\mathfrak{A})$



Добавим новый элемент $1_{\Gamma(\mathfrak{A})}$ переименуем $1_{\mathfrak{A}}$ в ω

3.13 Алгебра Линденбаума

3.14 Свойство дизъюнктивности ИИВ

Определение. Дизъюнктивность ИИВ: $\vdash \alpha \vee \beta$ влечет $\vdash \alpha$ или $\vdash \beta$

3.15 Свойство нетабличности ИИВ

3.16 Модель Крипке, Вынужденность

1. $W = \{W_i\}$ — множество миров
2. частичный порядок (\succeq)
3. отношение вынужденности: $W_j \Vdash p_i$
 $(\Vdash) \subseteq W \times \mathbb{P}$
При этом, если $W_j \Vdash p_i$ и $W_j \preceq W_k$, то $W_k \Vdash p$

4 Исчисление предикатов

4.1 Предикатные и функциональные символы

4.1.1 Исчисление предикатов

Определение. Язык исчисления предикатов

- логические выражения “предикаты”/“формулы”
- предметные выражения “термы”

Θ — метапеременные для термов

Термы:

- Атомы:
 - a, b, c, d, \dots — предметные переменные
 - x, y, z — метапеременные для предметных переменных
- Функциональные Символы
 - f, g, h — Функциональные символы (метапеременные)
 - $f(\Theta_1, \dots, \Theta_n)$ — применение функциональных символов
- Логические выражения:
Если $n = 0$, будем писать f, g — без скобок
 - P — метапеременные для предикатных символов
 - A, B, C — предикатный символ
 - $P(\Theta_1, \dots, \Theta_n)$ — применение предикатных символов
 - $\&, \vee, \neg, \rightarrow$ — Связки
 - $\forall x.\varphi$ и $\exists x.\varphi$ — кванторы
“<квантор> <переменная>.<выражение>”

1. Сокращение записи И.В + жадность \forall, \exists

Метавыражение:

$$\forall x.(P(x) \& (\forall y.P(y)))$$

Квантор съедает все что дают, т.е. имеет минимальный приоритет.

Правильный вариант (настоящее выражение):

$$\forall a.B(A) \& \forall b.B(b)$$

4.2 Константы и пропозициональные переменные

4.3 Свободные и связанные вхождения предметных переменных в формулу

4.3.1 Вхождение

Пример.

$$(P(x_1) \vee Q(x_2)) \rightarrow (R(x_3) \& (\underbrace{\forall x_4. P_1(x_5)}_{\text{область } \forall \text{ по } x}))$$

1, 2, 3 — свободные, 5 — связанное, по переменной 4

Пример.

$$\underbrace{\forall x. \forall y. \forall x. \forall y. \forall x. P(x)}_{\text{область } \forall \text{ по } x}$$

Здесь x в $P(x)$ связано. x не входит свободно в эту формулу, потому что нет свободных вхождений

Определение. Переменная x входит свободно если существует свободное вхождение

Определение. Вхождение свободно, если не связано

Можно относиться к свободно входящим переменным как к переменным из библиотеки, т.е. мы не имеем права их переименовывать

Пример. Некорректная формула

$$\alpha_1 \quad x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\alpha_2 \quad (\exists x. x = 0) \rightarrow (x = 0) \text{ — не доказано}$$

$$\alpha'_2 \quad (\exists t. x = 0) \rightarrow (x = 0) \text{ — (правило } \exists)$$

Пример.

$$(n) \quad x = 0 \rightarrow y = 0 \text{ — откуда то}$$

$$(n+1) \quad (\exists x. x = 0) \rightarrow (y = 0) \text{ — (правило } \exists)$$

4.3.2 Свободные подстановки

Определение. Θ свободен для подстановки вместо x в φ , если никакая свободная переменная в Θ не станет связанной в $\varphi[x := \Theta]$

Определение. $\varphi[x := \Theta]$ — "Заменить все свободные вхождения x в φ на Θ "

Пример.

$$(\forall x. \forall y. \forall x. P(x))[x := y] \equiv \forall x. \forall y. \forall x. P(x)$$

Пример.

$$P(x) \vee \forall x. P(x) [x := y] \equiv P(y) \vee \forall x. P(y)$$

Пример.

$$(\forall y. x = y) [x := \underbrace{y}_{\equiv \Theta}] \equiv \forall y. \underset{1}{y} = y$$

$FV(\Theta) = \{y\}$ — свободные переменные в Θ . Вхождение y с номером 1 стало связанным

Пример.

$$P(x) \& \forall y. x = y [x := y + z] \equiv P(y + z) \& \forall y. \underset{1}{y} + z = y$$

Здесь при подстановке вхождение y с номером 1 стало связанным. x — библиотечная функция, переименовали x во что-то другое.

4.4 Свобода для подстановки, Правила вывода для кванторов, аксиомы исчисления предикатов для кванторов, оценки и модели в исчислении предикатов

4.4.1 Теория доказательств

Все аксиомы И.В + М.Р.

(схема 11) $(\forall x.\varphi) \rightarrow \varphi[x := \Theta]$

(схема 12) $\varphi[x := \Theta] \rightarrow \exists x.\varphi$

Если Θ свободен для подстановки вместо x в φ .

Определение. Свободен для подстановки — никакое свободное вхождение x в Θ не станет связанным

Пример.

```
1 int y;  
2 int f(int x) {  
3     x = y;  
4 }
```

Заменим $y := x$. Код сломается, т.к. у нас нет свобод для подстановки

(Правило \forall)

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \forall x.\psi}$$

(Правило \exists)

$$\frac{\psi \rightarrow \varphi}{\exists x.\psi \rightarrow \varphi}$$

В обоих правилах x не входит свободно в φ

Пример.

$$\frac{x = 5 \rightarrow x^2 = 25}{x = 5 \rightarrow \forall x.x^2 = 25}$$

Между x и x^2 была связь, мы ее разрушили. Нарушено ограничение

Пример.

$$\begin{aligned} & \exists y.x = y \\ & \forall x.\exists y.x = y \rightarrow \exists y.y + 1 = y \end{aligned}$$

Делаем замену $x := y+1$. Нарушено требование свобод для подстановки. y входит в область действия квантора \exists и поэтому свободная переменная x стала связанная.

4.5 Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема 4.1. Пусть задана Γ, α, β

1. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$, то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, при условии, если b в доказательстве $\Gamma, \alpha \rightarrow \beta$ не применялись правила для \forall, \exists по переменным, входящим свободно в α
2. Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$

4.6 Теорема о корректности для исчисления предикатов

4.7 Полное множество (бескванторных) формул

Определение. Γ — **непротиворечивое** множество формул, если $\Gamma \not\vdash \alpha \& \neg\alpha$ ни при каком α

Определение. Полное непротиворечивое замкнутых бескванторных формул — такое, что для каждой замкнутой бескванторной формулы α : либо $\alpha \in \Gamma$, либо $\neg\alpha \in \Gamma$

4.8 Модель для формулы

4.8.1 Теория моделей

Оценка формулы в исчислении предикатов:

1. Фиксируем D — предметное множество
2. Каждому $f_i(x_1, \dots, x_n)$ сопоставим функцию $D^n \rightarrow D$
3. Каждому $P_j(x_1, \dots, x_m)$ сопоставим функцию(предикат) $D^m \rightarrow V$
4. Каждой x_i сопоставим элемент из D

Пример.

$$\forall x. \forall y. E(x, y)$$

Чтобы определить формулу сначала определим $D = \mathbb{N}$

$$E(x, y) = \begin{cases} \text{И} & , x = y \\ \text{Л} & , x \neq y \end{cases}$$

- $\llbracket x \rrbracket = f_{x_i}$
- $\llbracket \alpha \star \beta \rrbracket$ — смотри ИИВ
- $\llbracket P_i(\Theta_1, \dots, \Theta_n) \rrbracket = f_{P_i}(\llbracket \Theta_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \Theta_n \rrbracket)$
- $\llbracket f_j(\Theta_1, \dots, \Theta_n) \rrbracket = f_{f_j}(\llbracket \Theta_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \Theta_n \rrbracket)$

$$\llbracket \forall x. \varphi \rrbracket = \begin{cases} \text{И} & , \text{если } \llbracket \varphi \rrbracket^{f_x=k} = \text{И при всех } k \in D \\ \text{Л} & , \text{иначе} \end{cases}$$

$$\llbracket \exists x. \varphi \rrbracket = \begin{cases} \text{И} & , \text{если } \llbracket \varphi \rrbracket^{f_x=k} = \text{И при некотором } k \in D \\ \text{Л} & , \text{иначе} \end{cases}$$

$$\llbracket \forall x. \forall y. E(x, y) \rrbracket = \text{Л}$$

т.к. $\llbracket E(x, y) \rrbracket^{x:=1, y:=2} = \text{Л}$

Пример.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \left(|a_n - a| < \varepsilon \right)$$

Синим отмечены функциональные конструкции(термы), зеленым предикатные

$$\forall \varepsilon. (\varepsilon > 0) \rightarrow \exists N. \forall n. (n > N) \rightarrow (|a_n - a| < \varepsilon)$$

Обозначим:

- $(>)(a, b) = G(a, b)$ — предикат
- $|\bullet|(a) = m_1(a)$
- $(-)(a, b) = m_-(a, b)$
- $0() = m_0$
- $a_\bullet(n) = m_a(n)$

$$\forall e. \left(G(e, m_0) \right) \rightarrow \exists n_0. \forall n. \left(G(n, n_0) \rightarrow G\left(e, m_1\left(m_-\left(m_a(n), a\right)\right)\right) \right)$$

4.9 Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов

Теорема 4.2 (Гёделя о полноте). Если Γ — полное неротиворечивое множество замкнутых(не бескванторных) формул, то оно имеет модель

4.10 Следствие из теоремы Гёделя о полноте исчисления предикатов

Следствие 4.2.1. Пусть $\models \alpha$, тогда $\vdash \alpha$

4.11 Неразрешимость

4.12 Исчисления предикатов (формулировка, что такое неразрешимость).

5 Арифметика и теории первого порядка

5.1 Теория первого порядка

5.2 Модели и структуры теорий первого порядка

5.3 Аксиоматика Пеано

5.4 Определение операций (сложение, умножение, возведение в степень)

5.5 Формальная арифметика (язык, схема аксиом индукции и общая характеристика остальных аксиом).