채수학 교재 적중 리포트

2026 동부고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분·여러 가지 미분법)

22	19	3	16	86%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. Ⅰ 수열의극한, 미적분 II. II 미분법

1번 수열의 극한 > 급수의 성질 3.1점

학교 시험

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 5$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}(-3a_n + 2b_n)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.22 · STEP 1 · 04번

04 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 5$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (3a_n - b_n)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 7 ⑤ 11

💬 $\sum a_n$ =2, $\sum b_n$ =5일 때 일차결합의 급수 - 같은 조건, 계수만 다름

2번 수열의 극한 > ∞−∞ 꼴의 극한 3.2점

학교 시험

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n-1}-n\right)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.5 · STEP 1 · 05번

05 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+6n}-n)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim(√(n²+an)−n) - 분자 유리화, 숫자만 다름

5번 미분법 > 음함수의 미분법 3.4점

학교 시험

곡선 $2x^3 - xy + 3y^2 = 16$에서 $y = 0$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.31 · STEP 3 · 24번

24 서술형 곡선 $x^2 - 2xy + 2y^2 = 5$ 위의 점 $(1, a)$ $(a > 0)$에서 $\frac{dy}{dx}$의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 음함수 곡선에서 점의 좌표를 먼저 구한 뒤 dy/dx 계산

6번 미분법 > 지수함수와 로그함수의 극한 3.4점

학교 시험

두 실수 α, β에 대하여 $\lim_{x\to 0} \frac{\log_2(1+x)}{e^{3x}-1} = \alpha$, $\lim_{x\to 0} \frac{2^x - 1}{\ln(1+x)} = \beta$일 때, $\alpha\beta$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\lim_{x\to 0} \frac{e^{ax} - 1}{\ln(1 + 3x)} = 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 지수·로그가 섞인 0/0 극한 - $(e^{ax}-1)/x$, $\ln(1+x)/x$ 꼴로 바꾸기

7번 미분법 > 미분계수의 정의 - sec·tan·cot의 도함수 3.4점

학교 시험

함수 $f(x) = \sec x + \tan x - \cot x$에 대하여 $\lim_{h\to 0} \frac{f\left(\frac{\pi}{4} + 2h\right) - f\left(\frac{\pi}{4} - h\right)}{h}$의 값은?

① $12 + 3\sqrt{2}$ ② $12 + 6\sqrt{2}$ ③ $12 + 9\sqrt{2}$
④ $16 + 3\sqrt{2}$ ⑤ $16 + 6\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 함수 $f(x) = x \ln x$ 에 대하여 $\lim_{h\to 0} \frac{f(e+h) - f(e-2h)}{h}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 lim (f(a+ph)−f(a−qh))/h = (p+q)f′(a) - 미분계수의 정의

8번 수열의 극한 > 수열의 극한의 대소 관계 3.5점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $\frac{2n^3}{n+3} < a_n < \frac{2n^3 + 3n}{n+3}$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{2a_n + n^2}{(2n+1)^2}$의 값은?

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 14번

14 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $4n^2 + n < a_n < 4n^2 + 3n$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{2n^2 + 5}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

💬 부등식으로 a_n 을 끼워 lim a_n /(이차식) 구하기

9번 미분법 > 무리수 e의 정의 3.5점

학교 시험

다음 <보기>의 등식 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 0}(1-7x)^{\frac{1}{x}} = e^{-7}$

ㄴ. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{4x}\right)^{\frac{4x}{3}} = e^{\frac{3}{4}}$

ㄷ. $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{-\frac{x}{2}} = e^{2}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값은?

① 1 ② e ③ $2e$

④ e^2 ⑤ $\frac{1}{e^2}$

(1+kx)^{1/x} 꼴을 e의 정의로 바꿔 극한 구하기

10번 미분법 > 탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각 3.5점

학교 시험

두 직선 $(5\sqrt{3}-8)x-y=0$과 $-4x+2y-12=0$이 이루는 둔각의 크기는?

① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{4}{5}\pi$ ④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{6}{7}\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.11 · STEP 1 · 04번

04 심화 두 직선 $y=3x$, $y=\frac{1}{2}x$ 가 이루는 예각의 크기는?

① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$

④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{12}$

두 직선의 기울기로 이루는 각 - 탄젠트 덧셈정리

11번 수열의 극한 > 등비급수의 수렴 조건 3.6점

학교 시험

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n \ (r\neq 0)$이 수렴할 때, 다음 <보기>에서 항상 수렴하는 급수만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty}(-r)^n$

ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{r^{2n}}$

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r-2}{3}\right)^n$

ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty}(1-2r^n)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{r^n\}$ 이 수렴하면 $\{(-r)^n\}$ 도 수렴한다.

ㄴ. $\{r^n\}$ 이 수렴하면 $\{r^n(1-r)\}$ 은 0 에 수렴한다.

ㄷ. $\{r^{2n}\}$ 이 수렴하면 $\{r^{2n+1}\}$ 도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ


④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

r^n 이 수렴할 때 다른 수열·급수의 수렴 여부 <보기> 판정

12번 수열의 극한 > 등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복) 3.6점

학교 시험

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 사분원 OAB에 내접하는 정사각형 $\mathrm{OA_1C_1B_1}$을 그리고, 사분원 $\mathrm{OA_1B_1}$에 내접하는 정사각형 $\mathrm{OA_2C_2B_2}$를 그린다. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, n번째 그린 정사각형 $\mathrm{OA_nC_nB_n}$과 사분원 $\mathrm{OA_nB_n}$의 넓이를 각각 a_n과 b_n이라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - b_n)$의 합은?




① $8-\pi$ ② $8-2\pi$ ③ $16-2\pi$ ④ $16-4\pi$
⑤ $24-3\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.43 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 그림과 같이 반지름이 4 인 원에 내접하는 정사각형을 그리고, 그 정사각형에 내접하는 원, 그 원에 내접하는 정사각형, … 을 한없이 그릴 때, 모든 정사각형의 넓이의 합을 구하시오.



답 :

💬 원(호)과 정사각형을 번갈아 내접 - 넓이비 1/2인 등비급수

13번 수열의 극한 > 등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기 3.8점

학교 시험

등식 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\left(\dfrac{\sqrt{2}m}{5}\right)^{n+2}+2}{\left(\dfrac{\sqrt{2}m}{5}\right)^{n}+1}=2$가 성립하도록 하는 모든 정수 m의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.12 · STEP 2 · 12번

12 양수 r 에 대하여 $f(r)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{r^{n+1}+5}{r^n+1}$ 이라 할 때, $f(\frac{1}{2})+f(1)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $(r^{n+1}+a)/(r^n+1)$ 꼴 - $|r|<1$, $r=1$, $|r|>1$로 경우 나누기

14번 미분법 > 역함수의 미분법 3.8점

학교 시험

실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to5}\dfrac{f(2x)+2}{x-5}=\dfrac{1}{2}$이 성립한다. 함수 $f(10x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g'(-2)$의 값은?

① $\dfrac{1}{5}$ ② $\dfrac{3}{10}$ ③ $\dfrac{2}{5}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{3}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.30 · STEP 2 · 15번

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 미분가능하고 $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 이다. $h(x)=g(x^2-2)$ 일 때, $h'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(a), f′(a)로 합성·역함수의 미분계수 구하기

15번 수열의 극한 > 수열의 극한의 성질 참거짓 3.9점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$에 대하여 다음 <보기>에서 항상 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이 모두 수렴하여 그 극한값이 같고, 수열 $\{c_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n \le c_n \le b_n$이면 수열 $\{c_n\}$은 수렴한다.

ㄴ. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n < b_n$이고, 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n < \lim_{n\to\infty} b_n$이다.

ㄷ. 수열 $\{a_n + b_n\}$이 수렴하면 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$은 각각 수렴한다.

ㄹ. $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$이고 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$이면 $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$ 또는 $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 1$이다.

ㅁ. $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$이고 $\lim_{n\to\infty} (2a_n - 3b_n) = 0$이면 $\lim_{n\to\infty} b_n = \frac{2}{3}\alpha$이다. (단, α는 실수이다.)

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.20 · 평가 중단원평가 · 16번

16 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 수열)

ㄱ. $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모두 발산하면 $\{a_n + b_n\}$ 도 발산한다.

ㄴ. $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ 이면 $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |\alpha|$ 이다.

ㄷ. $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$ 이면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 또는 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 두 수열의 극한 성질 <보기> 참·거짓 - 반례로 판별

16번 미분법 > 역함수의 미분법과 합성함수 4.1점

학교 시험

집합 $\{x \mid x \ge \ln 9\}$에서 정의된 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 $x > \ln 9$인 모든 실수 x에서 미분가능하고, 역함수를 갖는다.

(나) $x \ge 2$인 모든 실수 x에 대하여 $f(\ln(3^x)) = x^3 - 2x^2 - x - 3$이 성립한다.

함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g(3) + g'(3)$의 값은?

① $\frac{5}{2}\ln 3$ ② $\frac{37}{14}\ln 3$ ③ $\frac{39}{14}\ln 3$ ④ $\frac{41}{14}\ln 3$ ⑤ $\frac{43}{14}\ln 3$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.25 · STEP 3 · 23번

23 서술형 함수 $f(x) = x^3 + x + 1$ 과 미분가능한 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $g(f(x)) = \ln(x^2 + 1)$ 을 만족시킬 때, $g'(3)$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.


답 :

💬 합성함수 항등식을 미분해 바깥 함수의 미분계수 구하기

17번 미분법 > 삼각함수의 극한 - 도형의 넓이 4.3점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\angle B=\frac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC와 선분 AB 위의 점 D에 대하여 $\overline{AC}:\overline{BC}=\overline{AD}:\overline{BD}$를 만족하고, 중심이 A이고 반지름의 길이가 $\overline{AD}$인 원과 선분 AC의 교점을 E라 하자. 또한 $\angle A=\theta$일 때, 부채꼴 ADE의 넓이를 $S(\theta)$, 삼각형 BCE의 넓이를 $T(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta\to 0+}\frac{\{S(\theta)\}^2}{T(\theta)}$의 값은?




① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.21 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=1$, $\angle BAC=\theta$ 인 이등변삼각형 ABC 에 내접하는 원의 중심을 I 라 하자. 삼각형 IBC 의 넓이를 $S(\theta)$ 라 할 때, $\lim_{\theta\to 0+}\frac{S(\theta)}{\theta^2}$의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, $0<\theta<\pi$)




답 :

💬 θ→0+일 때 도형 넓이의 극한 - 길이를 삼각함수로 나타내 근사

18번 수열의 극한 > 등비급수의 활용 (그림 Rn의 넓이) 4.4점

학교 시험

다음 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 3이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 OA_1B_1이 있다. 호 A_1B_1 위에 점 P_1, 선분 OA_1 위에 점 C_1, 선분 OB_1 위에 점 D_1을 사각형 $OC_1P_1D_1$이 $\overline{OC_1} : \overline{OD_1} = 4 : 3$인 직사각형이 되도록 잡는다. 부채꼴 OA_1B_1의 내부에 점 Q_1을 $\overline{P_1Q_1} = \overline{B_1Q_1}$, $\angle P_1Q_1B_1 = \frac{\pi}{2}$가 되도록 잡고, 이등변삼각형 $P_1Q_1B_1$에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 OA_1 위의 점 A_2와 선분 OB_1 위의 점 B_2를 $\overline{OQ_1} = \overline{OA_2} = \overline{OB_2}$가 되도록 잡고, 중심이 O, 반지름의 길이가 $\overline{OQ_1}$, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 OA_2B_2를 그린다. 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 네 점 P_2, C_2, D_2, Q_2를 잡고, 이등변삼각형 $P_2Q_2B_2$에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값은?




① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{11}{4}$ ④ 3 ⑤ $\frac{13}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.46 · 평가 대단원평가 · 19번

19 그림과 같이 한 변의 길이가 4 인 정사각형에 내접하는 원을 그리고, 정사각형의 내부이면서 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 의 원에 내접하는 정사각형을 그리고, 이 정사각형에 내접하는 원을 그린 뒤 새로 그린 정사각형의 내부이면서 새로 그린 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$ 의 값은?



① 16 − 4π ② 24 − 6π ③ 28 − 7π
④ 32 − 8π ⑤ 36 − 9π

💬 그림 R_n 에 색칠된 넓이의 극한 - 닮음비로 등비급수

19번 수열의 극한 > 수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} n^3a_n = 4$일 때, $\lim_{n\to\infty}(-4n^3 + n^2 + 8)a_n$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.44 · 평가 대단원평가 · 04번

04 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n\to\infty} n^2a_n = 2$ 일 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{(3n^3 + n)a_n}{n + 1}$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

💬 lim $n^k a^n$ 값이 주어질 때 lim(다항식)a^n 구하기

20번 미분법 > 미분계수의 정의 - 곱의 미분과 로그함수 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 구간 $(1, \infty)$에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x) = f(x)\log_3 x$라 하자.

$\lim_{h\to 0} \dfrac{f(9-2h) - g(9-h) + f(9)}{h} = \dfrac{2}{\ln 3}$일 때, $f(9)$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 함수 $f(x) = x \ln x$ 에 대하여 $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(e+h) - f(e-2h)}{h}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

💬 미분계수의 정의로 극한을 f′, g′로 바꾸고 로그함수 미분

21번 수열의 극한 > 급수의 수렴 조건과 부분분수 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 3] 양수 a에 대하여 급수

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{a-8n}{n} + \dfrac{4an+14}{n+2} \right)$가 실수 S에 수렴할 때, $S - a$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.24 · STEP 2 · 14번

14 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \dfrac{4n+1}{2n-1})$ 이 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2(a_n)^2 + 1}{a_n + 1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 급수가 수렴 → 일반항 → 0을 이용해 미지수 결정