2026 경북고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 확률의 덧셈정리 (배반사건) · 배반이면 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A\cup B)=1$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

1. $A\cap B=\varnothing$이므로 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$
2. $1=\mathrm{P}(A)+\dfrac{1}{3}$
3. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{2}{3}\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 같은 것이 있는 순열 · $\dfrac{6!}{3!\,2!}$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ③

6개의 문자 a, a, a, b, b, c를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 50 ② 55 ③ 60 ④ 65 ⑤ 70

1. a 3개, b 2개, c 1개
2. $\dfrac{6!}{3!\,2!\,1!}=\dfrac{720}{12}=60\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 중복순열 (자연수 만들기) · 백의 자리는 1 또는 2 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ⑤

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 세 개를 택해 세 자리의 자연수를 만들 때, 300보다 작은 세 자리의 자연수의 개수는?


① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

1. 300보다 작으려면 백의 자리가 1 또는 2 $\longrightarrow$ 2가지
2. 십의 자리, 일의 자리는 각각 5가지 $\longrightarrow$ ${}_5\Pi_2=25$
3. $2\times 25=50\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 최단거리 경로 (지나지 않는 경우) · (전체) − (P를 지나는 경우) · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 B지점으로 갈 때, P지점을 지나지 않고 최단거리로 가는 경우의 수는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. A에서 B까지: 오른쪽 4번, 위쪽 2번 $\longrightarrow \dfrac{6!}{4!\,2!} = 15$
2. A $\longrightarrow$ P: 오른쪽 3, 위 1 $\longrightarrow$ 4가지, P $\longrightarrow$ B: 오른쪽 1, 위 1 $\longrightarrow$ 2가지
3. P를 지나는 경우 $4 \times 2 = 8$
4. $15 - 8 = 7 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 독립시행의 확률 · $({}_7C_5 + {}_7C_6 + {}_7C_7)\left(\dfrac{1}{2}\right)^7$ · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

한 개의 동전을 7번 던져서 앞면이 5번 이상 나올 확률은?

① $\dfrac{27}{128}$ ② $\dfrac{55}{256}$ ③ $\dfrac{7}{32}$ ④ $\dfrac{57}{256}$ ⑤ $\dfrac{29}{128}$

1. 앞면이 5, 6, 7번 나오는 경우를 더한다
2. ${}_7C_5 + {}_7C_6 + {}_7C_7 = 21 + 7 + 1 = 29$
3. 확률 $= \dfrac{29}{128} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 이항정리 (하키스틱 공식) · ${}_3C_3+{}_4C_3+\cdots+{}_{10}C_3={}_{11}C_4$ · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

$(1+x^2)+(1+x^2)^2+(1+x^2)^3+\cdots+(1+x^2)^{10}$의 전개식에서 x^6의 계수는?

① 300 ② 310 ③ 320 ④ 330 ⑤ 340

1. $(1+x^2)^n$에서 $x^6=(x^2)^3$의 계수는 ${}_nC_3$ $(n\geq 3)$
2. 구하는 값 $={}_3C_3+{}_4C_3+\cdots+{}_{10}C_3$
3. 파스칼 삼각형의 성질로 $={}_{11}C_4=330 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 여사건의 확률 (적어도) · $1-\mathrm{P}$(모두 검은색) · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

흰색 마스크 6개, 검은색 마스크 8개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 확률은?

① $\frac{10}{13}$ ② $\frac{21}{26}$ ③ $\frac{11}{13}$ ④ $\frac{23}{26}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

1. 모두 검은색일 확률 $=\frac{{}_8C_3}{{}_{14}C_3}=\frac{56}{364}=\frac{2}{13}$
2. 적어도 한 개가 흰색일 확률 $=1-\frac{2}{13}=\frac{11}{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 1과 2의 합으로 나타내기 (순열) · 2를 몇 번 쓰는지로 분류 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ①**

빨간 주머니에 들어 있는 같은 종류의 공 5개를 파란 주머니로 모두 옮겨 담으려고 한다. 공을 한 번에 1개씩 또는 2개씩 꺼내어 옮긴다고 할 때, 옮겨 담는 경우의 수는?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. 2를 0번: 1+1+1+1+1 ⟶ 1가지
2. 2를 1번: 1 세 개와 2 한 개의 배열 ⟶ $\frac{4!}{3!}=4$가지
3. 2를 2번: 1 한 개와 2 두 개의 배열 ⟶ $\frac{3!}{2!}=3$가지
4. $1+4+3=8 \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 조건부확률 (표 해석) · $\mathrm{P}(\text{남} \mid A \cap B) = \dfrac{n(\text{남} \cap A \cap B)}{n(A \cap B)}$ · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

남학생 15명과 여학생 21명으로 구성된 어느 학급에서 두 종류의 방과 후 활동 A, B의 참여 여부를 조사하였다. 활동 A에 참여하는 23명의 학생 중에서 남학생은 11명이고, 활동 B에 참여하는 19명의 학생 중에서 남학생은 9명이었다. 36명의 학생 모두 두 활동 A, B 중에서 적어도 하나의 활동에 참여했다.

이 학급에서 임의로 택한 한 학생이 두 활동 A, B에 모두 참여하는 학생일 때, 그 학생이 남학생일 확률은 $\dfrac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. 모두 적어도 하나 참여 $\longrightarrow n(A \cap B) = 23 + 19 - 36 = 6$
2. 남학생 15명도 모두 참여 $\longrightarrow$ 남학생 중 둘 다 참여 $= 11 + 9 - 15 = 5$
3. 구하는 확률 $= \dfrac{5}{6}$
4. $p + q = 6 + 5 = 11 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 중복조합과 확률 (최솟값 조건) · $a = m$이 최솟값 $\rightarrow b, c, d \geq m$으로 치환 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ②**

방정식 $a+b+c+d=10$을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 중에서 임의로 한 개를 택할 때, $a \leq b$, $a \leq c$, $a \leq d$일 확률은 $\dfrac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 181 ② 193 ③ 205 ④ 217 ⑤ 229

1. 전체: ${}_4\mathrm{H}_{10} = {}_{13}\mathrm{C}_3 = 286$
2. $a = m$일 때 $b = m + b'$ 등으로 놓으면 $b' + c' + d' = 10 - 4m$
3. $m = 0$: ${}_3\mathrm{H}_{10} = 66$, $m = 1$: ${}_3\mathrm{H}_6 = 28$, $m = 2$: ${}_3\mathrm{H}_2 = 6$
4. 합 $100 \longrightarrow$ 확률 $\dfrac{100}{286} = \dfrac{50}{143}$
5. $p + q = 143 + 50 = 193 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 순서가 정해진 순열 · A, B, C, D 중 A와 D가 양 끝 → $\frac{4}{4!}$ · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

4개의 문자 A, B, C, D를 포함한 서로 다른 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 두 문자 A와 D 사이에 두 문자 B와 C를 포함하여 2개 이상의 문자가 있도록 나열하는 경우의 수는?

① 120 ② 180 ③ 240 ④ 300 ⑤ 360

1. B와 C가 모두 A와 D 사이에 있으면 사이에 2개 이상의 문자가 있다

2. A, B, C, D 네 문자의 순서만 보면 A, D가 양 끝인 경우: $2 \times 2 = 4$가지 (전체 $4! = 24$가지)

3. 구하는 경우의 수 $= 6! \times \frac{4}{24} = 120 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 중복조합 (부등식 조건 치환) · 차를 새 변수로 치환 후 여유 변수 추가 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4)의 개수는?

(가) $n = 1, 2, 3$일 때, $x_{n+1} - x_n \geq n$이다.
(나) $x_4 \leq 13$

① 330 ② 396 ③ 462 ④ 528 ⑤ 594

1. $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2 - x_1 - 1$, $y_3 = x_3 - x_2 - 2$, $y_4 = x_4 - x_3 - 3$ (모두 ≥ 0)

2. $x_4 = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + 6 \leq 13 \longrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \leq 7$

3. $y_5 \geq 0$을 추가: $y_1 + \cdots + y_5 = 7$

4. ${}_5\mathrm{H}_7 = {}_{11}\mathrm{C}_4 = 330 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 독립시행의 확률 (점의 이동) · x 이동 횟수 $a \to \mathrm{P}(a,\ 2(4-a))$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 주사위를 한 번 던져서 3의 약수의 눈이 나오면 점 P를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동하고, 3의 약수의 눈이 나오지 않으면 점 P를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동한다.
주사위를 4번 던질 때, 점 P가 직선 $x-y+2=0$ 위에 있을 확률은?

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{8}{27}$ ③ $\frac{10}{27}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{14}{27}$

1. 3의 약수(1, 3)가 나올 확률 $\frac{1}{3}$
2. 4번 중 a번 나오면 $\mathrm{P}(a,\ 8-2a)$
3. $a-(8-2a)+2=0 \longrightarrow a=2$
4. 확률 $= {}_4\mathrm{C}_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{24}{81} = \frac{8}{27} \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 중복조합 (홀짝 조건) · a, d 홀수, b, c는 짝·홀 하나씩 → 홀수/짝수를 새 변수로 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 조건을 만족시키는 11 이하의 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수는?

> (가) $a \le b \le c \le d$
> (나) $a \times d$는 홀수이고, $b+c$도 홀수이다.

① 120 ② 125 ③ 130 ④ 135 ⑤ 140

1. $a \times d$ 홀수 $\longrightarrow$ a, d 모두 홀수. $b+c$ 홀수 $\longrightarrow$ $b<c$이고 하나는 짝수
2. $a=2a'-1,\ d=2d'-1\ (1 \le a', d' \le 6)$
3. (i) $b=2p-1,\ c=2q$: $a' \le p \le q \le d'-1 \longrightarrow$ 1~5에서 4개 중복 선택: ${}_5\mathrm{H}_4 = 70$
4. (ii) $b=2p,\ c=2q-1$: $a' \le p \le q-1 \le d'-1 \longrightarrow$ 마찬가지로 70
5. $70+70=140 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 함수의 개수 (중복조합) · $(f(1), f(4))$를 정하고 나머지는 중복조합 · 4.20점 · 난이도 상

정답 ③

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

> (가) $f(1) \times f(4)$의 값이 4의 배수이다.
> (나) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

① 142 ② 157 ③ 166 ④ 175 ⑤ 181

1. $f(1) \le f(4)$이고 곱이 4의 배수인 쌍: $(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (2,2), (4,5), (2,6), (4,6), (6,6)$
2. $f(2), f(3)$: ${}_k\mathrm{H}_2$ $(k = f(4) - f(1) + 1)$, $f(5), f(6)$: ${}_{7-f(4)}\mathrm{H}_2$
3. $(1,4)$: $10 \times 6 = 60$, $(2,4)$: $6 \times 6 = 36$, $(3,4)$: 18, $(4,4)$: 6
4. $(2,2)$: $1 \times 15 = 15$, $(4,5)$: $3 \times 3 = 9$, $(2,6)$: 15, $(4,6)$: 6, $(6,6)$: 1
5. 합 $= 166 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 카드 배열 (조건 만족 경우의 수) · 검은 카드 위치 = 흰 카드 사이 10곳 중 2곳 선택 · 4.20점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 2장의 검은색 카드와 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 흰색 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 흰색 카드에 적힌 수가 작은 수부터 크기순으로 왼쪽에서 오른쪽으로 배열되도록 카드를 놓는다. 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 검은색 카드는 서로 구별하지 않는다.)

> (가) 검은색 카드 사이에는 흰색 카드가 3장 이상 놓여 있다.
> (나) 검은색 카드 사이에는 4의 배수가 적힌 흰색 카드가 1장 이상 놓여 있다.




① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

1. 흰 카드 사이·양 끝 10곳 중 검은 카드 자리 $i < j$ $(i, j = 0, \cdots, 9)$ 선택
2. 사이 흰 카드는 $i+1, \cdots, j \longrightarrow$ (가) $j - i \ge 3$: $7+6+5+4+3+2+1 = 28$가지
3. 이 중 4, 8을 모두 포함하지 않는 경우: $\{1,2,3\}$, $\{5,6,7\} \longrightarrow$ 2가지
4. $28 - 2 = 26 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 수학적 확률 (순서 조건) · 빼는 공 1개로 분류, 공은 서로 다른 것으로 본다 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ②**

주머니에 1, 1, 1, 2, 3의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d라 할 때, $a \le b \le c \le d$일 확률은?



① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{7}{20}$ ④ $\frac{9}{20}$ ⑤ $\frac{11}{20}$

1. 공을 모두 구별하면 전체: ${}_5\mathrm{P}_4 = 120$

2. 1 하나를 뺄 때(3가지): 1, 1, 2, 3 순서 $\longrightarrow$ 1끼리 바꾸는 2가지 $\longrightarrow 6$

3. 2를 뺄 때: 1, 1, 1, 3 $\longrightarrow 3! = 6$, 3을 뺄 때: 1, 1, 1, 2 $\longrightarrow 6$

4. 확률 $= \frac{18}{120} = \frac{3}{20} \Longrightarrow$ ②


답 ②

18 같은 것이 있는 순열 (이웃 조건) · 0, 2만 먼저 나열 후 1을 사이에 넣기 · 4.40점 · 난이도 최상

정답 ⑤

숫자 0, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 3장씩 9장이 있다. 이 9장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 그림과 같은 9개의 자리에 다음 조건을 만족시키도록 각각 한 장씩 놓는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

> $n\,(1 \le n \le 9)$번째 자리에 놓인 카드에 적혀 있는 수를 a_n이라 할 때, $|a_{k+1} - a_k| = 2$를 만족시키는 자연수 $k\,(1 \le k \le 8)$의 개수는 4이다.



① 84 ② 88 ③ 92 ④ 96 ⑤ 100

1. $|a_{k+1} - a_k| = 2 \Leftrightarrow$ 0과 2가 이웃
2. 0, 2 여섯 장의 나열에서 0$\longleftrightarrow$2 바뀌는 곳 수를 r이라 하면, 1이 들어가지 않은 바뀌는 곳이 4개여야 함
3. $r = 4$인 나열 4가지: 1 세 장을 바꾸지 않는 3곳(양 끝 포함)에 $\longrightarrow {}_3\mathrm{H}_3 = 10 \longrightarrow 40$
4. $r = 5$인 나열 2가지: 바뀌는 곳 하나(5가지)에 1을 1장 이상, 나머지는 양 끝에 $\longrightarrow 5 \times {}_3\mathrm{H}_2 = 30 \longrightarrow 60$
5. $40 + 60 = 100 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 이항계수의 성질 (짝수번째 합) · ${}_{2k}\mathrm{C}_0 + {}_{2k}\mathrm{C}_2 + \cdots + {}_{2k}\mathrm{C}_{2k} = 2^{2k-1}$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 677

[서술형 1] 자연수 n에 대하여

$$f(n) = \sum_{k=1}^{n} ({}_{2k}\mathrm{C}_2 + {}_{2k}\mathrm{C}_4 + {}_{2k}\mathrm{C}_6 + \cdots + {}_{2k}\mathrm{C}_{2k})$$

일 때, $f(5)$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

1. 짝수 번째 이항계수의 합: ${}_{2k}\mathrm{C}_0 + {}_{2k}\mathrm{C}_2 + \cdots + {}_{2k}\mathrm{C}_{2k} = 2^{2k-1}$
2. ${}_{2k}\mathrm{C}_0 = 1$을 빼면 괄호 안 $= 2^{2k-1} - 1$
3. $f(5) = (2 + 8 + 32 + 128 + 512) - 5$
4. $= 682 - 5 = 677$

답 677

20 중복조합 (공 나누기, 여사건) · (가), (나) 만족 전체 − C가 0개 받는 경우 · 7.00점 · 난이도 상

정답 500

[서술형 2] 세 명의 학생 A, B, C에게 흰 공 10개와 검은 공 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 같은 색의 공은 구별되지 않는다.)

> (가) 학생 A가 받는 흰 공의 개수는 3 이상이다.
> (나) 학생 B가 받는 검은 공의 개수는 2 이상이다.
> (다) 학생 C는 공을 1개 이상 받는다.

1. 흰 공: A에 3개 먼저 $\longrightarrow$ 남은 7개를 3명에게 ${}_3\mathrm{H}_7 = 36$
2. 검은 공: B에 2개 먼저 $\longrightarrow$ 남은 4개를 3명에게 ${}_3\mathrm{H}_4 = 15$
3. (가), (나) 만족: $36 \times 15 = 540$
4. C가 공을 받지 않는 경우: 흰 공 ${}_2\mathrm{H}_7 = 8$, 검은 공 ${}_2\mathrm{H}_4 = 5 \longrightarrow 40$
5. $540 - 40 = 500$

답 500

21 중복조합 (부등식) · $r+b+y \le 20$ → 여유 변수 추가 · 7.00점 · 난이도 중

정답 1140

[서술형 3] 빨간색, 파란색, 노란색 응원봉이 있다. 각 색의 응원봉을 적어도 하나씩 포함하여 20개 이하의 응원봉을 선택하는 방법의 수를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 각 색의 응원봉은 20개 이상씩 있고, 같은 색의 응원봉은 서로 구별이 되지 않는다.)

1. 빨강 r, 파랑 b, 노랑 y개 (≥ 1), $r+b+y \le 20$
2. $r = r' + 1$ 등으로 놓으면 $r' + b' + y' \le 17$
3. $t \ge 0$ 추가: $r' + b' + y' + t = 17$
4. ${}_4\mathrm{H}_{17} = {}_{20}\mathrm{C}_3 = 1140$

답 1140

22 확률의 덧셈정리 (중복순열) · $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$ · 7.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{69}{128}$

[서술형 4] 문자 a, b, c, d 중에서 중복을 허용하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 문자열 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 문자 a가 한 개만 포함되거나 문자 b가 두 개만 포함된 문자열이 선택될 확률을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

1. 전체: ${}_4\Pi_4 = 256$
2. a가 한 개만: $4 \times 3^3 = 108$
3. b가 두 개만: ${}_4\mathrm{C}_2 \times 3^2 = 54$
4. 둘 다: a 위치 4, b 위치 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$, 남은 자리 c 또는 d 2 $\longrightarrow$ 24
5. $\dfrac{108 + 54 - 24}{256} = \dfrac{138}{256} = \dfrac{69}{128}$

답 $\frac{69}{128}$

23 조건부확률 (나머지 분류) · 3으로 나눈 나머지로 분류 · 7.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{1}{3}$

[서술형 5] 1부터 13까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택한 세 개의 수 중 짝수가 정확히 1개일 때, 그 세 개의 수의 합이 3의 배수일 확률을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

1. 짝수 정확히 1개: $6 \times {}_7\mathrm{C}_2 = 126$가지
2. 홀수 7개의 나머지: 0 $\longrightarrow \{3, 9\}$, 1 $\longrightarrow \{1, 7, 13\}$, 2 $\longrightarrow \{5, 11\}$
3. 홀수 두 개의 합을 3으로 나눈 나머지가 0, 1, 2인 경우가 각각 7가지
4. 짝수 하나마다 합이 3의 배수가 되는 홀수 쌍이 7가지 $\longrightarrow 6 \times 7 = 42$
5. 확률 $= \dfrac{42}{126} = \dfrac{1}{3}$

답 $\frac{1}{3}$