

## Кодирование

Наша цель была научиться говорить о выводимости в РА языком арифметики. В прошлом листке мы поняли, что рекурсивные функции могут быть хорошим подспорьем в этом деле. Осталось эту возможность реализовать.

Пусть  $\Sigma$  не более чем счётная сигнатура, содержащая функциональные символы  $\{f_i^n\}$ , предикатные символы  $\{R_i^n\}$ , переменные  $v_0, v_1, \dots$ . Например, положим  $=$  как  $R_0^2$ ,  $0$  как  $f_0^0$ ,  $S$  есть  $f_0^1$  и так далее. Наша цель приписать гёделевы номера объектам языка, чтобы разным объектам соответствовали разные натуральные числа, а смысл слова мог бы определяться примитивно-рекурсивным образом. Обозначив гёделев номер объекта  $A$  как  $[A]$ , распределим номера, скажем, так:

$$[v_i] := \langle 1, i \rangle, [f_i^n] := \langle 2, \langle n, i \rangle \rangle, [R_i^n] := \langle 3, \langle n, i \rangle \rangle, [\neg] := \langle 4, 0 \rangle, [\rightarrow] := \langle 4, 1 \rangle, [\forall] := \langle 4, 3 \rangle.$$

**Задача ГЗ.1.** Объясняет почему квантору существования и остальным логическим связкам не нужны отдельные гёделевые номера.

Дальше можно этот язык расширить на более сложные конструкции, например:  $[(A \rightarrow B)] = \langle [\rightarrow], [A], [B] \rangle$ ,  $[\forall v_i A] = \langle [\forall], [v_i], [A] \rangle$ .

**Задача ГЗ.2.** Докажите, что  $\text{Tm}(x) = \langle x \text{ есть гёделев номер терма} \rangle$  является примитивно рекурсивной.

**Задача ГЗ.3.** Докажите, что  $\text{AtFm}(x) = \langle x \text{ есть гёделев номер атомарной формулы} \rangle$  является примитивно рекурсивной.

**Задача ГЗ.4.** Докажите, что  $\text{Fm}(x) = \langle x \text{ есть гёделев номер формулы} \rangle$  является примитивно рекурсивной.

**Определение.** Нумерал  $\underline{n}$  — это терм  $\underbrace{S(\dots S(0) \dots)}_n$

**Задача ГЗ.5.** Покажите, что  $nm(x) := [\underline{x}]$  и  $\text{Num}(x) = \langle x \text{ есть гёделев номер нумерала} \rangle$  примитивно рекурсивны.

**Задача ГЗ.6.** Докажите, что  $\text{Sub}(x, i, y) = \langle \text{результат подстановки в } x \text{ выражения } y \text{ вместо свободных вхождений переменной } v_i \rangle$  является примитивно рекурсивной. Другими словами, если  $x = [\varphi]$ , то выполняется  $\text{Sub}([\varphi], i, [t]) = [\varphi[v_i/t]]$ .

**Задача ГЗ.7.** Докажите, что  $\text{Free}(x, y) = \langle x \text{ есть гёделев номер переменной, имеющей свободное вхождение в выражение с номером } y \rangle$  является примитивно рекурсивной.

**Задача ГЗ.8.** Покажите, что следующие предикаты примитивно рекурсивны  $\langle x \text{ есть код подформулы формулы с кодом } y \rangle$ ,  $\langle t \text{ подстановочен в } \varphi \text{ вместо свободного вхождения переменной } v_i \rangle$ ,

**Определение.** Пусть  $\text{Ax}_i(x) = \langle x \text{ есть код применения } i\text{-ой аксиомы Cl} \rangle$ ,  $\text{Log}(x) = \bigvee \text{Ax}_i(x)$ ,  $\text{MP}(x, y, z) = (y = \langle [\rightarrow], x, z \rangle \& x, y, z \in \text{Fm})$  (выводимость по modus ponens),

$$\begin{aligned} \text{B1}(x, y) = & (x, y \in \text{Fm}) \& (\exists A, a, B, v \ (x = \langle A, [\rightarrow], \text{Sub}(B, a, v) \rangle \& \\ & \& (y = \langle A, [\rightarrow], [\forall] \ , v, B \rangle) \& (A, B \in \text{Fm}) \& v \in \text{Var} \& \text{Tm}(a)) \end{aligned}$$

(1)

$\text{Gen}(x, i, y) = (y = \langle [\forall], [v_i], x \rangle)$  (применение квантора всеобщности).

**Задача ГЗ.9.** Покажите, что  $\text{Ax}_i$ ,  $\text{Log}$ ,  $\text{MP}$ ,  $\text{Gen}$  являются примитивно рекурсивными.

**Задача ГЗ.10.** Докажите, что  $\text{Prf}(x, y) = \langle x \text{ есть вывод } y \text{ в языке предикатов} \rangle$  является примитивно рекурсивной.