FILTERMATE 5 POUR QGIS

Cinq questions métier.
Un seul panneau.

Vecteur, raster et nuage de points LiDAR, filtrés les uns par les autres dans QGIS, sans SQL ni script. Cinq scénarios enregistrés sur Estavar (Pyrénées-Orientales) : BD TOPO, cadastre, MNT 1 m, ortho IRC 25 cm, LiDAR HD.

1 **Les bâtiments le long des grands axes**
vecteur → vecteur

2 **Le dossier de relevé autour de l'église**
vecteur → raster + nuage de points

3 **Les parcelles en pente**
raster → vecteur

4 **Les parcelles végétalisées**
raster → vecteur

5 **Les routes à élaguer**
nuage de points → vecteur


EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

imagodata.github.io/filter_mate · dépôt officiel des extensions QGIS

Libre et gratuit · QGIS 3.22 à 4.2

Les bâtiments le long des grands axes

vecteur → vecteur



CE QU'ON FAIT

Source : les tronçons de route avec `"importance" = '4'`, 15 tronçons. Prédicat Intersect, tampon de 50 m. Cibles : bâtiments et parcelles.


CE QU'ON OBTIENT

39 bâtiments et 11 parcelles, filtrés sur place, exportables en GeoPackage.

EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

Le dossier de relevé autour de l'église

vecteur → raster + nuage de points



CE QU'ON FAIT

Source : l'église (sélection simple), tampon de 50 m. Cibles : le MNT à 1 m et la dalle LiDAR HD.


CE QU'ON OBTIENT

Un MNT découpé (VRT) et un nuage dérivé (COPC) qui gardent leur style ; Annuler rend la source.

EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

Les parcelles en pente

raster → vecteur



CE QU'ON FAIT

Source : le MNT, grandeur « pente (%) » calculée à la volée, seuil ≥ 20 %. Cible : parcelles, couverture minimale 50 %.


CE QU'ON OBTIENT

2 parcelles sur 42 ont plus de la moitié de leur surface en pente.

EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

Les parcelles végétalisées

raster → vecteur



CE QU'ON FAIT

Source : l'ortho IRC, rôles de bandes PIR-R-V, préréglage NDVI végétation (> 0,3). Cible : parcelles, couverture minimale 50 %.


CE QU'ON OBTIENT

7 parcelles majoritairement végétalisées ; la sélection est lue à pleine résolution, par tuiles.

EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

Les routes à élaguer

nuage de points → vecteur



CE QU'ON FAIT

Source : le LiDAR HD, classe 5 (végétation haute). Cible : tronçons de route, tampon de 3 m autour de l'emprise des points.

CE QU'ON OBTIENT

100 tronçons sur 131 touchent de la végétation haute à moins de 3 m.

EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

FILTERMATE 5 POUR QGIS

Et depuis cette semaine

Trois nouveautés fusionnées sur la branche principale, en route vers la 5.0.1.

Pipette « objet cliqué »

la tache sous le clic (piscine, toit, parcelle), pas tous les pixels semblables du raster

Entités similaires

un clic sur une entité sélectionne toutes celles qui ont la même valeur

Serveur MCP

le filtrage piloté depuis un assistant IA, un outil par point d'entrée REST

EXPLORING choisit. FILTERING relie. EXPORTING écrit.

imagodata.github.io/filter_mate · dépôt officiel des extensions QGIS

Libre et gratuit · QGIS 3.22 à 4.2