

اختلاف قوت و قضایای کیسی

ایمان قادر و مهران طلایی

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

چکیده

قضیه کیسی از قضایای کلاسیک و پر استفاده در هندسه است که با توجه به کمبود متریال آموزشی در حیطه این مبحث ولی کاربرد زیاد آن، به گردآوری این مقاله روی آوردیم که شامل تعاریف و قضایای مورد نیاز و همینطوری از هر بخش مثال هایی مطرح شده اند که به یادگیری هرچه بیشتر کمک میکنند. و در انتها تمرین هایی برای دست ورزی و خودآزمایی قرار داده شده است. ابتدا با یک تعریف شروع میکنیم:

تعریف ۱.۰.

تابع اختلاف قوت نقطه P نسبت به دو دایره ω_1 و ω_2 را به شکل زیر تعریف میکنیم:

$$P(P, \omega_1, \omega_2) = Pow_{\omega_1}^P - Pow_{\omega_2}^P$$


۱ صورت قضیه کیسی (اختلاف قوت)

قضیه ۱.۱.

فرض کنید که دوایر ω_1 و ω_2 به مراکز O_1 و O_2 در صفحه هستند و خط l محور اصلی این دو دایره است و نقطه P نقطه ای در صفحه ω_1 و ω_2 است. آنوقت رابطه زیر برقرار است:

$$P(P, \omega_1, \omega_2) = 2dist(P, l)\overline{O_1O_2}$$

اثبات. دوایر $\omega_1(O_1, r_1)$ و $\omega_2(O_2, r_2)$ را در نظر بگیرید. A و D به ترتیب پایهای عمود از P بر محور اصلی و خط المکزین این دو دایره هستند.




حال داریم:

$$\begin{aligned}
Pow_{\omega_1}^P - Pow_{\omega_2}^P &= PO_1^2 - r_1^2 - PO_2^2 + r_2^2 \\
&= DO_1^2 - DO_2^2 + r_2^2 - r_1^2 \\
&= (DO_1 - DO_2)\overline{O_1O_2} + KO_1^2 - KO_2^2 \\
&= (DO_1 - DO_2)\overline{O_1O_2} + (KO_1 - KO_2)\overline{O_1O_2} \\
&= (DO_1 - DO_2 + KO_1 - KO_2)\overline{O_1O_2} \\
&= 2\overline{PA}\overline{O_1O_2}
\end{aligned}$$

□

مثال ۲.۱.

دایره ω' دایره ای به مرکز O' به طور کامل درون دایره ω و مرکز O قرار دارد. نقاط A و B به گونه ای بر روی دایره ω قرار دارند که \overline{AB} بر ω' مماس است. دایره Ω را دایره محیطی $\triangle O'AB$ در نظر بگیرید. خط \overline{AB} را با حفظ جهت حرکت می‌دهیم مکان هندسی مرکز Ω را بیابید.

اثبات. مرکز Ω را O'' مینامیم.حال $P(O', \omega, \Omega)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
P(O', \omega, \Omega) &= Pow_{\omega}^{O'} - Pow_{\Omega}^{O'} = 2R_{\omega'}\overline{OO''} \\
&\leftrightarrow \frac{Pow_{\omega}^{O'} - 0}{2R_{\omega'}} = \overline{OO''}
\end{aligned}$$


بنابر این طول OO'' ثابت است و این نتیجه می‌دهد که مکان هندسی O'' دایره ای است به مرکز O و شعاع $\frac{Pow_{\omega}^{O'}}{2R_{\omega'}}$.

□

مثال ۳.۱.

ω_B و ω_C دایره محاطی خارجی مثلث $\triangle ABC$ هستند. دایره ω'_B با دایره ω_B نسبت به وسط AC متقارن هستند و دایره ω'_C با دایره ω_C نسبت به وسط AB متقارن هستند. اثبات کنید که محور اصلی ω'_C و ω'_B محیط مثلث را نصف می‌کند. (روسه ۲۰۰۵)

اثبات. دایره محاطی مثلث را ω بنامید و محل تماس ω_A با خط BC را D در نظر میگیریم حال اثبات میکنیم که خط AD محور اصلی دو دایره ω'_B و ω'_C است.



کافی است بگوییم که:

$$Pow_{\omega}^D - Pow_{\omega_B}^D = Pow_{\omega}^D - Pow_{\omega_C}^D$$

داریم:

$$\begin{aligned} Pow_{\omega}^D - Pow_{\omega_B}^D &= 2dist(D, \overline{AC})(r_B - r) \\ &= 2(p - b)Sin(\angle ACB)(r_B - r) \end{aligned}$$

به نحو مشابه داریم:

$$Pow_{\omega}^D - Pow_{\omega_C}^D = 2(p - c)Sin(\angle ABC)(r_C - r)$$

و در نهایت

$$\begin{aligned} 2(p - c)Sin(\angle ABC)(r_C - r) &= 2(p - b)Sin(\angle ACB)(r_B - r) \\ \Leftrightarrow \frac{b}{c} &= \frac{(p - b)(r_B - r)}{(p - c)(r_C - r)} \quad (*) \end{aligned}$$

از طرفی داریم:

$$\frac{r_B - r}{r} = \frac{c}{p - c} \quad \frac{r_c - r}{r} = \frac{b}{p - c}$$

□


حالا با تقسیم این دو عبارت بر هم درستی (*) را نتیجه میگیریم.

۲ اختلاف قوت

قضیه ۱.۲.

فرض کنید که دوائر ω_1 و ω_2 و نقاط همخط A ، B و C در یک صفحه هستند. و $C = \alpha A + (1 - \alpha)B$ آنوقت داریم:

$$\mathbf{P}(C, \omega_1, \omega_2) = \alpha \mathbf{P}(A, \omega_1, \omega_2) + (1 - \alpha) \mathbf{P}(B, \omega_1, \omega_2)$$

اثبات. فرض کنید که d_P فاصله نقطه P تا محور اصلی ω_1 و ω_2 باشد.

حالا از قضیه کیسی داریم:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(C, \omega_1, \omega_2) &= 2d_C O_1 O_2 = \frac{BC}{AB} \times \overbrace{2d_A O_1 O_2}^{\mathbf{P}(A, \omega_1, \omega_2)} + \frac{AC}{AB} \times \overbrace{2d_B O_1 O_2}^{\mathbf{P}(B, \omega_1, \omega_2)} \\ &= \alpha \mathbf{P}(A, \omega_1, \omega_2) + (1 - \alpha) \mathbf{P}(B, \omega_1, \omega_2) \end{aligned}$$


□

که به این ترتیب حکم اثبات میشود.

مثال ۲.۲.

چهارضلعی $APBQ$ در دایره ω محاط شده است به طوری که $\angle P = \angle Q = 90^\circ$ و $AP = AQ < BP$. فرض کنید که X نقطه ای متغیر بر روی پاره خط PQ باشد. خط AX ، دایره ω را برای بار دیگر در نقطه S قطع میکند. نقطه T به روی کمان AQB از ω قرار دارد به طوری که \overline{AX} بر \overline{XT} عمود است. اثبات کنید که اگر M را وسط \overline{ST} بنامیم، با حرکت X روی پاره خط PQ مکان هندسی M یک دایره است.

اثبات. دایره به قطر AO را ω' در نظر بگیرید. اثبات میکنیم که M به روی دایره ای هم مرکز با ω' قرار دارد. برای این منظور کافی است اثبات کنیم قوت M نسبت به ω' مستقل از X است. بر اساس خطی بودن قوت نقطه میتوانیم بنویسیم:



$$\begin{aligned}
 \mathbf{P}(M, \omega', \omega) &= \left(\frac{1}{2}\right)\mathbf{P}(S, \omega', \omega) + \left(\frac{1}{2}\right)\mathbf{P}(T, \omega', \omega) \\
 \Rightarrow Pow_M^{\omega'} &= \frac{AS^2 + AT^2 - ST^2}{4} \\
 &= \frac{2AS \cdot AT \cos(\angle A)}{4} \\
 &= \frac{AP^2}{2}
 \end{aligned}$$


پس قوت M نسبت به ω' برابر با ثابت $\frac{AP^2}{2}$ که نتیجه میدهد M بر روی دایره ای به مرکز وسط AO حرکت میکند.

□

لم ۱.۲ (نسبت قوت).

فرض کنید که دوایر ω_1 و ω_2 در صفحه موجود اند و برای نقطه P مقدار $\frac{Pow_{\omega_1}^P}{Pow_{\omega_2}^P}$ ثابت است. آنوقت مکان هندسی نقاط P با این خاصیت دایره ای است هم محور با ω_1 و ω_2 .

اثبات. فرض میکنیم که X و Y محل برخورد دو دایره ω_1 و ω_2 باشند. و O_1, O_2, O' به ترتیب مرکز دایره (PXY) ، ω_1 و ω_2 هستند. l را هم محور اصلی ω_1 و ω_2 معرفی میکنیم. ادعا میکنیم که O' ساکن است، چون اگر چنین باشد P نیز بر روی دایره ای ثابت حرکت میکند.



حال با دو بار استفاده از قضیه کیسی داریم:


$$\left. \begin{aligned} \mathbf{P}(P, (PXY), \omega_1) &= 2\text{dist}(P, l)O'O_1 = \text{Pow}_{\omega_1}^P \\ \mathbf{P}(P, (PXY), \omega_2) &= 2\text{dist}(P, l)O'O_2 = \text{Pow}_{\omega_2}^P \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\text{Pow}_{\omega_1}^P}{\text{Pow}_{\omega_2}^P} = \frac{O_1O'}{O_2O'}$$

□ بنا بر این نسبت $\frac{O_1O'}{O_2O'}$ ثابت است که با توجه به جهت P فقط میتوان یک نقطه برای O' در نظر گرفت.

مثال ۳.۲.

فرض کنید نقطه P نقطه ای در صفحه مثلث $\triangle ABC$ است. و خط l خطوط BC ، AC و AB به ترتیب در نقاط D ، E و F قطع میکند. A' را محل برخورد خط AP با l و نقاط B' و C' را به همین ترتیب تعریف میکنیم. اثبات کنید که دایره (PDA') ، (PEB') و (PFC') در نقطه ی دیگری به غیر از P برخورد دارند.

اثبات. دایره $(PA'D)$ را ω_A مینامیم و ω_B و ω_C را به نحو مشابه تعریف میکنیم.



دایره $(PA'D)$ را ω_A مینامیم و ω_B و ω_C را به نحو مشابه تعریف میکنیم. حالا کافی است اثبات کنیم که $\frac{Pow_{\omega_B}^A}{Pow_{\omega_C}^A} = \frac{Pow_{\omega_B}^D}{Pow_{\omega_C}^D}$ زیرا بر اساس لم نسبت قوت میتوانیم نتیجه بگیریم که A' و D برو روی دایره ای قرار دارند که از قضا با دایره ω_B و ω_C هم محور است و ما را به نتیجه مطلوب میرساند. بنا بر این داریم:

$$\begin{aligned} \frac{Pow_{\omega_B}^D}{Pow_{\omega_C}^D} &= \frac{Pow_{\omega_B}^{A'}}{Pow_{\omega_C}^{A'}} \\ \Leftrightarrow \frac{DB' \cdot DE}{DF \cdot DC'} &= \frac{A'B' \cdot A'E}{A'C' \cdot A'F} \\ \Leftrightarrow \frac{\frac{DB'}{DC'}}{\frac{A'B'}{A'C'}} &= \frac{\frac{DE}{DF}}{\frac{A'E}{A'F}} (*) \end{aligned}$$

حال با استفاده از ناهمساز ادامه میدهم:

$$LHS = (DA', B'C') \stackrel{P}{=} (\overline{DAP} \cap \overline{BC}, BC) \stackrel{A}{=} (DA', FE) = RHS$$


□

لم ۲.۲ (لم هم محوری).

اگر $ABCD$ چهارضلعی محاطی باشد و خط l خطوط AD و BC را در P و Q قطع کنند و داشته باشیم $\angle BQP = \angle APQ$ و اگر خطوط AC و BD را در S و R قطع کند. آنوقت دایره ای که از P و S میگذرد و بر اقطار چهارضلعی مماس است، دایره ای که از Q و R میگذرد و بر اضلاع چهارضلعی مماس است و دایره محیطی $(ABCD)$ هم محور اند.

اثبات. اولاً واضح است که دایره ای وجود دارد که در S و R بر قطر ها مماس باشد چون داریم:

$$\angle CSQ = 180^\circ - \angle SQC - \angle BCA = 180^\circ - \angle ADB - \angle DPR = \angle DRP$$



حالا توجه کنید که $\triangle BQR \sim \triangle APS$ و $\triangle QSC \sim \triangle PRD$ پس داریم:

$$\frac{AP}{AS} = \frac{BQ}{BR} = \frac{\sin(\angle BRQ)}{\sin(\angle BQR)} = \frac{\sin(\angle CSQ)}{\sin(\angle CQS)} = \frac{CQ}{CS} = \frac{DP}{DR}$$

پس در نتیجه نسبت قوت نقاط A, B, C و D نسبت به دو دایره کوچکتر ثابت است بنابراین روی دایره ای هم محور با دو دایره کوچکتر قرار دارن. که این حکم را نتیجه میدهد.

□

۳ قضیه کیسی (برای دواير)


قضیه ۱.۳ (قضیه کیسی).

مثلث $\triangle ABC$ مفروض است. و دایره ω در صفحه مفروض است. AD, BE و CF مماس های وارد بر دایره ω هستند. رابطه ی:

$$AD \cdot BC \pm BE \cdot AC \pm CF \cdot AB = 0$$

برقرار است اگر و تنها اگر (ABC) و ω بر هم مماس باشند.

اثبات. ابتدا طرف اگر را اثبات میکنم. فرض کنید که دو دایره (ABC) و ω در نقطه T مماس باشند.



میتوانیم T را نقطه ای هم محور با دو دایره دیگر در نظر بگیریم بنابر این طبق لم نسبت قوت، ثابت $c \neq 0$ وجود دارد که:

$$\frac{AD}{AT} = \frac{BE}{BT} = \frac{CF}{CT} = c$$

پس طبق فرض داریم:

$$AD \cdot BC \pm BE \cdot AC \pm CF \cdot AB = c(AT \cdot BC \pm BT \cdot AC \pm CT \cdot AB) = 0$$

که چون $ABTC$ محاطی است طبق قضیه بطلمیوس این رابطه برقرار است. حالا برعکس قضیه را اثبات میکنیم. فرض کنید که دو دایره مماس نیستند و این رابطه برقرار است. T را نقطه ای در نظر بگیرید که با دو دایره (ABC) و ω هم محور باشد. دوباره طبق لم نسبت قوت، ثابت $c \neq 0$ وجود دارد که:

$$AD \cdot BC \pm BE \cdot AC \pm CF \cdot AB = c(AT \cdot BC \pm BT \cdot AC \pm CT \cdot AB) = 0$$


اما اگر $AT \cdot BC \pm BT \cdot AC \pm CT \cdot AB = 0$ طبق قضیه بطلمیوس T باید روی دایره (ABC) باشد که این نتیجه میدهد که دو دایره (ABC) و ω بر هم مماس اند.

□

مثال ۲.۳.

ثابت کنید که در هر مثلثی دایره γ نه نقطه بر دایره محاطی آن مثلث مماس است.

اثبات. با استفاده از قضیه کیسی بر مثلث $\triangle MNP$ حکم را اثبات میکنیم:



$$\begin{aligned} MD \cdot NP \pm NE \cdot MP \pm PF \cdot MN &= \frac{b-c}{2} \cdot \frac{a}{2} - \frac{a-c}{2} \cdot \frac{b}{2} + \frac{a-b}{2} \cdot \frac{c}{2} \\ &= \frac{ba - ca - ab + bc + ac - bc}{4} \\ &= 0 \end{aligned}$$

بنابر این طبق قضیه کیسی دایره γ محاطی و دایره نه نقطه بر هم مماس اند.

□

۴ سوالات پایان فصل

مسئله ۱. دایره ω درون دایره Ω قرار دارد و نقطه X روی Ω حرکت می‌کند. خطوط مماس از X به ω برخورد دوم با دایره Ω را در نقاط $A \neq X$ و $B \neq X$ قرار می‌دهند. ثابت کنید خطوط AB یا همگی به یک دایره ثابت مماس هستند یا همگی از یک نقطه عبور می‌کنند.

مسئله ۲. چهارضلعی محدب $ABCD$ و نقاط دلخواه P و Q در داخل آن را در نظر بگیرید بطوری که $\angle APB = \angle CPD = \angle AQB = \angle CQD$ باشد. ثابت کنید که خط های PQ بدست آمده از این روش، همگی از یک نقطه ثابت می‌گذرند یا همگی موازی اند.

مسئله ۳. در مثلث ABC نقاط P ، Q و R به ترتیب روی اضلاع BC ، CA و AB قرار دارند. ω_A ، ω_B و ω_C به ترتیب دایره های محیطی مثلث های AQR ، BRP و CPQ هستند. با این فرض که پاره خط AP ، ω_A ، ω_B و ω_C را دوباره به ترتیب در X ، Y و Z قطع کند، ثابت کنید $YX/XZ = BP/PC$.

مسئله ۴. در مثلث ABC نقطه D روی ضلع BC انتخاب شده است. دایره محیطی مثلث های ABD و ACD اضلاع AC و AB را به ترتیب در نقاط E و F قطع می‌کند. ثابت کنید با تغییر D روی ضلع BC ، دایره محیطی AEF از نقطه ثابتی می‌گذرد. این نقطه روی میانه AD می‌باشد.

مسئله ۵. دایره های (O_1) و (O_2) به ترتیب در نقاط M و N از داخل به دایره ω مماس هستند. مماس های داخلی مشترک این دو دایره، دایره ω را در ۴ نقطه قطع می‌کنند، نقاط B و C را دو نقطه از این نقاط در نظر بگیرید بطوری که B و C هر دو در یک سمت خط O_1O_2 باشند. ثابت کنید که BC با یک مماس خارجی مشترک (O_1) و (O_2) موازی است.

مسئله ۶. فرض کنید Ω دایره محیطی ABC و نقطه D نقطه BC اشتراک BC با دایره محاطی مثلث ABC باشد. فرض کنید ω دایره ای درون Ω مماس باشد که D بر BC باشد. ثابت کنید $\angle ATI = 90^\circ$