

## 9. Polinom interpoláció

### 9.1. Feladat

Tekintsük az  $f(x) = \sqrt{x}$  függvényt és az 1, 4, 9 alappontokat.

- (a) Írjuk fel az interpolációs polinom Lagrange-alakját!
- (b) Írjuk fel az interpolációs polinom Newton-alakját!
- (c) Ellenőrizzük, hogy a Lagrange- és a Newton-alakban felírt polinomok egyenlők!
- (d) Közelítsük  $f(2) = \sqrt{2}$ -t az interpolációs polinom segítségével!
- (e) Becsüljük a hibát az  $x = 2$  pontban és az  $[1, 9]$  intervallumon!

- (a) A Lagrange-alak felírásához először meg kell határoznunk a Lagrange-alappolinomokat.

$$\begin{aligned}\ell_0(x) &= \frac{(x-4)(x-9)}{(1-4)(1-9)} = \frac{1}{24}(x-4)(x-9), \\ \ell_1(x) &= \frac{(x-1)(x-9)}{(4-1)(4-9)} = -\frac{1}{15}(x-1)(x-9), \\ \ell_2(x) &= \frac{(x-1)(x-4)}{(9-1)(9-4)} = \frac{1}{40}(x-1)(x-4).\end{aligned}$$

Az 1, 4, 9 alappontokhoz tartozó függvényértékek rendre 1, 2, 3. Felhasználva az interpolációs polinom Lagrange-alakjának definícióját:

$$L_2(x) = 1 \cdot \ell_0(x) + 2 \cdot \ell_1(x) + 3 \cdot \ell_2(x),$$

azaz

$$L_2(x) = \frac{1}{24}(x-4)(x-9) - \frac{2}{15}(x-1)(x-9) + \frac{3}{40}(x-1)(x-4).$$

- (b) Az alappontok és a függvényértékek ismeretében felírhatjuk az osztott differencia táblázatot.

$x_i$	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
1	<b>1</b>		
4	2	$\frac{2-1}{4-1} = \frac{1}{3}$	
9	3	$\frac{3-2}{9-4} = \frac{1}{5}$	$\frac{\frac{1}{5}-\frac{1}{3}}{9-1} = -\frac{1}{60}$

A táblázat segítségével pedig felírhatjuk az interpolációs polinom Newton-alakját:

$$N_2(x) = 1 + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{60}(x-1)(x-4).$$

- (c) Először vizsgáljuk a Lagrange-alakot, hozzuk  $L_2$ -t algebrai alakra:

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{1}{24}(x-4)(x-9) - \frac{2}{15}(x-1)(x-9) + \frac{3}{40}(x-1)(x-4) = \\ &= \frac{1}{24}(x^2 - 13x + 36) - \frac{2}{15}(x^2 - 10x + 9) + \frac{3}{40}(x^2 - 5x + 4) = \\ &= \frac{1}{120}(5(x^2 - 13x + 36) - 16(x^2 - 10x + 9) + 9(x^2 - 5x + 4)) = \\ &= \frac{1}{120}(-2x^2 + 50x + 72) = -\frac{1}{60}(x^2 - 25x - 36). \end{aligned}$$

Most hozzuk  $N_2$ -t is algebrai alakra:

$$\begin{aligned} N_2(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{60}(x-1)(x-4) = \\ &= 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} - \frac{1}{60}(x^2 - 5x + 4) = \\ &= \frac{20}{60}x + \frac{40}{60} - \frac{1}{60}(x^2 - 5x + 4) = \\ &= -\frac{1}{60}(-20x - 40 + x^2 - 5x + 4) = -\frac{1}{60}(x^2 - 25x - 36). \end{aligned}$$

Láthatjuk, hogy  $L_2 \equiv N_2$ , ami nem meglepő, hiszen tudjuk, hogy az interpolációs feladat megoldása egyértelmű. A továbbiakban az interpolációs polinomot mindig  $L_n$ -nek nevezzük, a Newton-alak hangsúlyozására használt  $N_n$  jelölést nem fogjuk használni.

(d) Közelítsük  $\sqrt{2}$ -t  $L_2$  segítségével!

$$\sqrt{2} \approx L_2(2) = 1 + \frac{1}{3}(2-1) - \frac{1}{60}(2-1)(2-4) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{30} = \frac{41}{30}.$$

### 9.1. Megjegyzés

A fenti kifejezés a  $\sqrt{2}$  egy úgynevezett racionális approximációja. A fenti módszer működik tetszőleges függvény esetében, amelynek értékei irracionálisak lehetnek. Tegyük fel ugyanis, hogy  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{Q}$  és  $x \in \mathbb{Q}$ . Ekkor a Lagrange-alappolinomok definíciója alapján nyilván  $\ell_k(x) \in \mathbb{Q}$ . Ha feltesszük most, hogy a függvényértékek is racionálisak, azaz  $f(x_0), \dots, f(x_n) \in \mathbb{Q}$ , miközben  $f(x) \in \mathbb{Q}^*$ , akkor azt kapjuk, hogy

$$\mathbb{Q}^* \ni f(x) \approx L_n(x) \in \mathbb{Q}$$

Vagy szavakkal kifejezve az alábbi eljárást: vegyünk egy  $f$  függvényt, melynek a racionális  $x_i$  helyeken a szintén racionális  $f(x_i)$  helyettesítési értékei ismertek. Ekkor, ha  $x$  racionális és  $f(x)$  irracionális, akkor az  $L_n(x)$  az  $f(x)$  irracionális szám egy racionális approximációja (közelítése).

(e) Tetszőleges  $x \in [1, 9]$  pontban az interpoláció hibáját az

$$|f(x) - L_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} \cdot |\omega_2(x)|$$

összefüggéssel tudjuk becsülni, ahol

$$M_3 = \max_{x \in [1, 9]} |f'''(x)| = \|f'''\|_\infty,$$

és

$$\omega_2(x) = (x-1)(x-4)(x-9).$$

A képlet alkalmazásához először számítsuk ki  $M_3$  értékét. Ehhez szükségünk lesz  $f$  harmadik deriváltjára:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, \\ f'(x) &= \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}, \\ f''(x) &= -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}, \\ f'''(x) &= \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}. \end{aligned}$$

Felhasználva, hogy az  $|f'''|$  pozitív és szigorúan monoton csökkenő a kijelölt intervallumon:

$$|f'''(x)| = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8}\frac{1}{\sqrt{x^5}} \leq \frac{3}{8} = M_3 \quad (x \in [1, 9]).$$

Az  $x = 2$  pontbeli hiba becsléséhez szükségünk van még  $|\omega_2(2)|$  értékére:

$$|\omega_2(2)| = |(2-1) \cdot (2-4) \cdot (2-9)| = 14.$$

Most felírhatjuk a pontbeli hiba becslését, a fenti képletet alkalmazva:

$$|f(2) - L_2(2)| \leq \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3!} \cdot 14 = \frac{7}{8}.$$

Ha azt szeretnénk, hogy a hibabecslés az  $[1, 9]$  intervallum bármely pontjára teljesüljön, akkor az előző képletben  $|\omega_2(x)|$ -et az

$$\|\omega_2\|_\infty = \max_{x \in [1, 9]} |\omega_2(x)|$$

kifejezésre kell cserélnünk. Feladatunk tehát az, hogy kiszámítsuk  $|\omega_2(x)|$  maximumát az  $[1, 9]$  intervallumon. Nyilvánvaló, hogy  $|\omega_2(x)|$ -nek csak ott lehet maximuma, ahol  $\omega_2(x)$ -nek szélsőértéke van a kijelölt intervallumon. Az intervallum végpontjaiban  $\omega_2(1) = \omega_2(9) = 0$ , ez minden olyan esetben igaz, ahol az intervallum végpontjai az interpoláció alappontjai. Ebből következően  $|\omega_2(x)|$ -nek az  $\omega_2$   $[1, 9]$  intervallumba eső lokális szélsőérték helyén lehet. A lehetséges lokális szélsőértékek meghatározásához keressük meg  $\omega_2'(x)$  gyökeit:

$$\begin{aligned} \omega_2(x) &= (x-1)(x-4)(x-9) = x^3 - 14x^2 + 49x - 36 \\ \omega_2'(x) &= 3x^2 - 28x + 49 = 0 \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$x_{1,2} = \frac{28 \pm \sqrt{28^2 - 4 \cdot 3 \cdot 49}}{2 \cdot 3} = \frac{28 \pm 14}{6} = \frac{14 \pm 7}{3}.$$

Ebből pedig

$$\begin{aligned} x_1 &= 7, \\ x_2 &= \frac{7}{3}, \end{aligned}$$

továbbá


$$\begin{aligned} \omega_2(x_1) &= \omega_2(7) = (7-1)(7-4)(7-9) = -36, \\ \omega_2(x_2) &= \omega_2\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{400}{27} \approx 14,8. \end{aligned}$$

A fentiekből nyilvánvaló, hogy

$$\|\omega_2\|_\infty = \max_{x \in [1,9]} |\omega_2(x)| = \max \left\{ |\omega_2(\frac{7}{3})|, |\omega_2(7)| \right\} = 36.$$

Így a teljes intervallumra érvényes hibabecslésünk a következő:

$$\|f - L_2\|_\infty \leq \frac{M_3}{3!} \|\omega_2\|_\infty = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3!} \cdot 36 = \frac{9}{4}.$$



## 9.2. Feladat

Írjuk fel az  $(x_i, y_i)$  pontokon interpoláló polinom Newton-alakját!


$x_i$	-2	-1	0	1	2
$y_i$	-15	-4	-1	0	5

Az alappontok és a hozzájuk tartozó  $y_i = f(x_i)$  értékek ismeretében felírhatjuk az osztott differencia táblázatot.

$x_i$	$y_i = f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	...	...
-2	<b>-15</b>				
-1	-4	$\frac{-4-(-15)}{-1-(-2)} = \mathbf{11}$			
0	-1	$\frac{-1-(-4)}{0-(-1)} = 3$	$\frac{3-11}{0-(-2)} = -4$		
1	0	$\frac{0-(-1)}{1-0} = 1$	$\frac{1-3}{1-(-1)} = -1$	$\frac{-1-(-4)}{1-(-2)} = 1$	
2	5	$\frac{5-0}{2-1} = 5$	$\frac{5-1}{2-0} = 2$	$\frac{2-(-1)}{2-(-1)} = 1$	$\frac{1-1}{2-(-2)} = 0$

A Newton-alak definíciójának megfelelően, a táblázat segítségével írhatjuk fel az interpolációs polinomot:

$$\begin{aligned}
 L_4(x) = & -15 + \\
 & + 11 \cdot (x + 2) - \\
 & - 4 \cdot (x + 2)(x + 1) + \\
 & + 1 \cdot (x + 2)(x + 1)(x - 0) + \\
 & + 0 \cdot (x + 2)(x + 1)(x - 0)(x - 1) = \dots = x^3 - x^2 + x - 1.
 \end{aligned}$$



### 9.3. Feladat

Tekintsük az  $f(x) = \log_2(x)$  függvényt, és az 1, 2, 4 alappontokat.

- (a) Adjuk meg az  $f$ -et, az alappontokban interpoláló polinom Newton-alakját!
- (b) A Newton-alak segítségével adjuk meg  $\log_2(3)$  racionális approximációját!
- (c) Írjuk fel az interpoláló polinom hibáját az  $x = 3$  pontban!

- (a) Számítsuk ki az alappontokban felvett függvényértékeket, majd írjuk fel az osztott differencia táblázatot.

$x_i$	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+2}]$
1	<b>0</b>		
2	1	$\frac{1-0}{2-1} = \mathbf{1}$	
4	2	$\frac{2-1}{4-2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\frac{1}{2}-1}{4-1} = -\frac{1}{6}$

A táblázat segítségével felírhatjuk az interpolációs polinom Newton-alakját:

$$L_2(x) = 0 + 1 \cdot (x - 1) - \frac{1}{6} \cdot (x - 1)(x - 2).$$

- (b) Az  $f(3) = \log_2(3)$  közelítése az interpolációs polinomból:

$$L_2(3) = 0 + 1 \cdot (3 - 1) - \frac{1}{6} \cdot (3 - 1)(3 - 2) = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}.$$

- (c) Az  $x = 3$  pontban a hibabecslés:

$$|f(3) - L_2(3)| \leq \frac{M_3}{3!} |\omega_2(3)|,$$

ahol  $|\omega_2(3)| = |(3 - 1)(3 - 2)(3 - 4)| = |-2| = 2$ . Most írjuk fel  $f$  deriváltjait:

$$f(x) = \log_2(x) = \frac{\ln x}{\ln 2},$$

$$f'(x) = \frac{1}{\ln 2} x^{-1},$$

$$f''(x) = -\frac{1}{\ln 2} x^{-2},$$


$$f'''(x) = \frac{2}{\ln 2} x^{-3},$$

melyből

$$|f'''(x)| = \frac{2}{x^3 \cdot \ln 2} \leq \frac{2}{\ln 2} = M_3, \quad x \in [1, 4].$$

Így felírhatjuk az  $x = 3$  pontbeli hibabecslést:

$$|\log_2(3) - L_2(3)| \leq \frac{\frac{2}{\ln 2}}{3!} \cdot 2 = \frac{2}{3 \ln 2} \approx 0,96.$$





#### 9.4. Feladat

Tekintsük a már korábbról ismerős  $f(x) = \sqrt{x}$  függvényt, amelyet ismét másodfokú polinommal szeretnénk interpolálni, viszont nem feltétlenül az 1, 4, 9 alappontokon. Hogyan válasszuk meg az interpoláció alappontjait, hogy az interpolációs polinom hibabecslése az  $[1, 9]$  intervallumon a lehető legpontosabb legyen? Írjuk fel a hibabecslést!

A másodfokú interpoláció miatt *három* alappontra van szükség. Ahhoz, hogy a hiba minimális legyen, úgy kell választani őket, hogy a *harmadfokú* Csebisev-polinom gyökeit az  $[1, 9]$  intervallumba transzformáljuk.  $T_3$  gyökei:

$$\begin{aligned}x_0 &= \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\x_1 &= \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 0, \\x_2 &= \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

Tudjuk, hogy a

$$\varphi(x) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cdot x$$

transzformáció a  $[-1, 1]$  intervallumot tetszőleges  $[a, b]$  intervallumra képezi. Legyen most  $[a, b] = [1, 9]$ , ekkor

$$\varphi(x) = \frac{1+9}{2} + \frac{9-1}{2} \cdot x = 5 + 4x.$$

Ezután alkalmazzuk  $\varphi$ -t a kiszámított Csebisev gyökökre:


$$\begin{aligned}y_0 &= \varphi(x_0) = 5 + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5 + 2\sqrt{3}, \\y_1 &= \varphi(x_1) = 5, \\y_2 &= \varphi(x_2) = 5 - 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5 - 2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

Most számítsuk ki az így kapott alappontokra felírt interpolációs polinom hibáját az

$$\|f - L_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{n+1}}$$

hibaformula alapján. Mivel esetünkben  $(b-a) = (9-1) = 8$ ,  $n = 2$ ,  $M_3$ -at pedig korábban már meghatároztuk, ezért:

$$\|f - L_2\|_\infty \leq \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3!} \cdot \frac{8^3}{2^5} = \frac{1}{16} \cdot 16 = 1.$$



Érdeemes észben tartani, hogy az  $[a, b]$  intervallumra transzformált Csebisev gyökök a hibaformulában szereplő  $\|\omega_n\|_\infty$  mennyiséget minimalizálják. Egyáltalán nem biztos, hogy a Csebisev gyökök megválasztásánál lesz az interpoláció  $[a, b]$  intervallumon vett *pontos* hibája, azaz az  $\|f - L_n\|_\infty$  mennyiség minimális! Az alappontok ilyen megválasztásával csak azt értük el, hogy a *hibabecslésünk* lett pontosabb.

Vegyük észre, hogy jelen példában az  $x = 1$  esetén a transzformált Csebisev gyökökön interpoláló polinom hibája nagyobb, mint az 1, 4, 9 alappontokon interpoláló polinom hibája a *teljes intervallumon*! Ez leolvasható az 1, 4, 9 pontokon interpoláló polinom hibáját illusztráló ábráról is.

