

1. gyakorlat

Valós-valós függvény határértéke

Emlékeztető. Az Analízis I. tárgyban megismertük valós-valós függvény **pontbeli határértékének a definícióját**. Ezzel a fogalommal egy függvénynek azt a – szemléletünk alapján eléggé világos – tulajdonságát foglaltuk meg matematikai szempontból *pontos* formában, hogy egy adott ponthoz „közel” helyeken a függvényértékek „közel” vannak valamely (valós, $+\infty$ vagy akár $-\infty$, vagyis $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ halmazbeli) értékhez. Idézzük fel az **általános definíciót**.

Azt a tényt, hogy egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely $a \in \mathcal{D}'_f$ pontban a határértéke $A \in \overline{\mathbb{R}}$ a következő szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\lim_a f = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad f(x) \rightarrow A, \text{ ha } x \rightarrow a. \quad \square$$

Néhány nevezetes határérték. A definíció alapján egyszerűen igazolhatók a szemléletesen „szinte nyilvánvaló” alábbi állítások:

- minden $a \in \mathbb{R}$ esetén $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$, ahol $n = 1, 2, 3, \dots$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$, ha $n = 1, 2, 3, \dots$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty, & \text{ha } n = 2, 4, 6, \dots \\ -\infty & \text{ha } n = 1, 3, 5, \dots \end{cases}$;
- minden $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esetén $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x^n} = \frac{1}{a^n}$, ahol $n = 1, 2, 3, \dots$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n}$, ha $n = 1, 2, 3, \dots$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} \nexists, & \text{ha } n = 1, 3, 5, \dots \\ +\infty & \text{ha } n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$;
- minden $a > 0$ esetén $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$.

Emlékeztető. A határérték és a műveletek közötti kapcsolatokra vonatkoznak az alábbi állítások:

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in (\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)'$ és $\exists A := \lim_a f \in \overline{\mathbb{R}}, \quad B := \lim_a g \in \overline{\mathbb{R}}$. Ekkor

- (a) $\exists \lim_a (f + g)$ és $\lim_a (f + g) = A + B$, feltéve, hogy $A + B \in \overline{\mathbb{R}}$ értelmezve van;
- (b) $\exists \lim_a (f \cdot g)$ és $\lim_a (f \cdot g) = A \cdot B$, feltéve, hogy $A \cdot B \in \overline{\mathbb{R}}$ értelmezve van;
- (c) $\exists \lim_a \frac{f}{g}$ és $\lim_a \frac{f}{g} = \frac{A}{B}$, feltéve, hogy $\frac{A}{B} \in \overline{\mathbb{R}}$ értelmezve van.

Megjegyezzük, hogy ezek az állítások *egyoldali határértékekre* is érvényesek.

Megjegyzés. Kritikus határértékek vizsgálata. Ha az előző tételben szereplő műveletek valamelyike nincs értelmezve, akkor az $f + g, f \cdot g, f/g$ függvények határértékéről általában semmit sem tudunk mondani (vö. a sorozatokra ismert eredményekkel). Ezeket **kritikus határértékeknek** nevezzük, és így jelöljük:

$$(+\infty) + (-\infty) \text{ (vagy } (+\infty) - (+\infty)), (-\infty) + (+\infty) \text{ (vagy } (-\infty) - (-\infty)), 0 \cdot (\pm\infty), \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \frac{0}{0}, \frac{1}{0}.$$

Ezekben az esetekben a sorozatoknál már megismert „módszert” követhetjük: a kritikus határértéket „valamilyen módon” (alkalmas azonosságok felhasználásával) megpróbáljuk nem kritikus határértékké átalakítani. \square

1. feladat. Határozzuk meg az alábbi határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^2 + 2x + 7), \quad (b) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x + 2).$$

Általánosítsuk a feladatot tetszőleges polinomra.

Megoldás. (a) $(-\infty) + (+\infty)$ típusú kritikus határértékről van szó, mert

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^2) = -\infty \text{ és } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + 7) = +\infty.$$

Az x^2 kiemelése után kapott

$$x^2 \cdot \left(-3 + \frac{2}{x} + \frac{7}{x^2}\right)$$

szorzat mindkét tényezőjének van határértéke $(+\infty)$ -ben, mert

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Így a határérték és a műveletek közötti kapcsolatokra vonatkozó állítások szerint

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^2 + 2x + 7) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \left(-3 + \frac{2}{x} + \frac{7}{x^2}\right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3 + \frac{2}{x} + \frac{7}{x^2}\right) = (+\infty) \cdot (-3) = -\infty. \end{aligned}$$

(b) Most is $(-\infty) + (+\infty)$ típusú kritikus határértékről van szó, mert

$$x^3 \rightarrow -\infty \text{ és } (-x + 2) \rightarrow +\infty, \text{ ha } x \rightarrow -\infty.$$

Mivel $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, ha $x \rightarrow -\infty$ ezért az előzőekhez hasonlóan az adódik, hogy

$$x^3 - x + 2 = x^3 \cdot \left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right) \rightarrow (-\infty) \cdot 1 = -\infty, \text{ ha } x \rightarrow -\infty.$$

A kért határérték tehát létezik, és $(-\infty)$ -vel egyenlő.

Általánosítás. Tekintsünk egy tetszőleges P polinomot, azaz legyen valamilyen $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$P(x) := \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ahol $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ és $\alpha_n \neq 0$. Ekkor

$$P(x) = x^n \cdot \left(\alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{x} + \frac{\alpha_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{\alpha_0}{x^n}\right) \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

$(+\infty)$ -ben a határérték

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{x} + \frac{\alpha_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{\alpha_0}{x^n}\right) = (+\infty) \cdot \alpha_n = \\ &= \text{sign } \alpha_n \cdot (+\infty). \end{aligned}$$

$(-\infty)$ -ben a határérték pedig

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{x} + \frac{\alpha_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{\alpha_0}{x^n} \right) = \\ &= (-1)^n \cdot (+\infty) \cdot \alpha_n = \underline{(-1)^n \cdot \text{sign } \alpha_n \cdot (+\infty)}. \blacksquare\end{aligned}$$

Megjegyzés. Az előző állítások tehát azt jelentik, hogy polinomok „viselkedését” a plusz/mínusz végtelen környezetében a polinom főtagja (az $\alpha_n x^n$ tag, illetve még pontosabban az α_n főegyüttható előjele és n paritása) határozza meg, azaz polinom határértéke a \pm végtelenben megegyezik a főtag \pm végtelenben vett határértékével.

2. feladat. Számítsuk ki a következő határértékeket:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x + 1}{x^3 + x + 2}, & \text{(b)} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x - 3}{x^2 + 2x + 1}, \\ \text{(c)} \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2 + 2x - 7}{x^2 - 5x + 6}, & \text{(d)} \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x^2 + 2x - 7}{x^2 - 5x + 6}. \end{array}$$

Megoldás. Racionális törtfüggvényekről, vagyis két polinom hányadosairól van szó. Polinomnak bármely véges helyen van határértéke, és az a helyettesítési értékkel egyenlő.

(a) A számláló, illetve a nevező határértéke 1-ben 3, illetve 4, ezért a hányadosfüggvény határértékére vonatkozó tétel alapján a tört határértéke 1-ben $3/4$.

(b) A számláló, illetve a nevező határértéke (-1) -ben -3 , illetve 0 , ezért most $1/0$ típusú kritikus határértékről van szó. Vegyük figyelembe, hogy $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$, és tekintsük a következő átalakítást:

$$\frac{x^2 + x - 3}{x^2 + 2x + 1} = (x^2 + x - 3) \cdot \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Mivel

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x+1)^2} = +\infty,$$

ezért a szorzatfüggvény határértékére vonatkozó tétel szerint

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x - 3}{x^2 + 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + x - 3) \cdot \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x+1)^2} = (-3) \cdot (+\infty) = \underline{-\infty}.$$

(c) A számláló, illetve a nevező határértéke 2-ben 1, illetve 0, ezért ugyanezek a 2-ben vett jobb oldali határértékek is. Most $1/0$ típusú határértékről van szó. Vegyük észre azt, hogy $x^2 - 5x + 6 = (x-3)(x-2)$, és tekintsük a következő átalakítást:

$$\frac{x^2 + 2x - 7}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x^2 + 2x - 7}{(x-3)(x-2)} = \frac{x^2 + 2x - 7}{x-3} \cdot \frac{1}{x-2}.$$

Mivel

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{1}{x-2} = +\infty,$$

ezért a szorzatfüggvény határértékére vonatkozó tétel szerint

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2 + 2x - 7}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2 + 2x - 7}{x - 3} \cdot \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{-1} \cdot (+\infty) = \underline{\underline{-\infty}}.$$

(d) Az előző gondolatmenetet követve most azt használjuk fel, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{1}{x - 2} = -\infty,$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x^2 + 2x - 7}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x^2 + 2x - 7}{x - 3} \cdot \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{-1} \cdot (-\infty) = \underline{\underline{+\infty}}. \blacksquare$$

Megjegyzés. A feladatban alkalmazott gondolatmeneteket követve vizsgálhatjuk tetszőleges racionális törtfüggvény *véges helyen* vett határértékét (l. a „További feladatok” 2. feladatát). \square

3. feladat. A „kiemelés technikájával” határozzuk meg az alábbi határértékeket:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 23}{-3x^3 - 5x^2 + 31x + 1}, & \text{(b)} \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 7x^2 + 5x - 1}, \\ \text{(c)} \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x^2 + 11x + 2}{x^2 + 3x + 2}. \end{aligned}$$

Megoldás. Mindegyik esetben kritikus határértékről van szó. Azt a közös *ötletet* használjuk, hogy a számlálóból és a nevezőből kiemeljük a legmagasabb fokú hatványt. Egyszerűsítés után már nem kritikus határértékeket fogunk kapni.

(a) $\frac{+\infty}{-\infty}$ típusú kritikus határértékről van szó, mert a számlálóban, illetve a nevezőben levő polinom határértéke $(+\infty)$ -ben $+\infty$, illetve $-\infty$.

Feltehető, hogy $x > 0$. Ekkor a fenti ötletet alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\frac{2x^3 + 3x^2 + 23}{-3x^3 - 5x^2 + 31x + 1} = \frac{x^3 \cdot \left(2 + \frac{3}{x} + \frac{23}{x^3}\right)}{x^3 \cdot \left(-3 - \frac{5}{x} + \frac{31}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)} = \frac{2 + \frac{3}{x} + \frac{23}{x^3}}{-3 - \frac{5}{x} + \frac{31}{x^2} + \frac{1}{x^3}}.$$

Mivel $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, ha $x \rightarrow +\infty$, ezért a határérték és a műveletekre vonatkozó tételből következik, hogy a számláló 2-höz, a nevező pedig (-3) -hoz, a tört pedig $(-2/3)$ -hoz tart, ha $x \rightarrow +\infty$. A kért határérték tehát létezik, és

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 23}{-3x^3 - 5x^2 + 31x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{3}{x} + \frac{23}{x^3}}{-3 - \frac{5}{x} + \frac{31}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \underline{\underline{-\frac{2}{3}}}.$$

(b) $\frac{+\infty}{+\infty}$ típusú kritikus határértékről van szó, mert a számláló és a nevező is $(+\infty)$ -hez tart, ha $x \rightarrow +\infty$.

Legyen $x > 0$. Ekkor az (a)-beli gondolatmenetet követve azt kapjuk, hogy

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 7x^2 + 5x - 1} = \frac{x^2 \cdot \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^3 \cdot \left(1 - \frac{7}{x} + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right)} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}{1 - \frac{7}{x} + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{x^3}} \rightarrow 0, \text{ ha } x \rightarrow +\infty.$$

A kért határérték tehát létezik, és 0-val egyenlő.

(c) $\frac{-\infty}{+\infty}$ típusú kritikus határértékről van szó, mert a számlálónak, illetve a nevezőnek a határértéke $(-\infty)$ -ben $-\infty$, illetve $+\infty$.

Legyen $x < 0$. Ekkor az (a)-beli gondolatmenetet követve azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \frac{x^3 + 2x^2 + 11x + 2}{x^2 + 3x + 2} &= \frac{x^3 \cdot \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right)}{x^2 \cdot \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)} = \\ &= x \cdot \frac{1 + \frac{2}{x} + \frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} \rightarrow (-\infty) \cdot \frac{1}{1} = -\infty, \quad \text{ha } x \rightarrow -\infty, \end{aligned}$$

mert $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ és $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

A kért határérték tehát létezik, és $(-\infty)$ -nel egyenlő. ■

Megjegyzés. A fenti egyszerű gondolatmenet alkalmazható *tetszőleges* racionális törtfüggvény $(\pm\infty)$ -ben vett határértéknek a vizsgálatánál (l. a „További feladatok” 3. feladatát). □

4. feladat. A „szorzatra bontás technikájával” vizsgáljuk meg a következő határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 7x + 10}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 7x + 10}.$$

Megoldás. (a) $\frac{0}{0}$ típusú kritikus határértékről van szó, mert a számlálónak és a nevezőnek is 0 a határértéke a 2 pontban.

Vegyük észre, hogy a számláló és a nevező is *szorzatra bontható*. Ugyanis

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2) \cdot (x - 3) \quad \text{és} \quad x^2 - 7x + 10 = (x - 2) \cdot (x - 5).$$

(Ha „ránézésre” nem sikerül rögtön felírni a gyöktényezős alakot, akkor a másodfokú egyenlet megoldóképletét is használhatjuk.)

Így

$$(*) \quad \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 7x + 10} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x - 5)} = \frac{x - 3}{x - 5} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 5\}).$$

A jobb oldalon levő függvénynek van határértéke a 2 pontban, és az $1/3$ -dal egyenlő, ezért a kért határérték létezik. A határérték és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tételt alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 7x + 10} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 3}{x - 5} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}.$$

(b) Most $\frac{1}{0}$ típusú kritikus határértékről van szó, mert az 5 pontban a számláló, illetve a nevező határértéke 6, illetve 0.

A (*) átalakítás után is kritikus határértéket ($\frac{1}{0}$ típusút) kapunk. Vegyük észre azonban azt, hogy az *egyoldali* határértékek léteznek. Ugyanis

$$\lim_{x \rightarrow 5+0} \frac{x - 3}{x - 5} = +\infty \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 5-0} \frac{x - 3}{x - 5} = -\infty.$$

A két határérték különböző, ezért a kért határérték nem létezik. ■

5. feladat. A „gyöktelenítés technikájával” számítsuk ki az alábbi határértékeket:

- (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x},$
 (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 - 1}).$

Megoldás. (a) $\frac{0}{0}$ típusú kritikus határértékről van szó, mert a számlálónak és a nevezőnek is 0 a határértéke a 0 pontban.

Most „gyöktelenítsük” a számlálót, vagyis szorozzuk meg a törtet az $1 \equiv \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1}$ kifejezéssel. Ekkor azt kapjuk, hogy

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + 1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{x}{x \cdot (\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

Világos, hogy ezzel az átalakítással már nem kritikus határértéket kapunk. A határérték és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tétel szerint

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{1}{2}.$$

(b) $(+\infty) - (+\infty)$ típusú kritikus határértékről van szó. A következő átalakítások lesznek célravezetők: Ha $x < 0$, akkor

$$\begin{aligned} & (\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 - 1}) \cdot \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{-x + 2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 - 1}} = \\ & = \frac{-1 + \frac{2}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{x} + \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}} = (\text{Vigyázn! Mivel } x < 0, \text{ ezért } \sqrt{x^2} = -x.) = \\ & = \frac{-1 + \frac{2}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{-\sqrt{x^2}} + \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{-\sqrt{x^2}}} = \frac{-1 + \frac{2}{x}}{-\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}. \end{aligned}$$

Mivel $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$, ezért a határérték és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tétel szerint

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 - 1}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 + \frac{2}{x}}{-\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\ &= \frac{-1}{-1 - 1} = \frac{1}{2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

6. feladat. A hatványsor összegfüggvényének a határértékére vonatkozó tétel alapján lássuk be, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Megoldás. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén a definíció szerint

$$\sin x := x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

(A hányadoskritériumból következik, hogy a fenti hatványsor minden $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens.) Ha $x \neq 0$ valós szám, akkor

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

A jobb oldalt 0 középpontú hatványsornak tekintjük. A hányadoskritérium felhasználásával könnyű megmutatni, hogy ez a hatványsor minden $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens. A hatványsor összegfüggvényének a határértékére vonatkozó tétel szerint a hatványsor összegfüggvényének van határértéke a 0 pontban, és az egyenlő az összegfüggvény 0-ban felvett helyettesítési értékével, vagyis 1-gyel. Ezzel beláttuk azt, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots \right) = 1. \blacksquare$$

7. feladat. A $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ felhasználásával számítsuk ki az alábbi határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} \quad (a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}), \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

Megoldás. (a) $\frac{0}{0}$ típusú határértékről van szó, mert a \sin függvény definíciója szerint a számláló és a nevező határértéke a 0 pontban 0-val egyenlő.

Először vegyük észre azt, hogy a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ egyenlőségből következik, hogy minden $c \neq 0$ valós számra $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin cx}{cx} = 1$ is igaz.

A feltétel szerint $a \neq 0$ és $b \neq 0$ valós számok. A következő átalakítások lesznek célravezetők:

$$\frac{\sin ax}{\sin bx} = \frac{\frac{\sin ax}{ax} \cdot ax}{\frac{\sin bx}{bx} \cdot bx} = \frac{a}{b} \cdot \frac{\frac{\sin ax}{ax}}{\frac{\sin bx}{bx}}.$$

Az előzőek alapján azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{\frac{\sin ax}{ax}}{\frac{\sin bx}{bx}} \right) = \frac{a}{b} \cdot \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{bx}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a}{b}.$$

(b) Először emlékeztetünk a \cos függvény definíciójára:

$$\cos x := 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(Most is a hányadoskritériummal lehet egyszerűen igazolni azt, hogy a fenti sor minden x valós számra konvergens.)

$\frac{0}{0}$ típusú kritikus határértékről van szó, mert $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

1. megoldás. Világos, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{(2x)^2}.$$

A tört átalakításához használjuk fel az alábbi fontos trigonometrikus azonosságokat:

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ha $x \neq 0$ valós szám, akkor

$$\frac{1 - \cos(2x)}{(2x)^2} = \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x) - (\cos^2 x - \sin^2 x)}{4x^2} = \frac{2 \sin^2 x}{4x^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2,$$

ezért

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{(2x)^2} = \frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}. \blacksquare \end{aligned}$$

2. megoldás. Kiindulhatunk a \cos függvény definíciójából is:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \right)}{x^2} = \frac{1}{2!} - \frac{x^2}{4!} + \frac{x^4}{6!} - \dots \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

Az utolsó egyenlőség jobb oldala egy 0 középpontú, az egész \mathbb{R} halmazon konvergens hatványsor összegfüggvénye. Ennek a függvénynek a 0 pontban van határértéke, és az egyenlő a függvény 0 pontban felvett helyettesítési értékével, vagyis $1/2$ -del. Ezzel ismét beláttuk azt, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}. \blacksquare$$

3. megoldás. Alkalmazhatjuk a következő ötletet is: szorozzuk meg a kiindulási törtet az $1 \equiv \frac{1+\cos x}{1+\cos x}$ kifejezéssel. Ekkor azt kapjuk, hogy

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 \cdot (1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x}$$

Így

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x} = 1^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}. \blacksquare$$