

Auswertung – Wahrscheinlicher

RICHTIG	Beim einmaligen Werfen einer Münze liegt "Kopf" oben. UND Begründung mit - Verweis auf die Wahrscheinlichkeiten beider Ereignisse oder - Vergleich der Anzahlen der möglichen Ergebnisse. [Anm.: Für p(Kopf) werden alle zu 1/2 wertgleichen Angaben akzeptiert, für p(6) alle Werte aus dem Intervall [0,15; 0,18].] Beispiel(e) • <i>Die Wahrscheinlichkeit eine Sechs zu würfeln beträgt $\frac{1}{6}$. Die Wahrscheinlichkeit, dass beim Münzwurf "Kopf" oben liegt, beträgt $\frac{1}{2}$.</i> • <i>In beiden Fällen ist nur ein Ergebnis günstig. Beim Würfel sind sechs Ergebnisse möglich, bei der Münze nur zwei. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu würfeln, kleiner als die Wahrscheinlichkeit für "Kopf".</i> • <i>(Grenzfall)</i> <i>Weil es beim Würfel sogar sechs mögliche Ergebnisse gibt.</i> <i>[Anm.: "Sogar" lässt vermuten, dass ein Vergleich der beiden Ergebnismengen stattgefunden hat und die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit von der Mächtigkeit des Ergebnisraums erkannt wurde.]</i> • <i>(Grenzfall)</i> <i>Weil es bei der Münze nur zwei Seiten gibt.</i>
FALSCH	Alle unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. Beispiel(e) • <i>Beim einmaligen Werfen einer Münze liegt "Kopf" oben.</i> <i>Begründung:</i> <i>Denn eine Sechs fällt nur ganz selten.</i> <i>[Anm.: Hier wird nur mit "Lebenserfahrung" argumentiert.]</i>