

1. On considère la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = xe^{-2x}$.

On note f'' la dérivée seconde de la fonction f .

Quel que soit le réel x , $f''(x)$ est égal à :

- a. $(1 - 2x)e^{-2x}$ b. $4(x - 1)e^{-2x}$ c. $4e^{-2x}$ d. $(x + 2)e^{-2x}$

$$\begin{aligned} f(x) = xe^{-2x} \text{ donc } f'(x) &= e^{-2x} + x \times (-2)e^{-2x} = (1 - 2x)e^{-2x} \text{ et donc} \\ f''(x) &= -2e^{-2x} + (1 - 2x) \times (-2)e^{-2x} = (-2 - 2 + 4x)e^{-2x} = 4(x - 1)e^{-2x} \end{aligned}$$

Réponse b.

2. Le code d'un immeuble est composé de 4 chiffres (qui peuvent être identiques) suivis de deux lettres distinctes parmi A, B et C (exemple : 1232BA). Le nombre de code différent possibles contenant au moins un 0 est de :

- a. 60 000 b. 20 634 c. 39 366 d. 6 000

Il y a $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 3 \times 2 = 60\,000$ codes possibles. (10 valeurs possibles pour chacun des chiffres et 3 valeurs possibles pour la première lettre et deux valeurs possible pour la deuxième car elles doivent être distinctes.)


Déterminons le nombre de code ne contenant pas de 0 :

Il y a $9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 3 \times 2 = 39\,366$ codes ne contenant pas de 0. (9 valeurs possibles pour chacun des chiffres et 3 valeurs possibles pour la première lettre et deux valeurs possible pour la deuxième car elles doivent être distinctes.)

Il y a donc $60\,000 - 39\,366 = 20\,634$ codes contenant au moins un zéro.

Réponse b.

3. On donne ci-dessous la représentation graphique de f' fonction dérivée d'une fonction f définie sur $[0; 7]$.



Le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0; 7]$ est :

a.

x	0	3,25	7
$f(x)$		↗ ↘	

b.

x	0	2	5	7
$f(x)$		↘ ↗ ↘		

c.

x	0	2	5	7
$f(x)$		↗ ↘ ↗		

d.

x	0	2	7
$f(x)$		↗ ↘	

f' est négative ou nulle sur $[0, 2]$ donc la fonction f est décroissante sur $[0, 2]$.
 f' est positive ou nulle sur $[2, 5]$ donc la fonction f est croissante sur $[2, 5]$.
 f' est négative ou nulle sur $[5, 7]$ donc la fonction f est décroissante sur $[5, 7]$.

Réponse b.

4. Une entreprise fabrique des cartes à puces. Chaque puce peut présenter deux défauts notés A et B. Une étude statistique montre que 2,8% des puces ont le défaut A, 2,2% des puces ont le défaut B et, heureusement, 95,4% des puces n'ont aucun des deux défauts.

La probabilité qu'une puce prélevée au hasard ait les deux défauts est :

- a. 0,05 b. 0,004 c. 0,046 d. On ne peut pas le savoir

On appelle A l'événement « la puce a le défaut A » et B l'événement « la puce a le défaut B ».

D'après le texte, on a : $P(A) = 0,028$ et $P(B) = 0,022$.

On cherche la probabilité qu'une puce ait les deux défauts, c'est-à-dire $P(A \cap B)$.

On sait que 95,4% des puces n'ont aucun des deux défauts donc il y a $100 - 95,4 = 4,6\%$ des puces qui ont au moins un des deux défauts, donc $P(A \cup B) = 0,046$.

Or $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ donc

$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,028 + 0,022 - 0,046 = 0,004$

Réponse b.

5. On se donne une fonction f , supposée dérivable sur \mathbb{R} , et on note f' sa fonction dérivée.

On donne ci-dessous le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$

D'après ce tableau de variation :

- a. f' est positive sur \mathbb{R} . b. f' est positive sur $] -\infty ; -1]$.
c. f' est négative sur \mathbb{R} . d. f' est positive sur $[-1 ; +\infty[$.

La fonction f est croissante sur $] -\infty ; -1]$ donc f' est positive sur $] -\infty ; -1]$.

Réponse b.