

Rédaction et technique de dérivation

Exercice 1

Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes sur le domaine d'étude précisé :

1. $f_1(x) = 3x^{-4} + 5 - 2x$ sur $D_1 = \mathbb{R}^*$
2. $f_2(x) = x\sqrt{x}$ sur $D_2 = \mathbb{R}_+^*$
3. $f_3(x) = \frac{3x+1}{x+2}$ sur $D_3 = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
4. $f_4(x) = \cos(4x-3)$ sur $D_4 = \mathbb{R}$
5. $f_5(x) = (1-x)^4$ sur $D_5 = \mathbb{R}$

Exercice 2

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition, de dérivabilité puis la fonction dérivée.

1. $f : x \mapsto (3x+7)^5$
2. $g : x \mapsto \frac{2}{(5x+3)^3}$
3. $h : x \mapsto \sqrt{x+4}$
4. $k : x \mapsto e^{3x+1}$
5. $j : x \mapsto \sin(2x-5)$

Exercice 3

Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

1. f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = (3x-1)(x^2+5)$
2. g définie sur \mathbb{R} par : $g(x) = (x+1)e^x$
3. h définie sur \mathbb{R} par : $h(x) = \frac{2x}{x^2+3}$
4. i définie sur \mathbb{R} par : $i(x) = (3x^2-2x+1)^2$

Exercice 4

Déterminer le sens de variation de chacune des fonctions de l'exercice précédent.

Dérivées secondes

Exercice 5

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 7x + 4$

1. Déterminer la dérivée première $f'(x)$ de la fonction f .
2. En déduire l'expression de la dérivée seconde $f''(x)$.

Exercice 6

Pour chaque fonction ci-dessous, déterminer les fonctions dérivées et dérivées secondes.

1. $f_1(x) = 3x^3 + 4x^2 + 2x - 1$
2. $f_2(x) = e^x(4x^2 + 3x - 2)$
3. $f_3(x) = \sin(5x + 2)$
4. $f_4(x) = e^{4x+2}$
5. $f_5(x) = \cos(4x + 5)$

Fonctions composées

Exercice 7

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

1. f est de la forme \sqrt{u} . Donner l'expression de la fonction u .
2. (a) Donner l'expression $(\sqrt{u})'$ en fonction de u et u' .
(b) Calculer $u'(x)$, puis $f'(x)$.

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = e^{x^2+1}$.

1. f est de la forme e^u . Donner l'expression de la fonction u .
2. (a) Donner l'expression $(e^u)'$ en fonction de u et u' .
(b) Calculer $u'(x)$, puis $f'(x)$.

Exercice 9

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = (e^x+1)^2$. Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = 2e^x(e^x+1)$.

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{1}{(x^2+1)^3}$.

1. f est de la forme u^n avec $n = -3$. Donner l'expression de u .
2. Donner l'expression de $(u^{-3})'$ en fonction de u et u' .
3. Calculer $u'(x)$ puis $f'(x)$.

Exercice 11

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition, de dérivabilité puis la fonction dérivée.

1. $f : x \mapsto (3x^3+7)^8$
2. $g : x \mapsto \frac{1}{(2x-1)^4}$
3. $h : x \mapsto \sqrt{x^2+4}$
4. $k : x \mapsto e^{3x^2-6x+1}$
5. $j : x \mapsto \sin(2x-5)$

Exercice 12

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

$$1. f_1(x) = \frac{1}{(x^2 + x + 1)^3}$$

$$2. f_2(x) = 3(1 - x)^3$$

$$3. f_3(x) = x\sqrt{x^2 + 4}$$

$$4. f_4(x) = e^{(4x^2 + 2x + 1)^3}$$

$$5. f_5(x) = \sqrt{e^{(3x^2 - 4x - 5)^5}}$$

Exercice 13

Calculer $f'(x)$ puis $f''(x)$.

$$1. f(x) = \frac{1}{x+1}$$


$$2. f(x) = \frac{1}{(1+x)^3}$$

$$3. f(x) = (2-3x)e^{1-x}$$

Exercice 14

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = xe^{x^2}$.

Sur la figure ci-dessous, on a représenté la courbe \mathcal{C}_f représentative de f ainsi que ces tangentes d_1 et d_2 aux points A et B d'abscisses respectives -1 et 1 .



Les tangentes d_1 et d_2 sont-elles parallèles ? Justifier.

Exercice 15

Déterminer les fonctions dérivées de :

$$1. f \text{ définie sur }]-1; +\infty[\text{ par } f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

$$2. g \text{ définie sur } \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\} \text{ par } g(x) = \frac{(2x+1)^3}{4x+1}$$

$$3. h \text{ définie sur } [2; +\infty[\text{ par } h(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}$$

$$4. k \text{ définie sur } \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{5}\} \text{ par } k(x) = \left(\frac{4x-3}{5x-2}\right)^3 \frac{x-2}{x+1}$$

$$5. j \text{ définie sur } \mathbb{R} \setminus \{-1\} \text{ par } g(x) = e^{x+1}$$

Étude de fonctions**Exercice 16**

Soit la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3e^{-x}$.

$$1. \text{ Montrer que, pour tout } x \in \mathbb{R}, f'(x) = x^2e^{-x}(2-x)$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$.

3. En déduire les variations de f .

Exercice 17

L'objectif est d'étudier les variations de la fonction f sur \mathbb{R} par : $f(x) = (x-1)e^x + x$.

1. Déterminer la fonction f' dérivée de la fonction f .

2. (a) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = e^x(1+x)$.

(b) Étudier le signe de $f''(x)$.


(c) En déduire les variations de la fonction f' .

3. Déterminer le signe de $f'(x)$.

4. En s'intéressant au minimum de f' , conclure sur les variations de la fonction f .

Exercice 18

Le point P appartient au quart de cercle de centre O , de rayon 4 et d'extrémités A et B .



On construit le rectangle $OMPN$ où M appartient à $[OA]$ et N à $[OB]$. On pose $x = OM$.

1. À quel intervalle I appartient x ?

2. Montrer que l'aire de $OMPN$ est $f(x) = x\sqrt{16-x^2}$.

3. Montrer que $f'(x) = \frac{16-2x^2}{\sqrt{16-x^2}}$ et étudier les variations de la fonction f sur I .

4. En déduire la position du point P pour que le rectangle $OMPN$ ait une aire maximale.

Exercice supplémentaire**Exercice 19**

En sciences physiques, une différentielle est une dérivée par rapport à une variable donnée. Pour chacune des formules suivantes, calculer les différentielles données. On sera parfois amené à exprimer les grandeurs physiques en fonction des autres. Toutes les grandeurs sont positives.

1. Calculer $\frac{dA}{db}$ puis $\frac{dA}{dh}$ avec $A = \frac{b \times h}{2}$

2. Calculer $\frac{dW}{dI}$ puis $\frac{dP}{dI}$ avec $W = RI^2t$

3. Calculer $\frac{dl}{dt}$ puis $\frac{dt}{dl}$ avec $l = l_0(1 + \alpha t)$

4. Calculer $\frac{dW}{dr}$, $\frac{dv}{dW}$ puis $\frac{dr}{dW}$ avec $W = \frac{1}{2}rv^2$

5. Calculer $\frac{dC}{dv}$ avec $C = \varepsilon \frac{S}{d-v}$