

TD - Chapitre 5 - EDS Maths - 1ère

E.1 On considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est définie par : $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$

1 a) Etablir l'égalité : $f(x) = 2 \cdot (x-3)(x-1)$

b) Résoudre l'équation : $f(x) = 0$.

c) Résoudre l'inéquation : $f(x) \leq 0$.

2 a) Etablir l'égalité : $f(x) + 2 = 2(x-2)^2$

b) En déduire que, pour tout nombre x réel, on a : $f(x) \geq -2$

E.2 On considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est définie par : $f(x) = -4x^2 + 36x + 63$

1 a) Etablir l'égalité : $f(x) = (21-2x)(2x+3)$

b) Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation : $f(x) = 0$.

c) Résoudre l'inéquation : $f(x) > 0$

2 a) Etablir l'égalité : $f(x) - 144 = -4 \cdot \left(x - \frac{9}{2}\right)^2$.

b) En déduire que, pour tout nombre x réel, on a : $f(x) \leq 144$

E.3

Définition : le **discriminant** d'un polynôme $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ du second degré est un nombre qui se calcule à l'aide des coefficients du polynôme : $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

Compléter le tableau ci-dessous pour chacun des polynômes du second degré :

	a	b	c	$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$
$2x^2 + 5x + 1$				
$-x^2 + 7x + 3$				
$x^2 - 5x + 4$				
$2x^2 - 4x - 1$				
$-x^2 - x - 1$				
$x^2 + 7$				

E.4 Déterminer le discriminant de chacun des polynômes du second degré ci-dessous :

a) $3 \cdot x^2 + 5 \cdot x + 2$ b) $-x^2 - 3 \cdot x + 2$ c) $2 \cdot x^2 - \frac{1}{3} \cdot x + 1$

E.5 Déterminer le discriminant des polynômes du second degré ci-dessous :

a) $-2x^2 + 2x + 1$ b) $x^2 - x - 1$ c) $3x^2 + x - 2$

E.6

Définition : les racines d'un polynôme sont les valeurs annulant ce polynôme.

Proposition : pour un polynôme $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ du second degré, le nombre de racines existantes dépend du discriminant :

$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
Aucune racine	1 racine $-\frac{b}{2 \cdot a}$	2 racines $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} ; \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$

Déterminer les racines des polynômes ci-dessous :

a) $x^2 + 4x - 5$

b) $x^2 + x + 1$

c) $2x^2 - 13x + 15$

d) $3x^2 - 6x + 3$

E.7 Déterminer les racines des polynômes ci-dessous :

a) $2x^2 - 3x - 2$

b) $-4x^2 + 12x - 9$

c) $3x^2 - 4x + 2$

E.8 Déterminer les racines des polynômes ci-dessous :

a) $3x^2 - 5x + 6$

b) $3x^2 - 24x + 48$

c) $-2 \cdot x^2 + x + 6$

E.9 Déterminer les racines des polynômes suivants :

a) $x^2 + 2x - 15$

b) $3x^2 - 5x + 7$

E.10 Déterminer les racines des polynômes suivants :

a) $3x^2 - 24x + 48$

b) $-4 \cdot x^2 - x + 3$

E.11 Déterminer les racines des polynômes du second degré suivants :

a) $-2 \cdot x^2 - 5 \cdot x - 3$

b) $2 \cdot x^2 + 5 \cdot x + 2$

E.12 Déterminer les racines des polynômes du second degré suivants :

a) $x^2 + x - 2$

b) $3 \cdot x^2 + 4 \cdot x + 2$

E.13 Déterminer les racines des polynômes ci-dessous :

a) $\frac{2}{3} \cdot x^2 + x - 3$ b) $-2 \cdot x^2 - \frac{11}{3} \cdot x - 1$ c) $3 \cdot x^2 - 3 \cdot x + \frac{2}{3}$

E.14 Résoudre les équations suivantes :

a) $\frac{2}{7} \cdot x^2 - \frac{5}{3} \cdot x - \frac{7}{3} = 0$ b) $-\frac{1}{2} \cdot x^2 - \frac{4}{5} \cdot x + \frac{2}{5} = 0$

E.15 Parmi les quatre propositions ci-dessous, laquelle est correcte?

L'équation $-\frac{x^3}{3} + x^2 + 3 \cdot x = 0$ admet sur \mathbb{R} :

a) la solution est -2

b) trois solutions distinctes

c) aucune solution

d) une unique solution

E.16 Déterminer les racines des polynômes du second degré :

a) $x^2 - 3x + 1$

b) $5x^2 + 5x + 1$

E.17 Déterminer les racines des polynômes du second degré :

a) $x^2 - 7x + 9$

b) $-2x^2 - 3x + 1$

E.18 Déterminer les racines des polynômes :


(a) $-3x^2 + 6x + 1$ (b) $4x^2 - 6x + 1$

Indication : pensez à simplifier le radical

E.19 Résoudre l'équation : $\frac{x-1}{x+1} = 1 - 2x$


E.20 Résoudre l'équation : $\frac{2x-1}{2x+1} = 1 - x$

E.21 On considère le rectangle ci-dessous ayant pour dimension 6 cm et 3 cm . A l'intérieur de ce rectangle, on construit le carré $ABCD$ et le rectangle $CEFG$ dont les côtés sont parallèles au rectangle les contenant.



On note x la longueur du segment $[AB]$. Déterminer s'il est possible que la partie hachurée de cette figure ait une aire de 8 cm^2 .

E.22



On considère un carré $ABCD$ de 10 centimètres de côté; un point I appartient à la diagonale $[AC]$, il est repéré comme l'indique la figure ci-dessous par la longueur x :

A partir de ce point I , on construit deux carrés de diagonale respectives $[AI]$ et $[IC]$.

Déterminer la valeur de x pour laquelle la somme des aires de ces deux carrés vaut les $\frac{5}{8}$ de l'aire du carré $ABCD$.

E.23

1 Résoudre l'équation : $x^2 - \frac{37}{2}x + 85 = 0$

2 On considère un rectangle ayant 37 m pour périmètre et 85 m^2 pour aire. On notera respectivement L et ℓ , la longueur et la largeur de ce rectangle.

(a) Exprimer ℓ en fonction de L .

(b) Déterminer les dimensions de ce rectangle.

E.24 Un rectangle a pour périmètre 19 m et pour aire 12 m^2 .

Déterminer les dimensions de ce rectangle.

E.25

La factorisation d'un polynôme $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ du second degré dépend de la valeur de son discriminant :

$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
Aucune factorisation	$a \cdot \left(x + \frac{b}{2 \cdot a}\right)^2$	$a \cdot (x - \alpha)(x - \beta)$ où α et β sont les deux racines du polynôme

Factoriser, si possible, les expressions suivantes :

(a) $x^2 - 3x + 2$

(b) $-2x^2 - 2x + 4$

(c) $-x^2 + 2x - 1$

(d) $4x^2 + x + 3$

E.26 Donner la forme factorisée des expressions suivantes :

(a) $3x^2 - 3x - 6$

(b) $2x^2 + 12x + 18$

E.27 Factoriser, si possible, les polynômes du second degré ci-dessous :

(a) $x^2 + 2x + 1$

(b) $3x^2 - 4x + 2$

(c) $-3x^2 + 4x - 1$

Indication : présenter les résultats sous la forme :

$(a \cdot x + b)(c \cdot x + d)$ ou $(a \cdot x + b)^2$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

E.28 Factoriser, si possible, les expressions suivantes :

(a) $8x^2 - 24x + 18$

(b) $3x^2 + x + 1$

(c) $-4x^2 + x + 3$

Indication : présenter les résultats sous la forme :

$(a \cdot x + b)(c \cdot x + d)$ ou $(a \cdot x + b)^2$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

E.29

1 Factoriser l'expression : $-2x^2 - 3x + 5$.

2 Pour chaque proposition, une seule réponse est correcte. Cochez la case correspondant.

Indication : on utilisera le résultat de la question 1

(a) La forme de factorisée de $-x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$ est :

☐ $(x + 5)(1 - x)$ ☐ $\left(x + \frac{5}{2}\right)(1 - x)$

☐ $(x + 5)\left(1 - \frac{1}{2}x\right)$ ☐ $\left(x + \frac{5}{2}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x\right)$

(b) La forme de factorisée de $-2x^2 - 3x + 5 + (1 - x)$ est :

☐ $(2x + 5)(1 - x)$ ☐ $(2x + 5) \cdot x$

☐ $(2x + 6)(1 - x)$ ☐ $(2x + 6)(2 - x)$

(c) La forme de factorisée de $-2 \cdot (x + 1)^2 - 3 \cdot (x + 1) + 5$ est :

☐ $(2x + 6)(1 - x)$ ☐ $(2x + 6)(2 - x)$

☐ $-(2x + 7) \cdot x$ ☐ $(2x + 7)(2 - x)$

E.30

Le tableau de signes d'un polynôme du second degré dépend du signe du coefficient du terme du second degré et du signe du discriminant.

Les six possibilités sont représentées ci-dessous :

	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$ α et β sont les deux racines
$a > 0$	<div> <div>Signe a</div> <div> $-\infty$ $+\infty$ </div> <div> $+$ </div> </div>	<div> <div>Signe a</div> <div> $-\infty$ $-b/2a$ $+\infty$ </div> <div> $+$ 0 $+$ </div> </div>	<div> <div>Signe a</div> <div> $-\infty$ α β $+\infty$ </div> <div> $+$ 0 $-$ 0 $+$ </div> </div>
$a < 0$	<div> <div>Signe a</div> <div> $-\infty$ $+\infty$ </div> <div> $-$ </div> </div>	<div> <div>Signe a</div> <div> $-\infty$ $-b/2a$ $+\infty$ </div> <div> $-$ 0 $-$ </div> </div>	<div> <div>Signe a</div> <div> $-\infty$ α β $+\infty$ </div> <div> $-$ 0 $+$ 0 $-$ </div> </div>

Etablir le tableau de signes des polynômes du second degré suivant :

- (a) $x^2 + 3x + 4$ (b) $4x^2 + 3x - 10$ (c) $4x^2 - 16x + 16$

E.31 Etablir le tableau de signes des expressions suivantes :

- (a) $3x^2 + 4x - 4$ (b) $-4x^2 + 2x + 6$

E.32 Dresser le tableau de signes de chacune des expressions ci-dessous :

- (a) $2x^2 + 9x + 10$ (b) $12x^2 - 31x + 20$ (c) $-5x^2 - 3x - 1$

E.33 Résoudre les inéquations suivantes :

- (a) $x^2 - x - 2 < 0$ (b) $-9x^2 + 12x - 4 \leq 0$

E.34 Résoudre les inéquations suivantes :

- (a) $-4x^2 + 2x + 2 \geq 0$ (b) $3x^2 + x + 1 < 0$

E.35 Résoudre les inéquations :

- (a) $6x^2 + x - 1 \geq 0$ (b) $-x^2 + x - 3 > 0$


E.36 Résoudre les inéquations suivantes :

- (a) $-10x^2 - 13x + 3 \geq 0$ (b) $(3x + 1)(x^2 + x + 1) < 0$

E.37 On considère les deux fonctions f et g définies sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = x^2 - 6x + 7 \quad ; \quad g(x) = 2x^2 - 2x + 2$$

Dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O; I; J)$, on donne les courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g représentatives respectivement des fonctions f et g .




Déterminer la position relative des courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g .

E.38

On considère la figure ci-contre où $ABCD$ est un carré dont les côtés mesurent 5 cm .

On considère un point M sur le segment $[AB]$ et on place le point P sur le segment $[AD]$ et les points N et Q afin que $AMNP$ soit un carré et $BCQM$ est un rectangle.



On note x la mesure du segment $[AM]$. Déterminer l'ensemble des valeurs de x afin que l'aire du carré $AMNP$ soit strictement supérieure à l'aire du rectangle $BCQM$.

E.39

1 Etude théorique :

On admet que pour un trinôme $ax^2 + bx + c$ du second degré dont le discriminant Δ est strictement positif, ces deux racines s'expriment sous la forme :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad ; \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- (a) Montrer que la somme des racines vaut $-\frac{b}{a}$.
(b) Montrer que le produit des racines vaut $\frac{c}{a}$.

2 Application :

En utilisant les propriétés établies à la question précédente, répondre aux questions suivantes :

- (a) On considère le polynôme $2x^2 + 4x - 16$. Après avoir vérifié que 2 est une racine de ce polynôme, déterminer la valeur de l'autre racine.
(b) Déterminer un trinôme du second degré admettant deux racines dont la somme des racines vaut 3 et le produit des racines vaut -10 .