

Calcul de produits scalaires

Exercice 1



Soit A, B et C trois points de l'espace tels que :

$$AB = 8, \quad AC = 7 \quad \text{et} \quad \widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}.$$

Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 2



Soit A, B et C trois points de l'espace tels que :


$$AB = 5, \quad AC = 16 \quad \text{et} \quad \widehat{BAC} = \frac{5\pi}{6}.$$

Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 3



On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ tel que $AB = 4, AE = 2$ et $AD = 3$.



Déterminer les produits scalaires suivants :

- | | | |
|---|---|---|
| (a) $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BF}$ | (c) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$ | (e) $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{GH}$ |
| (b) $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{HD}$ | (d) $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{HE}$ | (f) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$ |

Exercice 4



Soit \vec{u}, \vec{v} et \vec{w} trois vecteurs de l'espace tels que

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \quad \text{et} \quad \vec{u} \cdot \vec{w} = -3.$$

Déterminer les produits scalaires suivants :

- (a) $\vec{v} \cdot (7\vec{u})$;
 (b) $\vec{v} \cdot \vec{u}$;
 (c) $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w})$.

Exercice 5



Soit \vec{u}, \vec{v} et \vec{w} trois vecteurs de l'espace tels que :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -9 \quad \text{et} \quad \vec{u} \cdot \vec{w} = 6.$$

- Déterminer le produit scalaire $\vec{u} \cdot (2\vec{v} + 3\vec{w})$.
- Que peut-on en déduire pour les vecteurs \vec{u} et $2\vec{v} + 3\vec{w}$?

Exercice 6



Soit A, B, C et D quatre points tels que :


$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 5.$$

- Exprimer \overrightarrow{BD} en fonction de \overrightarrow{BA} et \overrightarrow{AD} .
- En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 7



$ABCDEFGH$ est un cube de côté a . I est le centre du carré $EFGH$ et J le centre du carré $BCGF$.



- Calculer les produits scalaires suivants :

(a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$ | (b) $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{HF}$ | (c) $\overrightarrow{BJ} \cdot \overrightarrow{CG}$

- (a) Démontrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$.

- (b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{IJ}$.


Exercice 8



$SABCD$ est une pyramide de base carrée $ABCD$ et de sommet S , telle que les faces SAB, SBC, SDC et SDA sont des triangles équilatéraux. H est le centre du carré $ABCD$ et I est le milieu de $[BC]$. On pose $AB = a$.

- Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB}$.
- Que représente le point H dans le triangle SAC ?
- Calculer les produits scalaires suivants :


(a) $\overrightarrow{SH} \cdot \overrightarrow{AC}$ | (c) $\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{SA}$
 (b) $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{DB}$ | (d) $\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{DH}$



Exercice 9



$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle tel que $AE = AD = a$ et $AB = 3a$. Calculer les produits scalaires suivants :




(a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$ | (c) $\overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{HF}$
 (b) $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CG}$ | (d) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG}$

Exercice 10



$ABCDEFGH$ est un cube de côté a . Le point I est le centre de la face $DCGH$ et J est le milieu du segment $[AD]$.



- Exprimer les vecteurs \overrightarrow{AI} et \overrightarrow{BJ} en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ et \overrightarrow{AE} .
- (a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BJ}$.
 (b) Que peut-on en déduire pour les droites (AI) et (BJ) ?

Exercice 11

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Pour tous points A, B et C tels que $AB = 9$ et $AC = 7$, on a $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 63$ ou $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -63$.
2. Pour tous points A, B et C tels que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$ on a $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = -5$.

Exercice 12

$ABCDEFGH$ est un cube de côté a . On considère les points M et N définis par

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{AE} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}.$$

1. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$.
2. Que peut-on en déduire pour le triangle MAN ?

Exercice 13**Logique**

On considère \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs de l'espace. Soit l'énoncé : « Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$, alors \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires. »

1. Dire si cet énoncé est vrai ou faux. Justifier.
2. Énoncer la réciproque. Est-elle vraie ?

Produits scalaires dans un repère orthonormé**Exercice 14**

On considère deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} . Calculer dans chacun des cas suivants le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$:

- (a) $\vec{u}(-3; -1; 0)$ et $\vec{v}(2; 0; 5)$
- (b) $\vec{u}(1; -1; 3)$ et $\vec{v}(2; 3; -2)$

Exercice 15**Algorithme**

Compléter le script de la fonction `pro_scal` donné ci-contre afin que cette fonction Python retourne le produit scalaire des vecteurs \vec{u} et \vec{v} dont les coordonnées dans un repère orthonormé sont saisies dans les listes `u` et `v`.

```
def pro_scal(U,V):
    p=0
    for i in range(3):
        p=p+...
    return p
```

Exercice 16

Soit $\vec{u}(7; -1; 2)$ et $\vec{v}(-3; -11; 5)$ deux vecteurs de l'espace.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Que peut-on en déduire pour les vecteurs \vec{u} et \vec{v} ?

Exercice 17

Démontrer que les vecteurs de l'espace $\vec{u}(-4; 6; 9)$ et $\vec{v}(3; -7; 6)$ sont orthogonaux.

Exercice 18**Algorithme**

On considère le script de la fonction `orth` donné ci-dessous.

```
def orth(x1,y1,z1,x2,y2,z2):
    p=x1*x2+y1*y2+z1*z2
    return (p==0)
```

1. Que renvoie l'appel `orth(1,2,1,-1,1,-1)` ?
2. Que renvoie l'appel `orth(3,0,2,1,2,3)` ?
3. À quoi peut servir cette fonction ?

Exercice 19

Soit $A(2; 7; 1)$, $B(5; -1; 3)$ et $C(0; 4; -3)$ trois points.

1. Déterminer les coordonnées de \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .
2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 20

On considère les points $A(1; -3; 2)$, $B(8; -4; 5)$ et $C(2; 1; 1)$.

1. Justifier que \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} sont orthogonaux.
2. Que peut-on en déduire pour le triangle ABC ?

Exercice 21

On considère les points $A(4; 2; -3)$, $B(6; 4; 0)$, $C(7; 6; -2)$ et $D(5; 4; -5)$.

1. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
2. (a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.
(b) Que peut-on en déduire pour le parallélogramme $ABCD$?

Exercice 22

On considère les points $A(3; 2; 1)$, $B(10; 6; -1)$, $C(9; 8; -9)$ et $D(2; 4; -7)$.

1. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
2. (a) Démontrer que les vecteurs \overrightarrow{AC} et \overrightarrow{BD} sont orthogonaux.
(b) Que peut-on en déduire pour le parallélogramme $ABCD$?

Exercice 23

Soit $A(3; 5; -4)$, $B(1; -2; -1)$ et $C(6; -3; 0)$.

1. Quelle est la nature du triangle ABC ?
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 24

Soient $A(7; -2; -5)$, $B(5; 4; 4)$ et $C(5; 1; 1)$.

- Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
 - Calculer les longueurs AB et AC .
- En déduire une valeur approchée à 0,01 près de l'angle \widehat{BAC} en degrés.


Exercice 25

Soit $A(7; -5; 6)$, $B(0; -4; 3)$, $C(1; -3; 1)$ trois points de l'espace et J le milieu de $[AC]$.

- Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BJ}$.
 - Calculer les longueurs BC et BJ .
- Déterminer une valeur approchée à 0,01 près de l'angle \widehat{CBJ} en degrés.

Exercice 26

Soit $ABCDEFGH$ le parallélépipède rectangle ci-dessous, avec $AB = 2$, $AD = AE = 1$. Soit I , J et K les milieux respectifs de $[DE]$, $[DG]$ et $[EB]$.



On se place dans le repère $(D; \overrightarrow{DA}, \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DH})$.

- Démontrer que ce repère est orthonormé.
- Déterminer les coordonnées des vecteurs \overrightarrow{IJ} et \overrightarrow{IK} , puis calculer le produit scalaire $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK}$ et les longueurs IJ et IK .
 - En déduire une valeur approchée à 0,01 près de l'angle \widehat{JIK} en degrés.

Exercice 27

On considère un cube $ABCDEFGH$ dont les arêtes sont de longueur 1. L'espace est rapporté au repère orthonormé $(D; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DH})$. À tout réel x de l'intervalle $]0; 1[$, on associe le point M du segment $[DF]$ tel que $\overrightarrow{DM} = x \overrightarrow{DF}$.

- Justifier que $M(x; x; x)$.
- Existe-t-il une valeur de x telle que le triangle MEB soit rectangle en M ?

Formules de polarisation**Exercice 28**

- Rappeler l'expression de la norme d'un vecteur en fonction des coordonnées de ce vecteur.
- Dans chaque cas, calculer la norme de \vec{u} :
 - $\vec{u}(1; 2; 2)$
 - $\vec{u}(-2; -3; 6)$
 - $\vec{u}(9; 12; -8)$

Exercice 29

- Rappeler la formule de polarisation donnant le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ en fonction de $\|\vec{u} + \vec{v}\|$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
- En déduire le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ lorsque \vec{u} et \vec{v} sont deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 8$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$.

Exercice 30

Soit A, B et C trois points de l'espace tels que : $AB = 7$, $AC = 8$ et $BC = 5$.

- À l'aide d'une formule de polarisation démontrer que :

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (BC^2 - AB^2 - AC^2).$$
 - En déduire la valeur de $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$ puis celle de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- Déterminer une valeur approchée à 0,01° près de l'angle \widehat{BAC} en degrés.

Exercice 31

Soit A, B et C trois points de l'espace tels que $AB = 6$, $AC = 5$ et $BC = 8$.

- À l'aide d'une formule de polarisation déterminer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
 - En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.
- Déterminer une valeur approchée à 0,01° près de l'angle \widehat{ABC} en degrés.

Exercice 32**Logique**

Soit A, B, C et D quatre points de l'espace tels que $ABCD$ est un parallélogramme.

- À l'aide d'une formule de polarisation, démontrer que $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{4} (BD^2 - AC^2)$.
- Démontrer alors la propriété suivante :
 « Un parallélogramme est un rectangle si et seulement si ses diagonales sont de même longueur. »

Exercice 33

Soit A, B, C et D quatre points de l'espace tels que $ABCD$ est un parallélogramme. On suppose que $AC = 10$ et $BD = 4$. À l'aide d'une formule de polarisation, calculer le produit scalaire $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Orthogonalité de droites et de plans**Exercice 34**

Soit d la droite passant par le point $A(1; 1; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(7; 5; 3)$ et d' la droite passant par le point $B(4; 0; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{v}(-4; 5; 1)$.

- Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- En déduire que d et d' sont orthogonales.

Exercice 35

Soit $A(1; -2; 7)$, $B(3; -1; 10)$ et $C(-4; 5; 8)$ trois points.

- (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .
- (b) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- Que peut-on en déduire pour les droites (AB) et (AC) ?

Exercice 36

Soit $A(4; -2; 1)$ et $B(-1; 2; 2)$ deux points. Le plan \mathcal{P} passe par A et est dirigé par les vecteurs $\vec{v}(1; 1; 1)$ et $\vec{w}(1; 2; -3)$.

- Déterminer les coordonnées de \overrightarrow{AB} .
- (a) Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{w}$.
- (b) Que peut-on en déduire pour la droite (AB) et le plan \mathcal{P} ?

Exercice 37**Logique**

Soit d une droite de vecteur directeur \vec{u} , \mathcal{P} un plan et \vec{v} un vecteur non nul de la direction du plan \mathcal{P} .

- La proposition suivante est-elle vraie ? « Si d est perpendiculaire à \mathcal{P} alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. »
- (a) Énoncer la réciproque de la proposition précédente.
- (b) Cette réciproque est-elle vraie ?

Exercice 38

Soit les points $A(-5; -4; 9)$, $B(-4; -10; 12)$, $C(-3; -2; 10)$, $D(7; 1; -5)$ et $E(-5; 6; 9)$.

- Démontrer que les points A , B et C définissent un plan.
- Démontrer que les droites (AB) et (DE) sont orthogonales.
- Démontrer que la droite (DE) est orthogonale au plan (ABC) .

Exercice 39

Soit les points $A(7; -1; 8)$, $B(10; 3; 6)$, $C(1; -2; 6)$ et $D(-5; 2; 5)$.

Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales.

Exercice 40

Soit les points $M(2; 5; -3)$, $N(11; 8; -1)$, $R(1; -3; 7)$ et $S(2; -6; 7)$.

Démontrer que les droites (MN) et (RS) sont orthogonales.


Exercice 41

Soit les points $A(1; 1; 1)$, $B(3; 0; 0)$, $C(2; 1; 0)$, $D(8; -1; 3)$ et $E(12; 3; 7)$.

- Démontrer que les points A , B et C définissent un plan.
- Démontrer que la droite (DE) est orthogonale au plan (ABC) .

Exercice 42


Soit $ABCD$ un carré d'un plan \mathcal{P} . Δ est la perpendiculaire au plan \mathcal{P} passant par A , et E est un point quelconque de Δ .



- Justifier que les droites (DB) et (AC) sont perpendiculaires.
- En déduire que les droites (DB) et (EC) sont orthogonales.

Exercice 43


$ABCD$ est un tétraèdre régulier (chaque face est un triangle équilatéral) et I est le milieu du segment $[BC]$.



Démontrer que la droite (BC) est perpendiculaire au plan (IAD) .

Exercice 44

Soit ABC un triangle isocèle en A . On considère un point D non situé dans le plan (ABC) et tel que BCD soit isocèle en D . On note I le milieu de $[BC]$.




- Démontrer que la droite (BC) est perpendiculaire au plan (AID) .
- En déduire que les droites (BC) et (AD) sont orthogonales.

Exercice 45

$ABCDEF$ est un prisme droit, ses faces $ABED$, $ADFC$ et $BEFC$ étant des rectangles.

On considère le point H , pied de la hauteur issue de F dans le triangle DEF .



- (a) Démontrer que la droite (AD) est perpendiculaire au plan (DEF) .
- (b) En déduire que (FH) est perpendiculaire au plan (ABE) .
- Démontrer que les triangles FHA et FHB sont rectangles.