


## C.1



## C.2

- a) Les deux termes en  $x$  de l'expression " $x^2 - 4x + 1$ " s'obtiennent par le développement de l'identité remarquable :

$$(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 \implies x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$$

On en déduit l'expression de la forme canonique :

$$\begin{aligned}
 x^2 - 4x + 1 &= [x^2 - 4x] + 1 \\
 &= [(x-2)^2 - 4] + 1 \\
 &= (x-2)^2 - 3
 \end{aligned}$$

- b) Les deux termes en  $x$  de l'expression " $x^2 + 6x + 3$ " s'obtiennent par le développement de l'identité remarquable :

$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9 \implies x^2 + 6x = (x+3)^2 - 9$$

On en déduit l'expression de la forme canonique :

$$\begin{aligned}
 x^2 + 6x + 3 &= [x^2 + 6x] + 3 \\
 &= [(x+3)^2 - 9] + 3 \\
 &= (x+3)^2 - 6
 \end{aligned}$$

## C.3

- a)  $x^2 + 4x - 5 = [(x+2)^2 - 4] - 5 = (x+2)^2 - 9$   
 b)  $x^2 - 2x - 1 = [(x-1)^2 - 1] - 1 = (x-1)^2 - 2$

## C.4

- a)  $x^2 + 2x - 3 = [(x+1)^2 - 1] - 3 = (x+1)^2 - 4$   
 b)  $x^2 - 6x - 2 = [(x-3)^2 - 9] - 2 = (x-3)^2 - 11$   
 c)  $x^2 + 12x + 5 = [(x+6)^2 - 36] + 5 = (x+6)^2 - 31$   
 d)  $x^2 - 10x + 5 = [(x-5)^2 - 25] + 5 = (x-5)^2 - 20$

## C.5

- a)  $2x^2 + 12x - 4 = 2 \cdot (x^2 + 6x) - 4$   
 $= 2 \cdot [(x^2 + 6x + 9) - 9] - 4 = 2 \cdot [(x+3)^2 - 9] - 4$   
 $= 2 \cdot (x+3)^2 - 18 - 4 = 2 \cdot (x+3)^2 - 22$   
 b)  $3x^2 + 30x + 12 = 3 \cdot (x^2 + 10x) + 12$   
 $= 3 \cdot [(x^2 + 10x + 25) - 25] + 12 = 3 \cdot [(x+5)^2 - 25] + 12$   
 $= 3 \cdot (x+5)^2 - 75 + 12 = 3 \cdot (x+5)^2 - 63$

## C.6

- a)  $2x^2 + 8x - 6 = 2 \cdot (x^2 + 4x) - 6$   
 $= 2 \cdot [(x^2 + 4x + 4) - 4] - 6 = 2 \cdot [(x+2)^2 - 4] - 6$   
 $= 2 \cdot (x+2)^2 - 8 - 6 = 2 \cdot (x+2)^2 - 14$   
 b)  $3x^2 + 6x + 6 = 3 \cdot (x^2 + 2x) + 6$   
 $= 3 \cdot [(x^2 + 2x + 1) - 1] + 6 = 3 \cdot [(x+1)^2 - 1] + 6$   
 $= 3 \cdot (x+1)^2 - 3 + 6 = 3 \cdot (x+1)^2 + 3$   
 c)  $9x^2 + 18x + 27 = 9 \cdot (x^2 + 2x) + 27$   
 $= 9 \cdot [(x^2 + 2x + 1) - 1] + 27 = 9 \cdot [(x+1)^2 - 1] + 27$   
 $= 9 \cdot (x+1)^2 - 9 + 27 = 9 \cdot (x+1)^2 + 18$   
 d)  $5x^2 + 10x + 2 = 5 \cdot (x^2 + 2x) + 2$   
 $= 5 \cdot [(x^2 + 2x + 1) - 1] + 2 = 5 \cdot [(x+1)^2 - 1] + 2$   
 $= 5 \cdot (x+1)^2 - 5 + 2 = 5 \cdot (x+1)^2 - 3$

## C.7

- a)  $x^2 + x + 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$   
 b)  $x^2 - 3x - 1 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} - 1 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{13}{4}$   
 c)  $x^2 + \frac{1}{2}x - 3 = \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} - 3$   
 $= \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} - \frac{48}{16} = \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{49}{16}$   
 d)  $x^2 + x - \frac{1}{3} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3}$   
 $= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{7}{12}$

## C.8

- a)  $x^2 + \frac{1}{4}x + 1 = \left[\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{1}{64}\right] + 1 = \left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{63}{64}$   
 b)  $x^2 + x + 1 = \left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right] + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$

## C.9

- 1) Pour déterminer la forme canonique du polynôme  $P$ , on identifie les termes en  $x^2$  et en  $x$  avec l'identité remarquable :

$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9 \implies x^2 + 6x = (x+3)^2 - 9$$

On a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned}
 x^2 + 6x - 7 &= (x^2 + 6x) - 7 = [(x+3)^2 - 9] - 7 \\
 &= (x+3)^2 - 16
 \end{aligned}$$

- 2) Résolvons l'équation :



$$\begin{aligned}
 x^2 + 6x - 7 &= 0 \\
 [(x+3)^2 - 9] - 7 &= 0 \\
 (x+3)^2 - 16 &= 0 \\
 (x+3)^2 - 4^2 &= 0 \\
 [(x+3) + 4][(x+3) - 4] &= 0 \\
 (x+7)(x-1) &= 0
 \end{aligned}$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul :

$$\begin{array}{l|l}
 x+7=0 & x-1=0 \\
 x=-7 & x=1
 \end{array}$$

Ainsi, cette équation admet pour ensemble de solution :  $\mathcal{S} = \{-7; 1\}$

#### C.10

① La forme canonique du polynôme  $P$  est  $3 \cdot (x-2)^2 + 5$  car :

$$\begin{aligned}
 3 \cdot (x-2)^2 + 5 &= 3 \cdot (x^2 - 4x + 4) + 5 \\
 &= 3 \cdot x^2 - 12 \cdot x + 12 + 5 = 3 \cdot x^2 - 12 \cdot x + 17
 \end{aligned}$$

② Résolvons cette équation :

$$3 \cdot x^2 - 12 \cdot x + 17 = 8$$

$$3 \cdot (x-2)^2 + 5 = 8$$

$$3 \cdot (x-2)^2 = 8 - 5$$

$$3 \cdot (x-2)^2 = 3$$

$$(x-2)^2 = \frac{3}{3}$$

$$(x-2)^2 = 1$$

$$(x-2)^2 - 1^2 = 0$$

$$[(x-2) + 1][(x-2) - 1] = 0$$

$$(x-2+1)(x-2-1) = 0$$

$$(x-1)(x-3) = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul :

$$\begin{array}{l|l}
 x-1=0 & x-3=0 \\
 x=1 & x=3
 \end{array}$$

L'ensemble des solutions est :  $\mathcal{S} = \{1; 3\}$

#### C.11

① Proposons l'expression  $(x+2)^2 + 5$  pour forme canonique. Pour l'établir, nous allons développer :

$$(x+2)^2 + 5 = x^2 + 4 \cdot x + 4 + 5 = x^2 + 4 \cdot x + 9$$

② Résolvons l'équation :

$$x^2 + 4 \cdot x + 9 = 1$$

$$(x+2)^2 + 5 = 1$$

$$(x+2)^2 = 1 - 5$$

$$(x+2)^2 = -4$$

Un carré n'étant jamais strictement négatif, on en déduit que cette équation n'admet aucune solution.

#### C.12

① On a les transformations algébriques :

$$2x^2 + 4x - 16 = 2 \cdot (x^2 + 2x) - 16$$

On remarque que l'expression  $x^2 + 2x$  est le début du développement de l'identité remarquable  $(x+1)^2$ .

Cette remarque permet d'effectuer l'identification :

$$(x+1)^2 = x^2 + 2 \cdot x + 1 \implies x^2 + 2 \cdot x = (x+1)^2 - 1$$

On obtient ainsi, la forme canonique recherchée :

$$\begin{aligned}
 2x^2 + 4x - 16 &= 2 \cdot (x^2 + 2x) - 16 = 2 \cdot [(x+1)^2 - 1] - 16 \\
 &= 2 \cdot (x+1)^2 - 2 - 16 = 2 \cdot (x+1)^2 - 18
 \end{aligned}$$

② Résolvons l'équation (E) :

$$2x^2 + 4x + 4 = 20$$

$$2x^2 + 4x + 4 - 20 = 0$$

$$2x^2 + 4x - 16 = 0$$

D'après la question précédente, on a :

$$2 \cdot (x+1)^2 - 18 = 0$$

$$\frac{2 \cdot (x+1)^2 - 18}{2} = \frac{0}{2}$$

$$(x+1)^2 - \frac{18}{2} = 0$$

$$(x+1)^2 - 9 = 0$$

$$(x+1)^2 - 3^2 = 0$$

$$[(x+1) + 3][(x+1) - 3] = 0$$

$$(x+4)(x-2) = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul :

$$\begin{array}{l|l}
 x+4=0 & x-2=0 \\
 x=-4 & x=2
 \end{array}$$

On en déduit que l'ensemble des solutions de cette équation sont :

$$\mathcal{S} = \{-4; 2\}.$$

#### C.13

a) On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \times 2} = -2$$

$$\bullet f(-2) = 2 \times (-2)^2 + 8 \times (-2) + 1 = 8 - 16 + 1 = -7$$

Le fonction  $f$  a un coefficient du second degré positif.

On a le tableau de variations suivant :

$x$	$-\infty$	$-2$	$+\infty$
Variation de $f$	$+\infty$	$-7$	$+\infty$

La fonction  $f$  admet un minimum atteint en  $-2$  et dont la valeur est  $-7$ .

b) On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times (-1)} = -\frac{2}{-2} = 1$$

$$\bullet g(1) = -1^2 + 2 \times 1 + 1 = -1 + 2 + 1 = 2$$

Le fonction  $g$  a un coefficient du second degré négatif.

On a le tableau de variations suivant :



$x$	$-\infty$	1	$+\infty$
Variation de $g$	$-\infty$	2	$-\infty$

La fonction  $g$  admet un maximum atteint en 1 et dont la valeur est 2.

#### C.14

(1) On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{9}{2 \times (-3)} = -\frac{9}{-6} = \frac{3}{2}$$

$$\bullet f\left(\frac{3}{2}\right) = -3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 9 \times \frac{3}{2} - 2 = -3 \times \frac{9}{4} + \frac{27}{2} - 2 = \frac{-27 + 54 - 8}{4} = \frac{19}{4}$$

La fonction  $f$  a un coefficient du second degré négatif. On a le tableau de variations suivant :

$x$	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
Variation de $f$	$-\infty$	$\frac{19}{4}$	$-\infty$

La fonction  $f$  admet un maximum atteint en  $\frac{3}{2}$  et dont la valeur est  $\frac{19}{4}$ .

(2) On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times 3} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$\bullet g\left(-\frac{1}{3}\right) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) + 2 = 3 \times \frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 2 = \frac{1 - 2 + 6}{3} = \frac{5}{3}$$

La fonction  $g$  a un coefficient du second degré positif. On a le tableau de variations suivant :

$x$	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
Variation de $g$	$+\infty$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$

La fonction  $g$  admet un minimum atteint en  $-\frac{1}{3}$  et dont la valeur est  $\frac{5}{3}$ .

#### C.15

(1) On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{\frac{1}{4}}{2 \times \frac{1}{6}} = -\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = -\frac{1}{4} \times \frac{3}{1} = -\frac{3}{4}$$

$$\bullet f\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \left(-\frac{3}{4}\right) + 1 = \frac{1}{6} \times \frac{9}{16} - \frac{3}{16} + 1 = \frac{3}{32} - \frac{6}{32} + \frac{32}{32} = \frac{29}{32}$$

Le fonction  $f$  a un coefficient du second degré positif. On a le tableau de variations suivant :

$x$	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	$+\infty$
Variation de $f$	$+\infty$	$\frac{29}{32}$	$+\infty$

La fonction  $f$  admet un minimum atteint en  $-\frac{3}{4}$  et dont la valeur est  $\frac{29}{32}$ .

(2) On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{2\sqrt{3}}{2 \times (-1)} = \sqrt{3}$$

$$\bullet g(\sqrt{3}) = -(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} - 1 = -3 + 6 - 1 = 2$$

Le fonction  $g$  a un coefficient du second degré négatif. On a le tableau de variations suivant :

$x$	$-\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$
Variation de $g$	$-\infty$	2	$-\infty$

La fonction  $g$  admet un maximum atteint en  $\sqrt{3}$  et dont la valeur est 2.

#### C.16

(1) La courbe  $\mathcal{C}_f$  passe par le point de coordonnées  $A(-2; -12)$ . Ceci permet d'affirmer que l'image de  $-2$  par la fonction  $f$  a pour valeur  $-12$  :

$$f(-2) = -12$$

$$a \times (-2)^2 + 3 \times (-2) + 2 = -12$$

$$4a - 6 + 2 = -12$$

$$4a - 4 = -12$$

$$4a = -12 + 4$$

$$4a = -8$$

$$a = \frac{-8}{4}$$

$$a = -2$$

Ainsi,  $f$  a pour expression :  $f(x) = -2x^2 + 3x + 2$

(2) Le sommet d'une parabole a pour coordonnées :

$$S\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

Par identification des abscisses du sommet de cette parabole, on obtient la relation :



$$\frac{-b}{2a} = 1$$

$$\frac{-b}{2 \times 3} = 1$$

$$-b = 1 \times 6$$

$$-b = 6$$

$$b = -6$$

L'expression de la fonction  $g$  est :  $g(x) = 3x^2 - 6x + 1$

**C.17**

1 a On a l'égalité suivante :

$$\mathcal{L} = 100$$

$$2x + y + 12 = 100$$

$$y = 100 - 2x - 12$$

$$y = 88 - 2x$$

b  $y$  représentant un nombre positif, on a les inégalités suivantes :

$$y > 0$$

$$88 - 2x > 0$$

$$-2x > -88$$

$$x < \frac{-88}{-2}$$

$$x < 44$$

2 L'aire de jeu est un rectangle de dimensions  $x$  et  $y$ , ainsi son aire a pour valeur :

$$\mathcal{A}(x) = x \times y = x \cdot (88 - 2x) = 88 \cdot x - 2 \cdot x^2$$

L'expression définissant la fonction  $\mathcal{A}$  est un polynôme du second degré admettant les deux valeurs suivantes particulières :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{88}{2 \times (-2)} = \frac{88}{4} = 22$$

$$\bullet \mathcal{A}(22) = 88 \times 22 - 2 \times 22^2 = 1936 - 2 \times 484 = 1936 - 968 = 968$$

Le coefficient du terme du second degré est négatif, on obtient le tableau de variations suivant :

$x$	0	22	44
Variation de $\mathcal{A}$	0	968	0

D'après le tableau de variations de la question précédente, on en déduit que la valeur maximale de l'aire est réalisée pour  $x = 22$ ; alors  $y$  a pour valeur :

$$y = 88 - 2 \times 22 = 88 - 44 = 44$$

L'aire de jeu est un rectangle dont la longueur 44 m et de largeur 22 m.

**C.18**

1 La longueur de la clôture s'exprime en fonction de  $x$  et de  $y$  par :

$$(x - 2) + y + x + (y - 5) = 17$$

$$2 \cdot x + 2 \cdot y - 7 = 17$$

$$2 \cdot (x + y) = 17 + 7$$

$$x + y = \frac{24}{2}$$

$$x + y = 12$$

2 De l'égalité précédente, on obtient l'expression de  $y$  en fonction de  $x$  :

$$x + y = 12$$

$$y = 12 - x$$

Pour obtenir l'aire de l'espace extérieur, on effectue la soustraction de l'aire du grand rectangle par l'aire du petit rectangle :

$$\mathcal{A} = x \cdot y - 5 \times 2 = x \cdot (12 - x) - 10 = -x^2 + 12 \cdot x - 10$$

3 La fonction  $\mathcal{A}$  est une expression du second degré. On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2 \times (-1)} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\bullet \mathcal{A}(6) = -6^2 + 12 \times 6 - 10 = -36 + 72 - 10 = 26$$

Le coefficient du terme du second degré de l'expression de  $\mathcal{A}$  est négatif. On a le tableau de variations ci-dessous :

$x$	$-\infty$	6	$+\infty$
Variation de $\mathcal{A}$	$-\infty$	26	$-\infty$

4 Le tableau de variations ci-dessus indique que l'aire de la partie extérieure est maximale pour  $x = 6$ . On en déduit la valeur de  $y$  :

$$x + y = 12$$

$$6 + y = 12$$

$$y = 12 - 6$$

$$y = 6$$

La surface du champ a pour mesure alors 26 m<sup>2</sup>.

**C.19** Notons  $x$  la mesure du segment  $[AM]$ . Ainsi, le segment  $[MB]$  a pour mesure  $1 - x$ . Les deux disques  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  ont respectivement pour aire :

$$\mathcal{A}_1 = \pi \times \left(\frac{x}{2}\right)^2 ; \quad \mathcal{A}_2 = \pi \times \left(\frac{1-x}{2}\right)^2$$

Notons  $f$  la fonction qui à  $x$ , la longueur du segment  $[AM]$ , associe la somme des aires des disques  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ . La fonction  $f$  a pour expression :

$$f(x) = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \pi \times \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \pi \times \left(\frac{1-x}{2}\right)^2$$

Ainsi, la fonction  $f$  a pour expression :

$$\begin{aligned} f(x) &= \pi \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \pi \cdot \left(\frac{1-x}{2}\right)^2 = \pi \cdot \frac{x^2}{4} + \pi \cdot \frac{1 - 2 \cdot x + x^2}{4} \\ &= \frac{1}{4} \cdot (\pi \cdot x^2 + \pi - 2\pi \cdot x + \pi \cdot x^2) = \frac{\pi}{2} \cdot x^2 - \frac{\pi}{2} \cdot x + \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Ainsi, la fonction  $f$  est un polynôme du second degré ayant un coefficient du second degré strictement positif. La fonction  $f$  admet un minimum atteint en :

$$-\frac{b}{2a} = -\frac{-\frac{\pi}{2}}{2 \times \frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{\pi} = \frac{1}{2}$$

L'image de  $\frac{1}{2}$  par la fonction  $f$  a pour valeur :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2}\right) &= \pi \times \left(\frac{\frac{1}{2}}{2}\right)^2 + \pi \times \left(\frac{1 - \frac{1}{2}}{2}\right)^2 = \pi \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \pi \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \\ &= \pi \times \frac{1}{16} + \pi \times \frac{1}{16} = \pi \times \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \cdot \pi \end{aligned}$$

