672_690_PHY_SCI_NA_S_EM_GL_668304.indd Page 679 23/06/19 3:20 AM f-027 /152/GO02887/Inspire_Science_Physical/NA/SE/Inspire_Science_Physical/G1/007_66830 ...

H

half-life: amount of time it takes for half the nuclei in a sample of a radioactive isotope to decay.

hazardous waste: wastes that are poisonous, cause cancer, or can catch fire.

heat: energy that is transferred between objects due to a temperature difference between those objects.

heat engine: device that converts some thermal energy into mechanical energy.

heat of fusion: amount of energy required to change a substance from the solid phase to the liquid phase.

heat of vaporization: the amount of energy required for a liquid at its boiling point to become a gas.

heterogeneous mixture: substance in which its different components are easily distinguished.

holography: technique that produces a complete three-dimensional photographic image of an object.

homogeneous mixture: substance containing two or more components that are blended uniformly so that individual components are indistinguishable with a microscope.

hydrate: compound that has water chemically attached to its atoms and written into its chemical formula.

hydrocarbon: compound containing only carbon and hydrogen atoms.

hydroelectricity: electricity produced from the energy of moving water.

hydronium ion: H_3O^+ ion, forms when an acid dissolves in water and H^+ ions interact with water.

hydroxide ion: OH^- ion, forms when a base dissolves in water.

hypothesis: possible explanation for a problem using what is known and what is observed.

vida media: tiempo requerido para que se descomponga la mitad de los núcleos de una muestra de isótopo radiactivo.

residuo peligroso: residuo tóxico, provoca cáncer, o puede incendiarse.

calor: la energía que se transfiere entre los objetos debido a una diferencia de temperatura entre esos objetos.

motor de calor: dispositivo que convierte térmica en energía mecánica.

calor de fusión: cantidad de energía necesaria para cambiar una sustancia del estado sólido al líquido.

calor de vaporización: cantidad de energía necesaria para que un líquido en su punto de ebullición se convierta en gas.

mezcla heterogénea: sustancia en la que los diferentes componentes se distinguen fácilmente.

holografía: técnica que produce una imagen fotográfica tridimensional completa de un objeto.

mezcla homogénea: sustancia que contiene dos o más componentes que se combina de manera uniforme a fin de que los componentes individuales no se pueden distinguir con un microscopio.

hidrato: compuesto que contiene agua químicamente apegado a sus átomos y escrita en su fórmula química.

hidrocarburo: compuesto que contiene únicamente átomos de carbono e hidrógeno.

hidroelectricidad: electricidad producida por la energía de movimiento de agua.

ion de hidronio: ion H_3O^+, se forma cuando un ácido se disuelve en agua y el ion H^+ interactúa con el agua.

hydroxide ion: ion OH^-, forma cuando una base disuelve en agua.

hipótesis: explicación posible para resolver un problema al utilizar lo que conoce y lo que observa.

I

incandescent light: light produced by heating a piece of metal, usually tungsten, until it glows.

incoherent light: light that can contain more than one wavelength, travel in more than one direction, and has varying distances between the corresponding crests of the waves.

independent variable: factor that, as it changes, affects the measure of another variable.

index of refraction: property of a material indicating how much the speed of light is reduced in the material compared to the speed of light in a vacuum.

indicator: organic compound that changes color in acids and bases.

inertia: tendency of an object to resist any change in its motion.

luz incandescente: luz que se produce al calentar una pieza de metal, generalmente tungsteno, hasta que brille.

luz incoherente: luz que puede contener más de una longitud de onda, viaja en más de una dirección, y tiene distancias variables entre las crestas correspondientes de las olas.

variable independiente: factor que, a medida que cambia, afecta la medida de otra variable.

índice de refracción: propiedad de un material que indica cuanto la velocidad de la luz se reduce en el material en comparación con la velocidad de la luz en el vacío.

indicador: compuesto orgánico que cambia de color en presencia de ácidos y bases.

inercia: tendencia de un objeto a resistir cualquier cambio en su movimiento.

672_690_PHY_SCI_NA_S_EM_GL_668304.indd 23/06/19 03:20AM

Program: **HSS_NA**	Component: **Glossary**	**PDF Pass**
Vendor: **Aptara**	Chapter: **EM**	