
本文を覆うシミ：元の例と、追加の主要3例

原画像では筆画が見えるが、NPJ系の出力ではシミと筆画が黒く一体になる。


T00 hnsd007_042

枠線から本文までシミが黒い塊になる

原画像



NPJ系の処理後




原画像で見えるシミ下の筆画が、出力では大きな黒い塊に覆われる。枠線にも接続する。

T01 hnsd007_023

複数の筆画を広い黒い塊が覆う

原画像



NPJ系の処理後




原画像では茶色いシミを横切る細い線・曲線が見えるが、出力では広い黒い塊に埋まり、隣の列とも接続する。

T02 hnsd007_025

2つのシミがそれぞれ本文を覆う

原画像



NPJ系の処理後




原画像の2つの茶色い範囲に見える筆画が、出力では大小2つの黒い塊に埋まる。正常な隣の列は概ね追える。


T03 hnsd007_022

本文の横の小さい文字が埋もれる

原画像



NPJ系の処理後



シミの中の本文と、その右の小さい文字に見える線が出力では塊・断片に変わる。広い単一の塊だけでない失敗。


接触の小さい例と、別資料への展開候補

小さな接触部も記録する。別資料のT07はシミ・損傷の材質確認が残る。


T04 hnsd007_026

シミが本文の細い線と一体になる

原画像



NPJ系の処理後




原画像のシミに重なる細い曲線の近くが、出力では黒い塊になり、本文の線と接続する。


T06 hnsd007_043

小さい茶色い範囲が筆画に接続する

原画像



NPJ系の処理後



原画像の曲線に近接・重複する小さい茶色い範囲が、出力では筆画に接続した黒い塊として残る。影響は局所的。

T07 200021869_00014_2

別資料の茶色い跡が本文の一画につながる

原画像



NPJ系の処理後




濃い茶色い跡の下端が本文の横線に接し、出力では黒い塊として一体になる。ただし跡には白い中心もあり、シミか損傷かは未確定。


T05 hnsd007_027

小さいシミは黒く残るが本文とは離れる

原画像



NPJ系の処理後




本文の線の下に小さい黒い塊が残るが、拡大では主要な線との間に隙間が見える。本文を覆う主要例には数えない。


T00 枠線から本文までシミが黒い塊になる

hnsd007_042 ／ 優先度：高 ／ 2026-10-04の既存crop対照・今回再利用

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



原画像で見えるシミ下の筆画が、出力では大きな黒い塊に覆われる。枠線にも接続する。


原ページROI (x,y,w,h) = [900, 250, 320, 400]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。

T01 複数の筆画を広い黒い塊が覆う

hnsd007_023 ／ 優先度：高 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



原画像では茶色いシミを横切る細い線・曲線が見えるが、出力では広い黒い塊に埋まり、隣の列とも接続する。


原ページROI (x,y,w,h) = [812, 421, 450, 450]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。

T02 2つのシミがそれぞれ本文を覆う

hnsd007_025 ／ 優先度：高 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



原画像の2つの茶色い範囲に見える筆画が、出力では大小2つの黒い塊に埋まる。正常な隣の列は概ね追える。


原ページROI (x,y,w,h) = [748, 404, 440, 440]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。


T03 本文の横の小さい文字が埋もれる

hnsd007_022 ／ 優先度：高 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



シミの中の本文と、その右の小さい文字に見える線が出力では塊・断片に変わる。広い単一の塊だけでない失敗。


原ページROI (x,y,w,h) = [642, 383, 350, 480]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。


T04 シミが本文の細い線と一体になる

hnsd007_026 ／ 優先度：中 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



原画像のシミに重なる細い曲線の近くが、出力では黒い塊になり、本文の線と接続する。


原ページROI (x,y,w,h) = [700, 426, 330, 470]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。


T05 小さいシミは黒く残るが本文とは離れる

hnsd007_027 ／ 優先度：低 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



本文の線の下に小さい黒い塊が残るが、拡大では主要な線との間に隙間が見える。本文を覆う主要例には数えない。


原ページROI (x,y,w,h) = [931, 365, 330, 420]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。


T06 小さい茶色い範囲が筆画に接続する

hnsd007_043 ／ 優先度：中 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



原画像の曲線に近接・重複する小さい茶色い範囲が、出力では筆画に接続した黒い塊として残る。影響は局所的。

原ページROI (x,y,w,h) = [635, 342, 300, 440]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。


T07 別資料の茶色い跡が本文の一画につながる

200021869_00014_2 ／ 優先度：保留 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



濃い茶色い跡の下端が本文の横線に接し、出力では黒い塊として一体になる。ただし跡には白い中心もあり、シミか損傷かは未確定。

原ページROI (x,y,w,h) = [991, 1586, 450, 470]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。


C01 粒状像は残るが本文との重なりは不確定

200021851_00007_2 ／ 優先度：保留 ／ 2026-10-07の新規crop対照

原画像



NPJ系・通常黒文字マスクの処理後



原画像にある粒状の濃い像が出力でも残る。主要な本文は左右に見え、像の下の灰色線は表の筆画か裏写りか未確定。

原ページROI (x,y,w,h) = [1675, 2190, 440, 490]。同じ座標・無補正・原画素の2倍表示。

目視候補。汚れの材質・残す筆画の正解・読解効果は未注釈。全ページ工程後の出力ではない。