Отчёт по лабораторной работе №2

дисциплина: Математическое моделирование

Зорин Илья Михайлович

Содержание

Цель работы	1
Задание	J
Выполнение лабораторной работы	1
Выводы	

Цель работы

Решить задачу о погоне.

Задание


Вариант 47 Задача: на море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 16,6 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,4 раза больше скорости браконьерской лодки.

- 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
- 2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
- 3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки.

Выполнение лабораторной работы

1. Вывод дифференциального уравнения

- 1.1. Принимаем за $t_0 = 0$, $x_{\Lambda 0} = 0$ место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{K0} = 16,6$ км место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.
- 1.2. Введем полярные координаты. Считаем, что полюс это точка обнаружения лодки браконьеров $x_{\Lambda 0}(\theta=x_{\Lambda 0}=0)$, а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны. (см. рис. @fig:001)



Положение катера и лодки в начальный момент времени

- 1.3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.
- 1.4. Чтобы найти расстояние x (расстояние, после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет x, а катер 16,6-x (или 16,6+x, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $x \circ 0$ или $16,6-x \circ 0$ (во втором случае $16,6+x \circ 0$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{16.6 - x}{4.4v}$$
 или $\frac{x}{v} = \frac{16.6 + x}{4.4v}$

Тогда $x_1 = \frac{83}{15}$ (км), а $x_2 = 16.6$ (км), задачу будем решать для двух случаев.

1.5. После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v. Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r – радиальная скорость и v_τ – тангенциальная скорость.

Радиальная скорость – это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{\partial r}{\partial t}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $v_r = \frac{\partial r}{\partial t} = v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости на радиус, $v_{\tau}=r\frac{\partial \theta}{\partial t}$.

По теореме Пифагора: $v_{\tau} = v$, тогда получаем $r \frac{\partial \theta}{\partial t} = \sqrt{18,36}v$.

1.6. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

Исключая из полученной системы производную по t, можно перейти к следующему уравнению:

```
frac{ \rho rtial r}{ \rho = \sqrt{5}r}{ sqrt{22}} $
```


Решив это уравнение, я получу траекторию движения катера в полярных координатах. Начальные условия:

2. Построение траекторий движения катера и лодки

2.1. Написала программу на Python:

```
import math
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt
k = 16.6
fi = 3*math.pi/4
#функция, описывающая движение катера береговой охраны
def dr(r, tetha):
    dr = sqrt(5)*r/math.sqrt(22)
    return dr
r01 = 83/15
te = np.arange(0, 2*math.pi, 0.01)
r1 = odeint(dr, r01, te)
#функция, описывающая движение лодки браконьеров
def xt(t):
    xt = math.tan(fi)*t
    return xt
t = np.arange(0, 20, 1)
#Перевод в полярные координаты
tete = (np.tan(xt(t)/t))**-1
rr = np.sqrt(t*t + xt(t)*xt(t))
#построение траектории движения катера в полярных координатах. 1 случай
plt.polar(te, r1, 'g')
#построение траектории движения лодки в полярных координатах
plt.polar(tete, rr, 'b')
#точки пересечения
idx = np.argwhere(np.diff(np.sign(rr - r1))).flatten()
```

2.2. Получил график:(см. рис. @fig:002)



Траектории движения катера и лодки для 1 случая

3.2. В итоге точка пересечения имеет следующие координаты: $\theta = -0.6420926159343304, r = 25.455844122715714,$

Выводы

Решил задачу о погоне.