



Boletín de monitoreo climático de las principales cuencas hidrográficas: Cuenca Amazónica

Volumen 4, Numero 08

Manaus, 25 de febrero de 2026



**MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO**



Boletín de monitoreo climático de las principales cuencas hidrográficas: Cuenca Amazónica

Redactor Jefe Renato Cruz Senna

Meteorólogo

Investigador - CODAM, INPA

Publicación Renato Cruz Senna

Tainá Sampaio Xavier Conchy Rocha

Adriano Nobre Arcos

Frecuencia Semanal

Corrección y maquetación Inácio de Oliveira Lima Neto

Contacto Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA

Av. André Araújo, 2.936 - Petrópolis

CEP 69067-375 - Manaus -AM, Brasil

E-mail: renato.senna@inpa.gov.br

clima.amazonia@inpa.gov.br

Telefone: (92) 3643 3154 / 3643-3170

www.instagram.com/clima.amazonia



Esta investigación contó con el apoyo del Programa de Gran Escala Biosfera-Atmósfera en la Amazonía (LBA), coordinado por el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA), financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), entidad bajo la administración directa del Gobierno Federal de Brasil.




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

Índice

Condiciones actuales	1
Cuenca del Río Branco	2
Cuenca del Río Negro	2
Cuenca del Río Marañón	2
Cuenca del Río Ucayali	3
Cuenca del Río Napo	3
Curso principal del Río Amazonas (Perú)	3
Cuenca del Río Javari	4
Cuencas de los ríos Içá y Putumayo	4
Cuenca del Río Jutai	4
Cuenca del Río Juruá	5
Cuencas de los ríos Caquetá y Japurá	5
Cuenca del Río Tefé	5
Cuenca del Río Coari	6
Cuenca del Río Purus	6
Curso principal del Río Solimões	6
Cuenca del Río Beni	7
Cuenca del Río Mamoré	7
Cuenca del Río Guaporé	7
Cuenca del Río Ji-Paraná	8
Cuenca del Río Aripuanã	8
Cuenca del Río Madeira	8
Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (Amazonas)	9
Cuenca del Río Abacaxis	9
Cuenca del Río Jurueña	9
Cuenca del Río Teles Pires	10
Cuenca del Río Tapajós	10
Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noroeste do Pará)	10
Cuenca del Río Curuá Una	11
Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noreste do Pará)	11
Cuenca del Río Iri	11
Cuenca del Río Xingu	12
Curso principal del Río Amazonas (Brasil)	12
Pronóstico multimodelo subestacional	13
Valores de referencia	15
Categorización de las anomalías de precipitación	16
Comportamiento semanal de anomalías (gráficos auxiliares)	17
Diagrama unifilar de las cuencas indicadas.	20


Condições atuais

Los mapas de las condiciones de precipitación observadas y los gráficos individuales por cuenca se elaboran a partir de los datos MERGE/GPM generados por el INPE/CPTEC, tomando como climatología el periodo 2000-2025. **Entre el 27 de enero y el 25 de febrero de 2026, las precipitaciones por debajo de la media provocaron déficits de precipitación a lo largo del curso principal del río Amazonas en territorio brasileño, las cuencas hidrográficas de los ríos Abacaxis, Branco, Coari, Curuá Una, Guaporé, Iriri, Jutai, Mamoré, las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste y noroeste del estado de Pará, Purus, Tapajós, Xingu y el curso principal del río Solimões; se registraron precipitaciones superiores a las normas climatológicas en el curso principal del río Amazonas en territorio peruano y en las cuencas de los ríos Içá, Javari, Marañón, Napo y Ucayali; se registraron precipitaciones cercanas a lo normal en las cuencas de los ríos Aripuanã, Beni, Japurá, Ji-Paraná, Juruá, Juruena y Madeira, en las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste del estado de Amazonas y en los ríos Negro, Tefé y Teles Pires. El multimodelo indica precipitaciones por debajo de lo normal para las próximas semanas en el curso principal del río Amazonas en territorio brasileño, las cuencas de los ríos Abacaxis, Aripuanã, Beni, Branco, Coari, Curuá Una, Guaporé, Iriri, Ji-Paraná, Juruena, Madeira, Mamoré, en la margen izquierda del río Amazonas, en el noreste y noroeste del estado de Pará, Purus, Tapajós, Ucayali y Xingu; se pronostican precipitaciones superiores a la climatología para las cuencas de los ríos Japurá y Negro en la primera semana.**




Análise individual por bacia hidrográfica

Cuenca del Río Branco




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **40 y 54 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **25 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, lo que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser extremadamente seco**.

Cuenca del Río Negro




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **173 y 203 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **136 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Marañón




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **158 y 182 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **235 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **1.6**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy lluvioso**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **lluvioso o propenso a lluvioso**.

Cuenca del Río Ucayali




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **183 y 204 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **227 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.7**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a lluvioso**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a lluvioso**.

Cuenca del Río Napo




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **187 y 221 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **241 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.7**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a lluvioso**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Curso principal del Río Amazonas (Perú)




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **270 y 299 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **372 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **1.6**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy lluvioso**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad**.

Cuenca del Río Javari




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **270 y 294 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **282 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.1**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuencas de los ríos Içá y Putumayo




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **222 y 251 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **279 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.9**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a lluvioso**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Jutai




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **308 y 339 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **235 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.7**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Juruá




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **258 y 285 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **234 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.7**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuencas de los ríos Caquetá y Japurá




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **185 y 211 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **194 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.1**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Tefé




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **262 y 291 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **201 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.8**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Coari




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **253 y 277 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **187 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.2**, o que clasifica la cuenca en condición de **muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser extremadamente seco**.

Cuenca del Río Purus




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **275 y 302 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **205 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.


Curso principal del Río Solimões




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **258 y 287 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **203 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **258 y 284 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **221 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.


Cuenca del Río Mamoré

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **222 y 249 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **180 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca de los ríos Guaporé y Iténez


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **201 y 223 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **182 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.7**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Ji-Paraná




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **257 y 281 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **213 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.1**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Aripuanã




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **276 y 306 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **270 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.6**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a lluvioso**.

Cuenca del Río Madeira




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **255 y 285 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **208 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (Amazonas)




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **210 y 236 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **213 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Abacaxis




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **264 y 293 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **226 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.1**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.


Cuenca del Río Juruena




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **273 y 298 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **246 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.9**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad**.

Cuenca del Río Teles Pires


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **287 y 313 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **245 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Tapajós


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **283 y 311 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **233 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noroeste do Pará)


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **193 y 220 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **136 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.8**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Curuá Una


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **220 y 241 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **214 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a lluvioso**.

Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noreste do PA)


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **215 y 237 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **172 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Iri

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **279 y 310 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **198 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.8**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Xingu


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **253 y 280 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **206 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Curso principal del Río Amazonas (Brasil)

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **296 y 324 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **25 de febrero de 2026**, se observaron **258 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.2**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Pronóstico multimodelo subestacional CPTEC/INPE-FUNCEME elaborada el 24/02/2026 para los próximos 7 y 14 días.

El pronóstico multimodelo subestacional calibrado CPTEC/INPE-FUNCEME se genera a través de la cooperación científica entre CPTEC/INPE y FUNCEME, y proviene del conjunto de 4 modelos globales (un modelo brasileño, el BAM-1.2/CPTEC, y tres modelos del USA, CFSv2/NCEP, GEFSv12/NCEP y ESRL/NOAA, estos tres últimos del proyecto SubX). Las anomalías de precipitación previstas se determinan en relación al período climatológico de 1999 a 2016. A continuación se presentan los resultados para el intervalo de pronóstico de 07 y 14 días, detallando el comportamiento previsto sobre las cuencas de interés.




La figura de arriba muestra el pronóstico para el intervalo de 7 días entre el 25/02/2026 y el 03/03/2026, predicción de un déficit de precipitaciones predominante (naranja) en el sur y noreste de la región monitoreada, sobre el curso principal del río Amazonas en territorio brasileño, las cuencas de Abacaxis, Aripuanã, Beni, Branco, Coari, Curuá Una, Guaporé, Iriti, Ji-Paraná, Juruena, Madeira, Mamoré, cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste y noroeste del estado de Pará, Purus, Tapajós, Teles Pires, Ucayali y Xingu. Previsión de anomalías positivas en las precipitaciones (azul) en las cuencas de los ríos Japurá y Negro. Previsión de precipitaciones cercanas a la climatología (blanco) en las demás cuencas monitoreadas.

PRONOSTICO MULTIMODELO SUBESTACIONAL CALIBRAE

Anomalia Pluviométrica Acumulada (mm)

(14 Dias) Período: 25/02/2026 – 10/03/2026



La figura de arriba muestra el pronóstico para el intervalo de 14 días entre el 25/02/2026 y el 10/03/2026, previsión de un déficit de precipitaciones predominante (naranja) en casi toda la región monitoreada, sobre el curso principal del río Amazonas en territorio brasileño, las cuencas de los ríos Abacaxis, Aripuanã, Beni, Branco, Coari, Curuá Una, Guaporé, Iriri, Japurá, Ji-Paraná, Juruena, Madeira, Mamoré, Marañón, cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste del estado de Amazonas y en el noreste y noroeste del estado de Pará, Napo, Negro, Purús, Tapajós, Tefé, Ucayali, Xingu y el curso principal del río Solimões. No se prevén anomalías positivas en las precipitaciones (azul) para la región monitoreada. Previsión de lluvias cercanas a la climatología (blanco) sobre el curso principal del río Amazonas en territorio peruano, las cuencas de los ríos Javari, Juruá, Jutaí y Teles Pires..

Valores de referencia de las precipitaciones acumuladas durante 30 días en la fecha del análisis.

La Tabla 1 muestra los valores medios de precipitación acumulada (mm de lluvia) por cuenca, basados en estimaciones de precipitación mediante imágenes de satélite, producto denominado MERGE/GPM, puesto a disposición por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, para el periodo 2000 - 2025, teniendo en cuenta los límites geográficos de las cuencas hidrológicas de la Amazonia, se utilizó la técnica de cuantiles, por ser una herramienta adecuada y precisa para categorizar la precipitación y las anomalías de variables discretas. Se adoptaron los siguientes umbrales: 5%, 12,5%, 20%, 27,5%, 35%, 42,5%, 57,5%, 65%, 72,5%, 80%, 87,5% y 95%, con el fin de estratificar la técnica y permitir una categorización más detallada de las condiciones de cada cuenca monitoreada.

25/02/2026	Cuantiles para clasificar las anomalías de precipitación											
	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%	57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
Abacaxis	120	165	195	222	245	264	293	312	333	360	393	441
Amazonas (BR)	172	211	237	258	277	296	324	344	364	386	417	469
Amazonas (PE)	128	187	214	236	254	270	299	321	348	379	410	468
Aripuanã	140	180	210	235	256	276	306	326	349	377	412	465
Beni	155	185	206	224	241	258	284	304	324	350	385	451
Branco	7	12	17	23	31	40	54	64	82	103	128	179
Coari	163	188	207	223	238	253	277	294	317	350	391	463
Curuá Una	133	160	177	193	207	220	241	256	272	296	333	391
Guaporé	111	138	156	171	187	201	223	239	257	279	308	357
Içá	106	146	170	188	205	222	251	271	296	325	358	415
Iriri	131	184	214	237	258	279	310	331	355	382	417	470
Japurá	86	113	134	152	169	185	211	230	249	272	303	352
Javari	129	182	214	236	254	270	294	309	329	353	385	435
Ji-Paraná	124	175	203	223	241	257	281	297	318	342	372	418
Juruá	140	171	197	217	238	258	285	305	325	350	381	436
Juruena	155	193	217	238	256	273	298	316	338	364	399	465
Jutaí	171	207	236	261	287	308	339	360	383	411	445	502
Madeira	132	172	196	216	236	255	285	305	327	350	378	422
Mamoré	123	151	172	189	205	222	249	268	291	319	356	419
Marañon	72	94	110	126	142	158	182	199	216	236	260	301
Marg Esq (AM)	69	108	142	170	191	210	236	256	279	304	341	402
Marg Esq (PA) NE	108	151	171	187	201	215	237	254	274	296	324	369
Marg Esq (PA) NW	84	116	137	157	176	193	220	239	262	292	332	391
Napo	78	106	126	145	165	187	221	247	271	299	337	395
Negro	63	97	120	140	157	173	203	229	256	285	320	383
Purus	165	200	223	241	258	275	302	321	343	369	402	451
Solimões	128	164	193	215	237	258	287	309	338	368	404	458
Tapajós	132	183	219	245	265	283	311	331	352	375	403	451
Tefé	135	178	205	226	244	262	291	314	343	375	412	468
Teles Pires	158	194	226	250	270	287	313	332	353	378	414	474
Ucayali	107	126	143	157	170	183	204	219	237	259	287	333
Xingu	130	169	194	215	235	253	280	299	320	347	385	455

Taba 1. Quantiles de precipitaciones acumuladas (mm) en 30 días (27 de enero a 25 de febrero),

Climatología para el período (2000 - 2025) datos MERGE/GPM – INPE/CPTEC.

Categorización das anomalias de precipitação

Utilizando los valores de la tabla anterior, es posible categorizar la precipitación observada en el año en curso en relación con los valores observados en registros anteriores desde el inicio de la serie disponible, de modo que los valores observados sean menores al cuantil 5. % caracteriza la cuenca en condición extremadamente seco, entre 5 y 12,5% en condición que tiende a ser extremadamente seco, entre 12,5 y 20% en condición muy seco, entre 20 y 27,5% en condición que tiende a ser muy seco, entre 27.5 y 35% en condición seco, entre 35 y 42.5 tiende a ser seco, valores entre 42.5 y 57.5 definen la condición normal, valores entre 57.5 y 65% tienden a ser lluvioso, entre un 65 y un 72,5% son lluvioso, entre un 72,5 y un 80% tienden a ser muy lluvioso, entre un 80 y un 87,5 son muy lluvioso, entre un 87,5 y un 95% indican tendencia a extremadamente lluvioso y finalmente, valores superiores al 95% definen la cuenca en condiciones extremadamente lluvioso, según el título a continuación.

CUANTIL	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%		57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
CATEGORÍA	EXTREMADAMENTE SECO	TENDENCIA A EXTREMADAMENTE SECO	MUY SECO	TENDENCIA A MUY SECO	SECO	TENDENCIA A SECO	NORMAL	TENDENCIA A LLUVIOSO	LLUVIOSO	TENDENCIA A MUY LLUVIOSO	MUY LLUVIOSO	TENDENCIA A EXTREMADAMENTE LLUVIOSO	EXTREMADAMENTE LLUVIOSO

Las tablas a continuación muestran (Tabla 2A) la precipitación promedio observada (mm) en cada cuenca, tomando como referencia las estimaciones de precipitación por satélite mediante la técnica MERGE, disponible en <http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/> acumulado en 30 días en las fechas indicadas, se estimaron los valores promedio de las anomalías categorizadas (Tabla 2B) con base en el valor de anomalía de cada píxel en el área de la cuenca monitoreada, calculado según la metodología descrita en el ítem anterior, en las mismas fechas de monitoreo de precipitaciones, la escala de colores de las anomalías sigue la leyenda descrita.

	Precipitaciones medias acumuladas en la cuenca (mm)				
	28/01/2026	04/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	25/02/2026
Abacaxis	217	205	223	232	226
Amazonas (BR)	130	144	209	250	258
Amazonas (PE)	260	320	311	396	372
Aripuanã	247	226	264	301	270
Beni	290	300	274	267	221
Branco	30	40	32	30	25
Coari	226	236	236	236	187
Curuá Una	108	98	119	195	214
Guaporé	120	129	123	144	182
Içá	223	264	256	278	279
Íriri	225	201	192	229	198
Japurá	169	198	174	198	194
Javari	248	288	274	338	282
Ji-Paraná	254	249	233	245	213
Juruá	256	255	239	246	234
Juruena	236	206	236	270	246
Jutai	222	241	243	245	235
Madeira	266	273	254	253	208
Mamoré	159	162	130	146	180
Marañon	198	238	216	257	235
Marg Esq (AM)	186	176	185	209	213
Marg Esq (PA) NE	88	93	132	167	172
Marg Esq (PA) NW	95	92	126	132	136
Napo	208	258	231	241	241
Negro	206	219	185	186	136
Purus	282	287	244	244	205
Solimões	233	242	235	242	203
Tapajós	204	189	205	233	233
Tefé	277	306	312	290	201
Teles Pires	213	222	241	267	245
Ucayali	215	260	249	271	227
Xingu	182	174	180	199	206









Tabela 2A. Precipitacion acumulada en 30 dias (mm), datos MERGE/GPM – INPE/CPTEC.

Anomalia categorizada media en la cuenca				
28/01/2026	04/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	25/02/2026
-0.5	-0.9	-0.8	-0.8	-1.1
-2.1	-2.2	-1.3	-1.0	-1.2
-0.7	0.7	0.5	1.9	1.6
-0.5	-1.0	-0.3	0.3	-0.6
0.5	0.4	0.0	-0.1	-1.3
-0.9	-0.1	-0.8	-0.9	-1.3
-0.9	-1.0	-1.0	-0.7	-2.2
-1.8	-2.3	-2.2	-0.6	-0.4
-2.2	-1.6	-1.8	-1.5	-0.7
-0.4	0.6	0.5	0.8	0.9
-0.7	-1.4	-1.6	-1.1	-1.8
-0.3	0.3	-0.5	0.1	-0.1
-0.6	0.3	0.1	1.1	0.1
0.1	-0.1	-0.4	-0.2	-1.1
0.1	-0.1	-0.4	-0.4	-0.7
-0.7	-1.3	-0.7	-0.1	-0.9
-1.3	-1.3	-1.5	-1.5	-1.7
0.4	0.4	0.0	-0.2	-1.3
-1.7	-1.5	-2.1	-2.0	-1.3
1.1	1.8	1.3	1.9	1.6
0.1	-0.2	-0.3	-0.1	-0.4
-2.2	-2.4	-1.8	-1.2	-1.4
-1.6	-1.8	-1.3	-1.5	-1.8
0.2	1.1	0.6	0.8	0.7
0.6	0.8	-0.2	0.0	-1.3
0.1	0.1	-0.9	-1.0	-2.0
-0.5	-0.5	-0.8	-0.6	-1.4
-1.1	-1.6	-1.5	-1.1	-1.3
-0.2	0.4	0.3	0.4	-1.8
-1.3	-1.1	-0.7	-0.4	-1.0
0.8	1.7	1.4	1.7	0.7
-1.4	-1.7	-1.7	-1.3	-1.3


Tabela 2B. Anomalia Categorizada de precipitacion por cuantiles.

Comportamiento de las anomalías de 07 y 30 días observadas en semanas anteriores


Los siguientes gráficos ilustran el comportamiento del índice de anomalía de precipitación en las últimas semanas, las líneas rojas muestran el comportamiento para periodos de 30 días y las líneas azules el comportamiento para periodos de 7 días, actualizados semanalmente.




Rio Guaporé y Itenéz




Rio Içá y Putumayo




Rio Iriri




Rio Caquetá y Japurá




Rio Javari




Rio Ji-Paraná




Rio Juruá




Rio Juruena













Rio Jutai



Rio Madeira












Diagrama unifilar de las cuencas representadas



Renato Cruz Senna

Pesquisador - CODAM

Meteorologista, CREA-AM 2880-D

Registro Nacional 040459935-4

Fone de contato +55 92 3643 3170

