



Boletín de monitoreo climático de las principales cuencas hidrográficas: Cuenca Amazónica

Volumen 4, Numero 14

Manaus, 8 de abril de 2026



**MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO**



Boletín de monitoreo climático de las principales cuencas hidrográficas: Cuenca Amazónica

Redactor Jefe Renato Cruz Senna

Meteorólogo

Investigador - CODAM, INPA

Publicación Renato Cruz Senna

Tainá Sampaio Xavier Conchy Rocha

Inácio de Oliveira Lima Neto

Adriano Nobre Arcos

Frecuencia Semanal

Corrección y maquetación Inácio de Oliveira Lima Neto

Contacto Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA

Av. André Araújo, 2.936 - Petrópolis

CEP 69067-375 - Manaus -AM, Brasil

E-mail: renato.senna@inpa.gov.br

clima.amazonia@inpa.gov.br

Telefone: (92) 3643 3154 / 3643-3170

www.instagram.com/clima.amazonia



Esta investigación contó con el apoyo del Programa de Gran Escala Biosfera-Atmósfera en la Amazonía (LBA), coordinado por el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA), financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), entidad bajo la administración directa del Gobierno Federal de Brasil.




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

Índice

Condiciones actuales	1
Cuenca del Río Branco	2
Cuenca del Río Negro	2
Cuenca del Río Marañón	2
Cuenca del Río Ucayali	3
Cuenca del Río Napo	3
Curso principal del Río Amazonas (Perú)	3
Cuenca del Río Javari	4
Cuencas de los ríos Içá y Putumayo	4
Cuenca del Río Jutái	4
Cuenca del Río Juruá	5
Cuencas de los ríos Caquetá y Japurá	5
Cuenca del Río Tefé	5
Cuenca del Río Coari	6
Cuenca del Río Purus	6
Curso principal del Río Solimões	6
Cuenca del Río Beni	7
Cuenca del Río Mamoré	7
Cuenca del Río Guaporé	7
Cuenca del Río Ji-Paraná	8
Cuenca del Río Aripuanã	8
Cuenca del Río Madeira	8
Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (Amazonas)	9
Cuenca del Río Abacaxis	9
Cuenca del Río Juruena	9
Cuenca del Río Teles Pires	10
Cuenca del Río Tapajós	10
Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noroeste do Pará)	10
Cuenca del Río Curuá Una	11
Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noreste do Pará)	11
Cuenca del Río Iriri	11
Cuenca del Río Xingu	12
Curso principal del Río Amazonas (Brasil)	12
Pronóstico multimodelo subestacional	13
Valores de referencia	15
Categorización de las anomalías de precipitación	16
Comportamiento semanal de anomalías (gráficos auxiliares)	17
Diagrama unifilar de las cuencas indicadas.	20


Condições atuais

Los mapas de las condiciones de precipitación observadas y los gráficos individuales por cuenca se elaboran a partir de los datos MERGE/GPM generados por el INPE/CPTEC, tomando como climatología el periodo 2000-2025. **Entre el 10 de marzo y el 8 de abril de 2026, las precipitaciones por debajo de la media provocaron un déficit hídrico a lo largo del curso principal del río Amazonas en los territorios de Brasil y Perú, así como en las cuencas de los ríos Abacaxis, Aripuanã, Coari, Curuá Una, Içá, Iriri, Japurá, Javari, Ji-Paraná, Juruá, Juruena, Jutai, Madeira, las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste del estado de Amazonas y el noreste del estado de Pará, Napo, Negro, Purús, Tapajós, Tefé, Teles Pires, Xingu y el curso principal del río Solimões; se registraron precipitaciones superiores a lo normal en las cuencas de los ríos Branco y Ucayali; se registraron precipitaciones cercanas a lo normal en las cuencas de los ríos Beni, Guaporé, Mamoré y Marañón, y en las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noroeste del estado de Pará.** El multimodelo indica, para el período comprendido entre el 4 y el 10 de marzo de 2026, **se pronostican precipitaciones por debajo de los niveles normales concentradas en el noreste de la región monitoreada, sobre el curso principal del río Amazonas en territorio brasileño, las cuencas de los ríos Branco, Coari, Curuá Una, Iriri, Jutai, Mamoré y Marañón, las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste del estado de Amazonas y en el noreste y noroeste del estado de Pará, los ríos Napo, Negro, Tapajós y Tefé, y el curso principal del río Solimões; no se pronostican precipitaciones por encima de la media climatológica para la región monitoreada.**




Análise individual por bacia hidrográfica

Cuenca del Río Branco




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **71 y 94 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **119 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.7**, lo que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a lluvioso**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **lluvioso o propenso a lluvioso**.

Cuenca del Río Negro




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **234 y 258 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **187 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Marañón




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **188 y 208 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **205 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad**.

Cuenca del Río Ucayali




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **150 y 169 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **188 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **1.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **lluvioso**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **lluvioso o propenso a lluvioso**.

Cuenca del Río Napo




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **279 y 307 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **250 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Curso principal del Río Amazonas (Perú)




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **339 y 371 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **223 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser extremadamente seco**.

Cuenca del Río Javari




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **283 y 308 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **200 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuencas de los ríos Içá y Putumayo




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **299 y 329 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **222 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.9**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.


Cuenca del Río Jutai




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **273 y 299 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **185 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Juruá

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **241 y 264 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **199 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.


Cuencas de los ríos Caquetá y Japurá

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **268 y 293 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **199 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.8**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Tefé


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **262 y 279 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **166 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.8**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a extremadamente seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser extremadamente seco**.

Cuenca del Río Coari




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **273 y 292 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **146 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-3.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **extremadamente seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **muy seco o con tendencia a ser extremadamente seco**.

Cuenca del Río Purus




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **237 y 262 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **183 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Curso principal del Río Solimões




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **270 y 295 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **186 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **186 y 209 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **183 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.4**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Mamoré




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **155 y 179 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **172 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.2**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca de los ríos Guaporé y Iténez




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **143 y 164 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **152 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.1**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Ji-Paraná




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **207 y 231 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **185 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.8**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a lluvioso**.

Cuenca del Río Aripuanã




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **219 y 244 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **185 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.2**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Madeira




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **229 y 255 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **198 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.1**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (Amazonas)




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **250 y 280 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **220 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.9**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Abacaxis




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **253 y 278 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **235 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.7**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.


Cuenca del Río Juruena




La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **204 y 229 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **173 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.3**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Teles Pires


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **225 y 248 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **153 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-2.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Tapajós


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **257 y 287 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **230 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.1**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noroeste do Pará)


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **231 y 262 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **252 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **0.2**, o que clasifica la cuenca en condición de **normalidad**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Curuá Una


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **250 y 274 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **233 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-0.9**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuencas de la margen izquierda del Río Amazonas (noreste do PA)


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **248 y 274 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **202 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.5**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **elevación** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Cuenca del Río Iri

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **243 y 265 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **178 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.9**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser muy seco**.

Cuenca del Río Xingu


La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **223 y 245 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **167 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.8**, o que clasifica la cuenca en condición de **tendiendo a muy seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **reducción** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **seco o con tendencia a ser seco**.

Curso principal del Río Amazonas (Brasil)

La climatología del período analizado indica precipitaciones consideradas normales con registros que varían entre **317 y 342 mm** (quantiles de referencia 42.5% y 57.5%). El **8 de abril de 2026**, se observaron **282 mm** de la precipitación media acumulada sobre la cuenca en 30 días, el cálculo de la media del índice de anomalía categorizada en el área de la cuenca el valor de **-1.0**, o que clasifica la cuenca en condición de **seco**. En las próximas semanas, el comportamiento climático indica **mantenimiento** en los volúmenes de lluvia, el modelo de pronóstico subestacional sugiere un comportamiento **cerca de la normalidad o con tendencia a ser seco**.

Pronóstico multimodelo subestacional CPTEC/INPE-FUNCEME elaborada el 07/04/2026 para los próximos 7 y 14 días.

El pronóstico multimodelo subestacional calibrado CPTEC/INPE-FUNCEME se genera a través de la cooperación científica entre CPTEC/INPE y FUNCEME, y proviene del conjunto de 4 modelos globales (un modelo brasileño, el BAM-1.2/CPTEC, y tres modelos del USA, CFSv2/NCEP, GEFSv12/NCEP y ESRL/NOAA, estos tres últimos del proyecto SubX). Las anomalías de precipitación previstas se determinan en relación al período climatológico de 1999 a 2016. A continuación se presentan los resultados para el intervalo de previsión de 1 a 7 y de 8 a 14 días, detallando el comportamiento previsto en las cuencas de interés.




La figura de arriba muestra el pronóstico para el intervalo de **7 días entre el 08/04/2026 y el 14/04/2026**, previsión de un predominio de déficits de precipitación (naranja) en la parte nororiental de la región monitoreada, a lo largo del curso principal del río Amazonas en territorio brasileño, y en las cuencas de los ríos Branco, Coari, Curuá Una, Iriti, Jutaí, Mamoré y Marañón; las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste del estado de Amazonas y en el noreste y noroeste del estado de Pará; los ríos Napo, Negro, Tapajós y Tefé; y el curso principal del río Solimões. No se pronostican anomalías de precipitación predominantemente positivas (azul) sobre la región monitoreada. Pronóstico de precipitaciones cercanas a las normas climatológicas (blanco) sobre las cuencas monitoreadas restantes.

PRONOSTICO MULTIMODELO SUBESTACIONAL CALIBRAE

Anomalia Pluviométrica Acumulada (mm)

(07 Dias) Período: 15/04/2026 – 21/04/2026



La figura de arriba muestra el pronóstico para el intervalo de **7 días entre el 15/04/2026 y el 21/04/2026**, pronóstico de predominio de anomalías positivas de precipitación (azul) sobre el curso principal del río Amazonas en territorio peruano, las cuencas de los ríos Beni, Branco, Curuá Una, Içá, Iriti, Japurá, Javari, Juruena, Jutaí, Mamoré, Marañón, las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste del estado de Amazonas y el noroeste del estado de Pará, Napo, Negro, Purús, Teles Pires y Xingu. Pronóstico de un predominio de déficit de precipitación (naranja) sobre las cuencas de la margen izquierda del río Amazonas en el noreste del estado de Pará. Pronóstico de precipitaciones cercanas a las normas climatológicas (blanco) sobre las demás cuencas monitoreadas.

Valores de referencia de las precipitaciones acumuladas durante 30 días en la fecha del análisis.

La Tabla 1 muestra los valores medios de precipitación acumulada (mm de lluvia) por cuenca, basados en estimaciones de precipitación mediante imágenes de satélite, producto denominado MERGE/GPM, puesto a disposición por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, para el periodo 2000 - 2025, teniendo en cuenta los límites geográficos de las cuencas hidrológicas de la Amazonia, se utilizó la técnica de cuantiles, por ser una herramienta adecuada y precisa para categorizar la precipitación y las anomalías de variables discretas. Se adoptaron los siguientes umbrales: 5%, 12,5%, 20%, 27,5%, 35%, 42,5%, 57,5%, 65%, 72,5%, 80%, 87,5% y 95%, con el fin de estratificar la técnica y permitir una categorización más detallada de las condiciones de cada cuenca monitoreada.

08/04/2026	Cuantiles para clasificar las anomalías de precipitación											
	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%	57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
Abacaxis	127	157	187	212	233	253	278	295	314	340	372	435
Amazonas (BR)	205	237	264	283	300	317	342	360	380	404	440	496
Amazonas (PE)	191	234	270	296	317	339	371	394	422	453	496	561
Aripuanã	103	137	165	186	203	219	244	262	283	305	337	393
Beni	92	117	138	155	171	186	209	225	242	263	290	336
Branco	18	32	41	51	60	71	94	116	143	173	206	248
Coari	188	210	228	245	261	273	292	307	325	346	372	418
Curuá Una	133	168	202	220	235	250	274	289	306	327	352	399
Guaporé	71	90	104	117	130	143	164	180	197	219	246	294
Içá	183	212	237	258	279	299	329	350	373	398	429	475
Iriri	133	167	190	210	227	243	265	283	302	328	365	424
Japurá	166	195	217	235	252	268	293	310	331	355	388	442
Javari	178	209	232	251	267	283	308	327	348	373	406	459
Ji-Paraná	91	122	148	171	190	207	231	250	269	289	314	354
Juruá	134	170	194	211	226	241	264	279	296	317	347	396
Juruena	109	138	157	174	189	204	229	246	265	288	318	365
Jutaí	160	191	217	237	255	273	299	319	338	360	388	434
Madeira	125	157	178	196	213	229	255	273	292	315	347	399
Mamoré	74	94	110	124	140	155	179	197	217	241	272	322
Marañon	107	129	146	161	175	188	208	224	242	263	290	338
Marg Esq (AM)	121	160	186	209	229	250	280	301	326	354	388	440
Marg Esq (PA) NE	127	165	192	214	232	248	274	294	316	341	371	419
Marg Esq (PA) NW	111	146	169	189	211	231	262	283	305	334	374	453
Napo	174	199	219	238	259	279	307	328	351	378	413	470
Negro	131	162	183	202	218	234	258	276	297	322	355	405
Purus	135	165	187	205	221	237	262	280	300	325	359	414
Solimões	171	195	216	236	253	270	295	313	334	357	388	437
Tapajós	136	174	198	220	239	257	287	308	331	357	390	444
Tefé	178	201	220	237	250	262	279	291	306	325	348	409
Teles Pires	129	157	176	194	209	225	248	265	284	308	344	403
Ucayali	83	101	115	126	138	150	169	183	199	219	248	297
Xingu	126	155	175	192	207	223	245	260	278	300	329	376

Taba 1. Quantiles de precipitaciones acumuladas (mm) en 30 días (10 de marzo a 8 de abril),

Climatología para el período (2000 - 2025) datos MERGE/GPM – INPE/CPTEC.

Categorización das anomalias de precipitação

Utilizando los valores de la tabla anterior, es posible categorizar la precipitación observada en el año en curso en relación con los valores observados en registros anteriores desde el inicio de la serie disponible, de modo que los valores observados sean menores al cuantil 5. % caracteriza la cuenca en condición extremadamente seco, entre 5 y 12,5% en condición que tiende a ser extremadamente seco, entre 12,5 y 20% en condición muy seco, entre 20 y 27,5% en condición que tiende a ser muy seco, entre 27.5 y 35% en condición seco, entre 35 y 42.5 tiende a ser seco, valores entre 42.5 y 57.5 definen la condición normal, valores entre 57.5 y 65% tienden a ser lluvioso, entre un 65 y un 72,5% son lluvioso, entre un 72,5 y un 80% tienden a ser muy lluvioso, entre un 80 y un 87,5 son muy lluvioso, entre un 87,5 y un 95% indican tendencia a extremadamente lluvioso y finalmente, valores superiores al 95% definen la cuenca en condiciones extremadamente lluvioso, según el título a continuación.

CUANTIL	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%		57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
CATEGORÍA	EXTREMADAMENTE SECO	TENDENCIA A EXTREMADAMENTE SECO	MUY SECO	TENDENCIA A MUY SECO	SECO	TENDENCIA A SECO	NORMAL	TENDENCIA A LLUVIOSO	LLUVIOSO	TENDENCIA A MUY LLUVIOSO	MUY LLUVIOSO	TENDENCIA A EXTREMADAMENTE LLUVIOSO	EXTREMADAMENTE LLUVIOSO

Las tablas a continuación muestran (Tabla 2A) la precipitación promedio observada (mm) en cada cuenca, tomando como referencia las estimaciones de precipitación por satélite mediante la técnica MERGE, disponible en <http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/> acumulado en 30 días en las fechas indicadas, se estimaron los valores promedio de las anomalías categorizadas (Tabla 2B) con base en el valor de anomalía de cada píxel en el área de la cuenca monitoreada, calculado según la metodología descrita en el ítem anterior, en las mismas fechas de monitoreo de precipitaciones, la escala de colores de las anomalías sigue la leyenda descrita.

	Precipitaciones medias acumuladas en la cuenca (mm)				
	11/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	08/04/2026
Abacaxis	241	226	237	257	235
Amazonas (BR)	282	294	283	278	282
Amazonas (PE)	250	213	187	205	223
Aripuanã	228	174	190	180	185
Beni	219	197	196	204	183
Branco	7	12	15	74	119
Coari	156	124	133	159	146
Curuá Una	254	276	251	244	233
Guaporé	200	188	180	168	152
Içá	184	189	175	199	222
Iriti	336	324	316	254	178
Japurá	123	125	114	167	199
Javari	194	167	166	180	200
Ji-Paraná	180	147	156	189	185
Juruá	173	154	153	181	199
Juruena	257	218	240	217	173
Jutai	188	149	126	169	185
Madeira	203	183	194	204	198
Mamoré	218	221	234	205	172
Marañon	180	174	190	194	205
Marg Esq (AM)	224	234	188	228	220
Marg Esq (PA) NE	171	190	160	204	202
Marg Esq (PA) NW	143	190	178	261	252
Napo	172	211	206	233	250
Negro	100	90	90	156	187
Purus	202	195	184	217	183
Solimões	137	128	125	168	186
Tapajós	339	318	311	282	230
Tefé	148	117	111	143	166
Teles Pires	240	216	205	184	153
Ucayali	174	160	172	175	188
Xingu	225	207	197	177	167









Tabela 2A. Precipitacion acumulada en 30 dias (mm), datos MERGE/GPM – INPE/CPTEC.

Anomalia categorizada media en la cuenca				
11/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	08/04/2026
-1.0	-1.1	-0.9	-0.4	-0.7
-1.2	-0.8	-1.0	-1.4	-1.0
-1.4	-1.9	-2.4	-2.4	-2.3
-0.9	-1.7	-1.3	-1.5	-1.2
-1.1	-1.0	-0.6	-0.1	-0.4
-2.7	-2.2	-2.2	0.0	0.7
-2.7	-3.0	-2.9	-2.9	-3.0
0.2	0.6	-0.1	-0.6	-0.9
-0.1	0.1	0.2	0.0	-0.1
-2.0	-2.1	-2.5	-2.2	-1.9
0.5	0.6	0.4	-0.7	-1.9
-2.5	-2.6	-2.8	-2.3	-1.8
-2.1	-2.5	-2.4	-2.4	-2.0
-1.4	-2.0	-1.6	-1.1	-0.8
-2.2	-2.3	-2.1	-1.8	-1.3
-0.5	-0.9	0.0	-0.3	-1.3
-2.4	-2.8	-2.9	-2.4	-2.3
-1.4	-1.5	-1.3	-1.1	-1.1
-0.5	0.2	0.8	0.5	0.2
0.1	-0.2	0.0	0.1	0.4
-0.6	-0.4	-1.5	-0.9	-0.9
-1.9	-1.4	-1.9	-1.2	-1.5
-1.9	-1.0	-1.0	0.4	0.2
-1.8	-1.3	-1.6	-1.2	-1.0
-2.6	-2.7	-2.7	-1.9	-1.4
-1.9	-1.8	-1.9	-1.0	-1.4
-2.7	-2.7	-2.8	-2.3	-2.0
0.5	0.3	0.3	-0.3	-1.1
-2.8	-2.9	-3.0	-2.9	-2.8
-1.0	-1.1	-1.2	-1.5	-2.0
-0.8	-1.0	-0.3	0.3	1.0
-0.7	-1.2	-1.4	-1.8	-1.8


Tabela 2B. Anomalia Categorizada de precipitacion por cuantiles.

Comportamiento de las anomalías de 07 y 30 días observadas en semanas anteriores


Los siguientes gráficos ilustran el comportamiento del índice de anomalía de precipitación en las últimas semanas, las líneas rojas muestran el comportamiento para periodos de 30 días y las líneas azules el comportamiento para periodos de 7 días, actualizados semanalmente.




Rio Guaporé y Itenéz




Rio Içá y Putumayo




Rio Iriri




Rio Caquetá y Japurá




Rio Javari




Rio Ji-Paraná




Rio Juruá




Rio Juruena













Rio Jutai



Rio Madeira












Diagrama unifilar de las cuencas representadas



Renato Cruz Senna

Pesquisador - CODAM

Meteorologista, CREA-AM 2880-D

Registro Nacional 040459935-4

Fone de contato +55 92 3643 3170

