

化學屬性色碼圖例

酯類	醛類	單萜烯	倍半萜烯
放鬆、抗痙攣 (fruity/floral)	強效抗菌、降溫 (antimicrobial)	激勵、抗病毒 (stimulating)	抗炎、鎮靜 (anti-inflammatory)

單萜醇	倍半萜醇	氧化物	酮類	酚類
抗菌、提振免疫 (antiseptic)	強身、免疫調節 (immunostimulant)	化痰、開竅 (expectorant)	化痰、組織再生 (mucolytic，需謹慎)	強效抗菌 (low dilution only)

Annonaceae 番荔枝科

熱帶喬木，依蘭依蘭 (*Cananga odorata*) 以花朵蒸餾，含沉香醇、酯類與倍半萜，是香水工業東方花香的重要基礎。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
倍半萜烯	依蘭依蘭	Ylang Ylang	<i>Cananga odorata</i>	依蘭屬	Cananga (馬來語 kenanga 音譯) → 「依蘭樹」(原住民語直接音譯)	odor (拉丁: 氣味) → odorata (芬芳的) → 「芬芳的」	Cananga直接記 (馬來語); odorata=odor (氣味)+ata (具有); 想到deodorant除臭劑	◆ 混合	沉香醇、乙酸苜酯、大根香葉烯 (germacrene-D)、β-石竹烯	單萜醇 + 酯類 + 倍半萜烯

Apiaceae 繖形科

繖形花序科，芳香種類豐富。芫荽種子富沉香醇 (單萜醇)；胡蘿蔔籽以倍半萜醇胡蘿蔔醇為主；甜茴香 (*Foeniculum vulgare var. dulce*) 以芳香醚trans-anethole 為主，氣味甘草甜香——三者化學屬性截然不同，同科各有風格。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
單萜醇	芫荽 (胡荽)	Coriander Seed	<i>Coriandrum sativum</i>	芫荽屬	koriandron (希臘語，語源不明) → (存疑，或與 koris「臭蟲」有關)	sativus (種植的) → sativum → 「人工栽培的」	Coriandrum直接記；sativum=sow (播種)，Cannabis sativa同種名，代表人工馴化	◎ 直接記憶	沉香醇 (linalool)	單萜醇
倍半萜醇	胡蘿蔔籽	Carrot Seed	<i>Daucus carota</i>	胡蘿蔔屬	Daucus ← 希臘語 dais (燃燒) 或 daucos (古希臘繖形科植物名) → 「燃燒、刺激性的植物」(指其辛辣刺激的種子)	carota ← 希臘語 karotos (胡蘿蔔) ← 凱爾特語 car (紅色) → 「胡蘿蔔」(因根部紅色得名)	Daucus=dais (燃燒)，種子氣味刺激如火；carota=carrot英文直接來源；carotol (胡蘿蔔醇) 和carotenoid (類胡蘿蔔素) 都從carota這個字根生出；Queen Anne's Lace是它的英文別稱	◆ 混合	胡蘿蔔醇 (carotol) 40–65%、大根香葉烯 (germacrene-D)	倍半萜醇

芳香醚	甜茴香	<i>Sweet Fennel</i>	<i>Foeniculum vulgare var. dulce</i>	茴香屬	foenum (拉丁：乾草) → foeniculum (小乾草) → 「像乾草香氣的小草」(指茴香的甜乾草氣味)	vulgus (大眾) → vulgare (普通的)；var. dulce (甜的變種) → 「常見的」甜味栽培變種	foeniculum=fennel英文直接字源，foenum=hay (乾草)；義大利語 finocchio、德語Fenchel 均源此；vulgare=vulgar (大眾的)；dulce=dolce (義大利文「甜」)，以dulce與苦茴香(var. vulgare)區分；trans-茴香腦(anethole)帶來甘草甜香	◆ 拆解	反式茴香腦 (trans-anethole) 70–85%、小茴香酮 (fenchone)	芳香醚 + 酮類
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	-----	---	---	--	---------	---	----------

Asteraceae 菊科

頭狀花序，分佈廣泛。Helichrysum 含特殊義大利酮 (酮類)；Achillea (西洋薔草) 蒸餾後呈深藍色，因母菊天藍烴生成 (倍半萜烯)；兩種洋甘菊氣味迥異：羅馬洋甘菊富酯類，德國洋甘菊則以倍半萜著稱 (藍色萜)。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	永久花	<i>Immortelle / Everlasting</i>	<i>Helichrysum italicum</i>	蠟菊屬	hélios (希臘：太陽) + chrysós (希臘：黃金) → 「太陽般的黃金花」	italicum (義大利的) ← Italia → 「來自義大利的」	helios=heliocentric 日心說；chrysos=chrysanthemum (菊花金之花)；金黃小太陽	◆ 拆解	義大利酮 (italidione)、乙酸橙花酯、α-蒎烯	酮類 + 酯類 + 單萜烯
倍半萜烯	西洋薔草	<i>Yarrow</i>	<i>Achillea millefolium</i>	薔草屬	Achillea ← 希臘英雄 Akhilleus (阿基里斯) → 「阿基里斯的植物」(傳說阿基里斯用此草療傷)	mille (拉丁：千) + folium (葉) → millefolium → 「千葉的」(羽狀複葉細裂如千葉)	Achillea=Achilles (阿基里斯)，特洛伊戰爭英雄用它止血療傷；millefolium=千葉，mille=millennium (千年)，folium=leaf；蒸餾後精油呈深藍色，因母菊天藍烴 (chamazulene) 生成	◆ 拆解	母菊天藍烴 (chamazulene)、樟腦 (camphor)、β-蒎烯	倍半萜烯 + 酮類 + 單萜烯
酯類	羅馬洋甘菊	<i>Roman Chamomile</i>	<i>Chamaemelum nobile</i>	黃金菊屬	chamai (希臘：地面上) + mēlon (希臘：蘋果) → 「地上蘋果」(踩踏時散發蘋果香)	nobilis (高貴的) → nobile → 「高貴的」	chamai+melon=地面蘋果，踩下去有蘋果香；nobile=noble (高貴)	◆ 拆解	異丁酸異丁酯、當歸酸異丁酯 (多種藍色酯類)	酯類

倍半萜烯	德國洋甘菊	German Chamomile	<i>Matricaria chamomilla</i>	母菊屬	matrix (子宮) → matricaria (母親的植物) → 「子宮之草」 (傳統婦科用途)	chamomilla ← 希臘 chamai (地面) + mēlon (蘋果) → 「地面蘋果」	Matricaria=matrix (子宮) · 母親草；藍色是萹(azulene) · 由母菊素蒸餾時形成	◆ 拆解	母菊天藍萜(chamazulene)、α-紅沒藥醇(bisabolol)	倍半萜烯 + 倍半萜醇
------	-------	------------------	------------------------------	-----	--	---	--	---------	--------------------------------------	-------------

Burseraceae 橄欖科

樹脂科 · *Boswellia* (乳香) 與 *Commiphora* (沒藥) 皆產具神聖性的樹脂。精油以單萜烯或倍半萜為主，氣味深沉厚重。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
單萜烯	乳香 (索馬利亞)	Frankincense (Somalian)	<i>Boswellia sacra / carterii</i>	乳香屬	Boswell (蘇格蘭植物學家人名) → 「以Boswell命名的」	sacer (神聖) ; carterii (紀念Carter外科醫師) → 「神聖的」 + 人名	sacra=sacred (神聖) ; carterii=Carter醫師1948年描述；兩者現被視為同義	◆ 混合	α-蒎烯、β-蒎烯、乙酸辛酯	單萜烯 + 酯類
單萜烯	印度乳香	Indian Frankincense	<i>Boswellia serrata</i>	乳香屬	Boswell (植物學家人名) → 「以Boswell命名的」	serra (鋸子) → serrata (鋸齒狀) → 「葉緣有鋸齒的」	serrata=serrated (鋸齒刀) ; 印度乳香葉緣鋸齒明顯	◆ 混合	α-蒎烯、β-蒎烯、檸檬烯	單萜烯
倍半萜烯	沒藥	Myrrh	<i>Commiphora myrrha</i>	沒藥屬	kómmi (希臘：樹膠) + phorós (攜帶) → 「攜帶樹膠的」	myrrha (阿拉伯語 murr：苦) → 「苦的樹脂」	Commiphora=gum-bearer帶膠的樹；myrrh語源murr意為苦，聖誕三王的禮物之一	◆ 混合	呔喃型倍半萜 (curzerene) 、β-欖香烯	倍半萜烯

Cistaceae 半日花科

地中海灌木 · 岩薔薇 (*Cistus*) 分泌勞丹脂 (labdanum) ，是天然香水珍貴的定香材料。精油含α-蒎烯、沉香醇。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
單萜烯	岩玫瑰	Rock Rose / Cistus	<i>Cistus ladanifer</i>	岩薔薇屬	kistos (希臘：岩玫瑰屬植物) → 「岩薔薇屬」 (直接音譯希臘植物名)	ladanum (樹脂名) ← 希臘 lēdon → 「產出勞丹脂的」	Cistus直接記；ladanifer=ladanum-bearing，帶勞丹樹脂的；古老香料貿易植物	◎ 直接記憶	α-蒎烯、蒎烯、沉香醇	單萜烯 + 單萜醇

Cupressaceae 柏科

針葉柏科 · *Juniperus* (杜松/維吉尼亞雪松) 富含單萜烯或倍半萜醇；*Cupressus* (柏樹) 含α-蒎烯；*Chamaecyparis* (扁柏) 含獨特檜醇。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	維吉尼亞雪松	Virginian Cedarwood	<i>Juniperus virginiana</i>	刺柏屬	Juniperus (拉丁) ← PIE *yoini-paros 「結漿果的」 → 「產漿果之樹」	Virginia (維吉尼亞州) → virginiana → 「來自維吉尼亞的」	gin (琴酒) 荷蘭語 genever 就是杜松； virginiana=維吉尼亞，以童貞女王命名	◆ 混合	雪松醇 (cedrol)、α-雪松烯	倍半萜醇 + 倍半萜烯
單萜烯	絲柏	Italian Cypress	<i>Cupressus sempervirens</i>	柏木屬	Cupressus (拉丁) ← 希臘 kyparissos (塞普勒斯島名) → 「塞普勒斯島的樹」	semper (拉丁：永遠) + virens (常綠的) → 「永遠常綠的」	Cupressus=Cyprus 語源； sempervirens=Semper Fidelis (永遠忠誠) +viridity (翠綠)	◆ 混合	α-蒎烯、δ-3-蒎烯、雪松醇 (cedrol)	單萜烯 + 倍半萜醇
單萜烯	杜松漿果	Juniper Berry	<i>Juniperus communis</i>	刺柏屬	Juniperus (拉丁) ← PIE *yoini-paros 「結漿果的」 → 「產漿果之樹」	communis (拉丁：普通的、廣佈的) → 「常見的、廣泛分佈的」	Juniperus→Gin (琴酒)！荷蘭語 genever (杜松) =gin的詞源； communis=common	◆ 混合	α-蒎烯、月桂烯 (myrcene)、薩賓烯 (sabinene)	單萜烯
	日本扁柏 (檜木)	Hinoki / Japanese Cypress	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	扁柏屬	chamai (希臘：矮小、貼地) + kyparissos (希臘：柏樹) → 「矮小的柏樹屬」	obtusus (拉丁：鈍的) → obtusa → 「葉尖圓鈍的」	chamai=chameleon (貼地變色龍)； obtusa=obtuse (鈍角)；日本神社聖木	◆ 拆解	α-蒎烯、莧烯、檜醇 (hinokiol)	單萜烯 + 倍半萜醇

Lamiaceae 唇形科

草本植物大家族，方莖、對生葉、輪生花為特徵。精油多富含酚類、酮類、單萜醇，芳香療法中應用最廣泛的科別之一。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
酯類	真薰衣草	True Lavender	<i>Lavandula angustifolia</i>	薰衣草屬	lavare (拉丁：洗滌) → 「與洗滌有關的植物」	angustus (窄) + folium (葉) → 「窄葉的」	羅馬人洗澡用窄葉草香：lavare沐浴 + angustifolia窄葉	◆ 拆解	沉香醇 (linalool)、乙酸沉香酯 (linalyl acetate)	單萜醇 + 酯類

	穗花薰衣草	<i>Spike Lavender</i>	<i>Lavandula latifolia</i>	薰衣草屬	lavare (拉丁：洗滌) → 「與洗滌有關的植物」	latus (寬) + folium (葉) → 「寬葉的」	lati=latitude (廣闊) · 葉比真薰衣草寬；latifolia vs angustifolia 一寬一窄對照記	◆ 拆解	樟腦 (camphor)、1,8-桉油醇、沉香醇	酮類 + 氧化物 + 單萜醇
	醒目薰衣草	<i>Lavandin</i>	<i>Lavandula × intermedia</i>	薰衣草屬	lavare (拉丁：洗滌) → 「與洗滌有關的植物」	inter (中間) + medius (居中) → 「介於兩者之間的」 (雜交種)	× 代表雜交；intermedia=intermediate · 真薰衣草×穗花薰衣草混血	◆ 拆解	乙酸沉香酯、沉香醇、樟腦	酯類 + 單萜醇 + 酮類
	胡椒薄荷	<i>Peppermint</i>	<i>Mentha × piperita</i>	薄荷屬	Mintho (希臘神話仙女·被踩後化為薄荷草) → 「薄荷屬」 (神話命名)	piper (胡椒) → piperita (胡椒般辛辣的) → 「如胡椒般刺激的」	Mentha=神話女神被踩後化草；piperita=pepper 辛辣；× 代表雜交種	◆ 混合	薄荷醇 (menthol)、薄荷酮 (menthone)	單萜醇 + 酮類
	綠薄荷	<i>Spearmint</i>	<i>Mentha spicata</i>	薄荷屬	Mintho (希臘神話) → 「薄荷屬」	spica (穗) → spicata → 「穗狀花序的」	spica=spike (穗)；spicata穗形 vs piperita 辣味·形態與氣味各記一個	◆ 混合	藏茴香酮 (carvone)、沉香醇	酮類 + 單萜醇
	廣藿香	<i>Patchouli</i>	<i>Pogostemon cablin</i>	刺蕊草屬	pogon (希臘：鬍鬚) + stemon (希臘：雄蕊) → 「有毛鬍鬚狀雄蕊的」	cablin (菲律賓他加祿語) → 「廣藿香」 (原住民語音譯)	Pogostemon=有鬍鬚的雄蕊 (花的特徵)；cablin直接記 (菲律賓土語)	◆ 混合	廣藿香醇 (patchoulol)、α-廣藿香烯、β-石竹烯	倍半萜醇 + 倍半萜烯
	迷迭香	<i>Rosemary</i>	<i>Salvia rosmarinus</i>	鼠尾草屬	salvus (拉丁：健康) → Salvia → 「保健植物」	ros (露水) + marinus (海洋的) → 「海之露水」	salvus=salvation (救贖)；rosmarinus=rosemary英文字源·地中海海岸海霧中生長	◆ 拆解	1,8-桉油醇、α-蒎烯、樟腦	氧化物 + 單萜烯 + 酮類
	鼠尾草	<i>Clary Sage</i>	<i>Salvia officinalis</i>	鼠尾草屬	salvus (拉丁：健康) → Salvia → 「保健植物」	officina (藥房) → officinalis → 「藥房認可的」	Salvia=save (拯救) 詞根；officinalis=官方藥典植物	◆ 拆解	α-側柏酮(α-thujone)、β-側柏酮、樟腦	酮類
	快樂鼠尾草	<i>Common Sage</i>	<i>Salvia sclarea</i>	鼠尾草屬	salvus (拉丁：健康) → Salvia → 「保健植物」	sclarea (中世紀拉丁：明亮/清澈) → 「明亮眼睛的」 (傳統用於眼睛)	sclarea=sclera (眼白)；中世紀用來製作眼藥水；快樂鼠尾草讓視野清澈	◆ 混合	乙酸沉香酯、沉香醇、香紫蘇醇 (sclareol)	酯類 + 單萜醇 + 二萜醇

	百里香	<i>Thyme</i>	<i>Thymus vulgaris</i>	百里香屬	thymon (希臘：百里香，或 thymos 「靈魂/勇氣」) → 「勇氣之草」	vulgus (普通大眾) → vulgaris (普通的) → 「常見的」	thymos=古希臘靈魂/勇氣；vulgaris=vulgar (本意普通大眾的)	◆ 混合	百里酚 (thymol)、香荊芥酚 (carvacrol)	酚類
	牛膝草	<i>Hyssop</i>	<i>Hyssopus officinalis</i>	神香草屬	hyssopos (希臘語) ← 希伯來語 ezov → 「牛膝草」(聖經植物，閃語族語源)	officina (藥房) → officinalis → 「藥房認可的」	Hyssopus直接記，聖經潔淨植物；officinalis=官方藥典	◎ 直接記憶	異松樟酮 (isopinocamphe)、β-蒎烯	酮類 + 單萜烯
	香蜂草	<i>Melissa / Lemon Balm</i>	<i>Melissa officinalis</i>	蜜蜂花屬	Melissa (希臘：蜜蜂，源自 meli 「蜂蜜」) → 「蜜蜂植物」(吸引蜜蜂)	officina (藥房) → officinalis → 「藥房認可的」	Melissa=蜜蜂；mellifluous (甜美流暢) =meli (蜂蜜) +fluere (流動)	◆ 混合	香葉醛、橙花醛(citral)、β-石竹烯	醛類 + 倍半萜烯
	馬鬱蘭	<i>Sweet Marjoram</i>	<i>Origanum majorana</i>	牛至屬	oros (希臘：山) + ganos (希臘：光彩/喜悅) → 「山間的喜悅」	majorana (中世紀拉丁←阿拉伯語 marjamīya) → 「馬鬱蘭」(阿拉伯語音譯)	oros+ganos=山中發光的植物；古希臘相信愛神創造了它；majorana直接記	◆ 混合	萜品烯-4-醇、γ-萜品烯、沉香醇	單萜醇 + 單萜烯

Lauraceae 樟科

樟科化學最多樣：同屬 (Cinnamomum) 甚至同種 (C. zeylanicum) 依萃取部位大不同——肉桂皮以芳香醛肉桂醛為主 (⚠️刺激性強)，肉桂葉以酚類丁香酚為主；

同種 (C. camphora) 依產地分化化學型：芳樟 (單萜醇) vs 羅文莎葉 (氧化物)。月桂葉以1,8-桉油醇為主。山雞椒 (Litsea) 以醛類citral獨樹一格。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	肉桂葉	<i>Cinnamon Leaf</i>	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	樟屬	Cinnamomum ← 希臘 kinnamomon ← 閃語 → 「肉桂屬」(中東語言輾轉傳入希臘)	Zeilan (錫蘭/斯里蘭卡) → zeylanicum → 「來自錫蘭的」	Cinnamomum=cinnamon的直接字源；zeylanicum=Ceylon (錫蘭)，現為斯里蘭卡；葉油以丁香酚為主 (酚類)；皮油以肉桂醛為主，兩者同屬名但化學迥異	◆ 混合	丁香酚 (eugenol) 70–80% (葉片)	酚類

	錫蘭肉桂皮	<i>Ceylon Cinnamon Bark</i>	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	樟屬	Cinnamomum ← 希臘 kinnamomon ← 閃語 → 「肉桂屬」 (中東語言輾轉傳入希臘)	Zeilan (錫蘭/斯里蘭卡) → zeylanicum → 「來自錫蘭的」	與肉桂葉學名完全相同，差別在萃取部位：樹皮(bark) vs 葉片(leaf)；皮油以肉桂醛為主 (芳香醛類)，葉油以丁香酚為主 (酚類)；⚠ 肉桂皮高肉桂醛 (65–80%)，皮膚刺激性極強，使用濃度須嚴格控制 (IFRA建議上限 0.07%)	◆ 混合	反式肉桂醛 (trans-cinnamaldehyde) 65–80%、丁香酚 4–8%、乙酸肉桂酯	芳香醛 + 酚類
	花梨木	<i>Rosewood / Ho Wood</i>	<i>Aniba rosaeodora</i>	安尼巴屬	Aniba (Tupi 原住民語) → 「玫瑰木樹」 (亞馬遜語直接音譯)	rosa (玫瑰) + odor (氣味) → rosaeodora → 「帶玫瑰香氣的」	Aniba直接記 (圖皮語族)；rosaeodora=rose+odor，香如玫瑰的木頭	◆ 混合	沉香醇 (linalool)	單萜醇
	月桂葉	<i>Bay Laurel</i>	<i>Laurus nobilis</i>	月桂屬	laurus (拉丁：月桂樹，或與 laudare 「讚美」相關) → 「月桂」 (羅馬時代的讚美之樹)	nobilis (拉丁：高貴的) → 「高貴的」	laurus=laurel英文直接來源；Nobel Prize (諾貝爾獎)、baccalaureate (學士) 都源自laurus (月桂冠)；nobilis=noble (高貴)，奧林匹克冠軍和羅馬將領均戴月桂冠	◆ 拆解	1,8-桉油醇 (cineole)、乙酸萜品酯(α-terpinyl acetate)、沉香醇	氧化物 + 酯類 + 單萜醇
	芳樟 (芳樟醇型)	<i>Ho Wood</i>	<i>Cinnamomum camphora</i> ct. linalool	樟屬	Cinnamomum ← 希臘 kinnamomon ← 閃語 → 「肉桂屬 (甜木)」	camphora (阿拉伯語 kafur：樟腦) → camphora (樟腦)；ct. linalool=化學型沉香醇 → 「產樟腦的樟樹」 (沉香醇化學型)	camphora=camphor (樟腦)；ct.=chemotype (化學型)，同一樹種依產地/環境會有不同化學組成；Ho Wood中文「芳樟」=沉香醇型，產於中國；區別：羅文莎葉是1,8-桉油醇型、芳樟是沉香醇型	◆ 混合	沉香醇 (linalool) 80–90%	單萜醇

	羅文莎葉 (桉油樟)	<i>Ravintsara</i>	<i>Cinnamomum camphora</i> ct. 1,8-cineole	樟屬	Cinnamomum ← 希臘 kinnamomon ← 閃語 → 「肉桂屬 (甜木) 」	camphora (阿拉伯語 kafur : 樟腦) ; ct. 1,8-cineole=化學型桉油醇 → 「產樟腦的樟樹」 (桉油醇化學型)	Ravintsara名稱來自馬達加斯加語「ravintsara」=「好葉子」(ravin=葉·tsara=好);同學名Cinnamomum camphora但在馬達加斯加栽種後化學型轉變為以1,8-桉油醇為主;勿與Ravensara aromatica混淆	◆ 混合	1,8-桉油醇 (1,8-cineole) 50–65%、α-蒎烯	氧化物 + 單萜烯
	山雞椒 (May Chang)	<i>May Chang / Litsea</i>	<i>Litsea cubeba</i>	木姜子屬	Litsea ← 中文「li」(李/梅) + 「tse」(子/小)的音譯 → 「小李子樹」(因果實小如李子而得名)	cubeba ← 阿拉伯語 kubāba → 中世紀拉丁語 cubeba (葶澄茄胡椒) → 「像葶澄茄的」(果實形似葶澄茄pepper)	Litsea=中文「李子」音譯·果實小圓如李; cubeba=cubeb pepper (葶澄茄) ·果實形似胡椒; 中文山雞椒=山上的雞油椒; 台灣阿泰雅族稱 maqaw (馬告) ·雪山豐收的辛香料; 主成分citral高達70–85%·是最佳天然citral來源	◆ 混合	香葉醛 (geranial) + 橙花醛(neral) (citral合計 70–85%)、d-檸檬烯	醛類 + 單萜烯

Myrtaceae 桃金娘科

葉含油腺·精油化學多樣：Eucalyptus/Corymbia 富含1,8-桉油醇 (藍膠、澳洲) 或香茅醛 (檸檬尤加利) ; Melaleuca 屬依種不同：茶樹以萜品烯-4-醇為主·白千層含高量1,8-桉油醇·綠花白千層有化學型分化 (桉油醇型/綠花醇型) ·Rosalina獨特含沉香醇; Myrtus富含桃金娘醇; Syzygium (丁香) 以酚類丁香酚為主。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	茶樹	<i>Tea Tree</i>	<i>Melaleuca alternifolia</i>	白千層屬	mélas (希臘 : 黑) + leukós (白) → 「黑白相映的」(焦黑樹幹配白皮)	alternus (交替) + folium (葉) → 「互生葉序的」	Mela=melanin (黑色素) ·leuca=leucocyte (白血球) ; 黑白雙色樹皮	◆ 拆解	萜品烯-4-醇 (terpinen-4-ol)、γ-萜品烯、1,8-桉油醇	單萜醇 + 單萜烯 + 氧化物
	白千層	<i>Cajeput / White Tea Tree</i>	<i>Melaleuca cajuputi</i>	白千層屬	mélas (希臘 : 黑) + leukós (希臘 : 白) → 「黑白相映的」(黑色老樹幹 + 白色紙皮)	cajuputi ← 馬來語 kayu (木材) + putih (白色) → 「白色的木材」	Melaleuca屬名同茶樹·記法：黑幹白皮; cajuputi=kayu putih·馬來語「白木」·直接音譯; Indonesian常見香料名 kayu putih 就是這支精油的當地名稱	◆ 混合	1,8-桉油醇 (1,8-cineole) 50–65%、α-萜品醇、β-蒎烯	氧化物 + 單萜醇 + 單萜烯

	綠花白千層 (尼亞烏利)	Niaouli	Melaleuca quinquenervia	白千層屬	mélas (希臘: 黑) + leukós (希臘: 白) → 「黑白相映的」	quinque (拉丁: 五) + nervus (拉丁: 葉脈/筋) → quinquenervia → 「有五條葉脈的」	quinque=five · 想到 quintet (五重奏); nervus=nerve (神經) 同字根; 五條葉脈是辨識特徵; Niaouli是新喀里多尼亞原住民語; 有多個化學型 (ct.) · 芳療常用為1,8-桉油醇型	◆ 拆解	1,8-桉油醇 (1,8-cineole)、綠花醇 (viridiflorol) (桉油醇型)	氧化物 + 倍半萜醇
	Rosalina (羅沙麗娜)	Rosalina / Lavender Tea Tree	Melaleuca ericifolia	白千層屬	mélas (希臘: 黑) + leukós (希臘: 白) → 「黑白相映的」	Erica (石南屬植物) + folia (葉) → ericifolia → 「葉形似石南的」(葉片細小針形 · 像Erica 石南)	ericifolia=Erica (希 斯 石南) +folia (葉) · 針形葉如石南; Rosalina是商品名 · 因高沉香醇含量被稱為「薰衣草茶樹 (Lavender Tea Tree)」; 南部化學型富1,8-桉油醇 · 北部化學型富沉香醇	◆ 拆解	沉香醇 (linalool) 35–45%、1,8-桉油醇 (依化學型)	單萜醇 + 氧化物
	藍膠尤加利	Blue Gum Eucalyptus	Eucalyptus globulus	桉屬	eu (希臘: 好) + kalyptos (覆蓋) → 「覆蓋得很好的」(花蕾有帽蓋)	globulus (球形) ← globus (球) → 「小球狀的」(果實圓球形)	eu=euphoria的eu (良好); kalyptos=apocalypse裡的calypso (遮蓋)	◆ 拆解	1,8-桉油醇 (1,8-cineole)	氧化物
	澳洲尤加利	Narrow-leaf Eucalyptus	Eucalyptus radiata	桉屬	eu (好) + kalyptos (覆蓋) → 「覆蓋得很好的」	radius (光線) → radiata → 「呈輻射狀的」(葉脈放射狀)	radiata=radiation (輻射) · 葉脈像光線向外放射; 比藍膠更溫和	◆ 拆解	1,8-桉油醇、α-萜品醇	氧化物 + 單萜醇
	史密斯尤加利	Gully Gum	Eucalyptus smithii	桉屬	eu (好) + kalyptos (覆蓋) → 「覆蓋得很好的」	Smith (人名) + -ii (紀念字尾) → 「紀念Smith的」	-ii字尾是植物學紀念特定人物的慣例; 直接記人名Smith	◆ 混合	1,8-桉油醇、α-蒎烯	氧化物 + 單萜烯
	檸檬尤加利	Lemon Eucalyptus	Corymbia citriodora	傘房桉屬	korymbus (希臘: 傘房花序、果串) → Corymbia → 「傘房花序的樹」(花朵成傘房狀簇生)	citrus (柑橘) + odor (氣味) → citriodora → 「帶檸檬香氣的」	korymbus=corymb (傘房花序) · 花朵群聚如傘; citriodora=citrus+odor (檸檬氣味); 舊名 Eucalyptus citriodora · 2000年後重新分類為 Corymbia	◆ 拆解	香茅醛 (citronellal)、香茅醇 (citronellol)、異蒲勒醇 (isopulegol)	醛類 + 單萜醇

	香桃木	Myrtle	<i>Myrtus communis</i>	香桃木屬	myrtos (古希臘語：香桃木) → Myrtus (拉丁) → 「香桃木屬」(希臘語直接命名，科名 Myrtaceae 即源於此)	communis (拉丁：普通的、常見的) → 「常見的」	Myrtus=myrtle英文直接來源，希臘愛神阿芙蘿黛蒂的聖樹；communis=common，地中海沿岸最普遍的灌木；香桃木命名了整個桃金娘科	◆ 混合	1,8-桉油醇、 α -蒎烯、沉香醇、桃金娘醇(myrtenol)	氧化物 + 單萜烯 + 單萜醇
	丁香花苞	Clove Bud	<i>Syzygium aromaticum</i>	蒲桃屬	syzygia (希臘：結合) → Syzygium → 「葉對生、結合的」	aroma (希臘：香料) → aromaticum → 「芳香的」	syzygy (天文學朔望，天體連線)=結合；aromaticum=aromatic，丁香是香料之王	◆ 拆解	丁香酚(eugenol)、乙酸丁香酚酯、 β -石竹烯	酚類 + 酯類 + 倍半萜烯

Oleaceae 木犀科

茉莉 (*Jasminum*) 以脂吸法或溶劑萃取，乙酸苄酯為主要成分，香氣強勁，芳療中常用原精 (absolute) 而非精油。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	茉莉 (大花)	Jasmine (Spanish)	<i>Jasminum grandiflorum</i>	素馨屬	Jasminum ← 波斯語 yāsāmīn → 「茉莉花」(波斯語音譯)	grandis (大) + flos/floris (花) → 「大花的」	Jasminum直接記(波斯語)；grandiflorum=grand (宏大) + flora (花)，大花茉莉	◆ 混合	乙酸苄酯、沉香醇、吲哚(indole)	酯類 + 單萜醇

Pinaceae 松科

針葉松科，富含單萜烯 α/β -蒎烯(赤松、雲杉、冷杉)及酯類乙酸龍腦酯(黑雲杉、銀冷杉)。雪松屬則以倍半萜醇雪松醇為特色。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	大西洋雪松	Atlas Cedarwood	<i>Cedrus atlantica</i>	雪松屬	kedros (希臘：雪松) → cedrus (拉丁) → 「雪松」(直接來自希臘語)	Atlas (亞特拉斯山脈，北非) → atlantica → 「亞特拉斯山的」	cedrus=cedar英文直接保留；atlantica=Atlantic形容詞，摩洛哥/阿爾及利亞山脈	◆ 拆解	β -喜馬拉雅烯、 α -雪松烯、大西洋酮(atlantone)	倍半萜烯 + 酮類

單萜烯	歐洲赤松	<i>Scots Pine</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	松屬	pinus (拉丁) ← PIE *peie- (脂肪、樹脂滲出) → 「產樹脂的樹」	silva (拉丁：森林) → sylvestris (野生的、林中的) → 「生長於森林中的」	Pinus=pine英文直接字源；sylvestris=sylvan (林間)，想到Pennsylvania (Penn的森林)	◆ 拆解	α-蒎烯(α-pinene)、β-蒎烯、δ-3-蒎烯	單萜烯
單萜烯	黑雲杉	<i>Black Spruce</i>	<i>Picea mariana</i>	雲杉屬	pix/picis (拉丁：瀝青、松脂) → Picea → 「產松脂的樹」	地名 Mariana 或聖母瑪利亞 → 「瑪麗安娜地區的」(北美地名)	Picea=pitch (瀝青) 的拉丁語源；mariana=Marian地名；直接記地名起源	◆ 混合	龍腦乙酸酯(bornyl acetate)、α-蒎烯、莧烯	酯類 + 單萜烯
單萜烯	銀冷杉 歐洲冷杉	<i>Silver Fir</i>	<i>Abies alba</i>	冷杉屬	abies (拉丁：冷杉) ← 古典拉丁直接命名 → 「冷杉」(羅馬人對銀冷杉的古稱)	albus (白色) → alba (白色的) → 「白色的」(銀白色樹皮)	Abies直接記；abies=fir冷杉的拉丁來源；alba=albino (白化)，銀白色樹皮	◆ 混合	乙酸龍腦酯(bornyl acetate)、莧烯、α-蒎烯	酯類 + 單萜烯
單萜烯	香脂冷杉 膠冷杉	<i>Balsam Fir</i>	<i>Abies balsamea</i>	冷杉屬	abies (拉丁：冷杉) → 「冷杉屬」	balsamum (希臘/拉丁：香脂) → balsamea (產香脂的) → 「富含香脂的」	balsamea=balsam (香脂)，想到護唇膏Baume或Balm；Canada Balsam就是它的樹脂	◆ 拆解	β-蒎烯、莧烯、乙酸龍腦酯	單萜烯 + 酯類
	喜馬拉雅雪松	<i>Himalayan Cedarwood</i>	<i>Cedrus deodara</i>	雪松屬	kedros (希臘：雪松) → cedrus (拉丁) → 「雪松屬」	deva (梵語：神) + dāru (梵語：木材) → deodara → 「神聖的木材」(印度教聖木)	deva=divine (神聖) 梵語根；daru=木材；deodara=deodar英文名，印度教神靈的居所	◆ 拆解	雪松醇(cedrol)、α-雪松烯、β-喜馬拉雅烯	倍半萜醇 + 倍半萜烯

Piperaceae 胡椒科

黑胡椒 (Piper nigrum) 果實蒸餾，以β-石竹烯等倍半萜烯為主，兼含單萜烯，氣味辛辣穿透。

No.	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	黑胡椒	<i>Black Pepper</i>	<i>Piper nigrum</i>	胡椒屬	Piper (拉丁) ← 梵語 pippalī → 「胡椒屬」(直接音譯梵語)	niger (黑色) → nigrum (黑的) → 「黑色的」(黑胡椒顆粒)	Piper=pepper 英文語源；nigrum=night 詞根nig-；黑色胡椒粒	◆ 混合	β-石竹烯(β-caryophyllene)、δ-3-蒎烯、β-蒎烯	倍半萜烯 + 單萜烯

Poaceae 禾本科

禾本科草類精油氣味與化學風格迥異：岩蘭草根富含倍半萜醇（沉穩大地）；香茅葉片富含醛類 citral（清新明亮）；玫瑰草幾乎全是單萜醇香葉醇 geraniol（甜蜜花香）。三者同科卻截然不同。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	岩蘭草 (香根草)	Vetiver	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	金鬚茅屬	chrysos (希臘：黃金) + pogon (希臘：鬚鬚) → 「金色鬚鬚」 (花穗金黃毛狀)	zizaniion (希臘：野草) → zizanioides (似野草的) → 「似雜草形態的」	chrysos (金) + pogon (鬚鬚) · 花穗如金色鬚鬚；舊名 Vetiveria 源自泰米爾語「挖出的根」	◆ 拆解	岩蘭草醇 (vetiverol)、岩蘭草酮 (vetivone)	倍半萜醇 + 倍半萜酮
	檸檬香茅	Lemongrass	<i>Cymbopogon citratus</i>	香茅屬	kymbe (希臘：船) + pogon (希臘：鬚鬚) → 「船形鬚鬚草」 (花穗像船裡的毛狀物)	citrus (柑橘) → citratus (帶柑橘香的) → 「柑橘香氣的」	cymbe (船形) + pogon (鬚鬚) · 長在船形苞葉裡的毛狀花；citratus=citrus	◆ 拆解	香葉醛 (geranial)、橙花醛 (neral) (合稱 citral)	醛類
	玫瑰草 (掌葉香茅)	Palmarosa	<i>Cymbopogon martinii</i>	香茅屬	kymbe (希臘：船) + pogon (希臘：鬚鬚) → 「船形鬚鬚草」	martinii (紀念植物學家 Martin) + -ii (紀念字尾) → 「紀念 Martin 的」	Cymbopogon 同屬的香茅屬；martinii 以人名命名直接記；英文 palmarosa=palm (掌) + rosa (玫瑰) · 草的掌葉散發玫瑰香；主成分香葉醇 (geraniol) > 70% · 是草本精油中含量最高者	◆ 混合	香葉醇 (geraniol) 70–85%、乙酸香葉酯 (geranyl acetate)	單萜醇 + 酯類

Rosaceae 薔薇科

玫瑰為香水工業最珍貴的花朵之一，主要成分香茅醇與香葉醇屬單萜醇，香氣甜美濃郁，每公斤玫瑰精油需數千公斤花瓣。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	玫瑰 (大馬士革)	Rose (Damask)	<i>Rosa × damascena</i>	薔薇屬	rosa (拉丁：玫瑰) → 「玫瑰」 (最直接的屬名)	Damascus (大馬士革) → damascena → 「來自大馬士革的」	rosa=rose 英文直接來源；damascena=Damascene (大馬士革的)；× 代表雜交	◆ 混合	香茅醇 (citronellol)、香葉醇 (geraniol)、苯乙醇	單萜醇

Rutaceae 芸香科

柑橘屬大本營，果皮含油腺，精油多以d-檸檬烯為主體，氣味明亮陽光。光敏性（furanocoumarins 佛手柑素）為本科重要安全考量，冷壓果皮尤需注意。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	苦橙葉	<i>Petitgrain Bigarade</i>	<i>Citrus aurantium var. amara</i>	柑橘屬	citrus ← 希臘 ké dros (雪松) → 「有雪松香氣的樹」	aurum (黃金) → aurantium (橙色之物)；amara (苦) → 「黃金之果」 + 「苦的」	aurum=Au黃金；amara=amaro義大利苦味酒；黃金苦橙	✦ 拆解	乙酸沉香酯、沉香醇	酯類 + 單萜醇
	橙花 (苦橙)	<i>Neroli</i>	<i>Citrus aurantium var. amara</i>	柑橘屬	citrus ← 希臘 ké dros (雪松) → 「有雪松香氣的樹」	同苦橙葉 (萃取部位：花朵) → 同苦橙葉	學名與苦橙葉相同；Neroli名稱源自那不勒斯 Nerola公主	✦ 拆解	沉香醇、乙酸沉香酯、反式橙花叔醇	單萜醇 + 酯類 + 倍半萜醇
	佛手柑	<i>Bergamot</i>	<i>Citrus bergamia</i>	柑橘屬	citrus ← ké dros (雪松) → 「有雪松香氣的樹」	Bergamo (義大利地名) → bergamia → 「來自貝加莫的」	bergamia=義大利城市 Bergamo；伯爵茶Earl Grey的香氣就是佛手柑的	◈ 混合	乙酸沉香酯、沉香醇、檸檬烯	酯類 + 單萜醇 + 單萜烯
	甜橙	<i>Sweet Orange</i>	<i>Citrus sinensis</i>	柑橘屬	citrus ← ké dros (雪松) → 「有雪松香氣的樹」	Sina (古拉丁：中國) → sinensis → 「來自中國的」	sinensis=China；茶樹 Camellia sinensis同種名；甜橙從中國傳入西方	✦ 拆解	d-檸檬烯 (limonene)	單萜烯
	葡萄柚	<i>Grapefruit</i>	<i>Citrus × paradisi</i>	柑橘屬	citrus ← ké dros (雪松) → 「有雪松香氣的樹」	paradisus (拉丁：樂園) → 「天堂之果」	paradise的拉丁字根 paradisus；18世紀加勒比海發現時被稱為天堂之果	✦ 拆解	d-檸檬烯、β-蒎烯	單萜烯
	萊姆	<i>Lime</i>	<i>Citrus × aurantiifolia</i>	柑橘屬	citrus ← ké dros (雪松) → 「有雪松香氣的樹」	aurantium (橙) + folia (葉) → 「葉像橙的」	aurantiifolia=橙 (aurantium) 的葉；× 代表雜交種	✦ 拆解	d-檸檬烯、β-蒎烯、香檸檬烯	單萜烯
	檸檬	<i>Lemon</i>	<i>Citrus × limon</i>	柑橘屬	citrus ← 希臘 ké dros (雪松) → 「有雪松香氣的樹」	limon ← 阿拉伯語 laymūn ← 波斯語 lī mūn ← 梵語 nimbū (萊姆) → 「檸檬」 (阿拉伯語傳入歐洲)	limon→lemon英文直接來源；語源路徑：梵語 nimbū→波斯語→阿拉伯語laymūn→法語limon→英語lemon；× 代表雜交種 (香櫞×苦橙)；主成分d-檸檬烯(limonene)的名字正是從lemon而來	◈ 混合	d-檸檬烯 (limonene) 60–70%、β-蒎烯、γ-萜品烯	單萜烯

Santalaceae 檀香科

檀香屬 (*Santalum*) 心材蒸餾，同屬但化學有別：白檀 (*S. album*) α -santalol 含量高 (60–70%)，香氣最飽滿；

澳洲檀香 (*S. spicatum*) α -santalol 偏低，多了 farnesol (過敏原) 與 epi- α -bisabolol，氣味較清淡木質。兩者皆屬倍半萜醇，為高品質定香木質精油。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	檀香 (白檀)	Sandalwood (Indian)	<i>Santalum album</i>	檀香屬	Santalum ← 梵語 chandana (燃燒的木材) → 「燃香之木」	albus (白色) → album (白色的) → 「白色的」 (心材淡黃白色)	Santalum音似sandal；album=albino (白化)；白色心材，印度教聖樹	◆ 混合	α -檀香醇(α -santalol)、 β -檀香醇	倍半萜醇
	澳洲檀香	Australian Sandalwood	<i>Santalum spicatum</i>	檀香屬	Santalum ← 梵語 chandana (燃燒的木材) → 「燃香之木」	spica (拉丁：穗、穗狀花序) → spicatum (穗狀的) → 「花序呈穗狀的」	Santalum同白檀；spicatum=spike (穗)，花序呈穗狀，與穗花薰衣草Lavandula spicata同字根；澳洲原住民稱為Waang (Noongar語)； α -santalol含量低於白檀，多了farnesol (過敏原需注意)	◆ 混合	α -檀香醇(α -santalol)、法尼醇(farnesol)、表- α -紅沒藥醇(epi- α -bisabolol)	倍半萜醇

Zingiberaceae 薑科

熱帶薑科，根莖芳香。生薑 (*Zingiber officinale*) 以倍半萜烯薑烯為主，氣味辛辣溫暖；

豆蔻 (*Elettaria cardamomum*) 以酯類 α -萜品酯乙酯 + 氧化物1,8-桉油醇為主，清香甜辛，「香料之女王」。同科化學風格迥異。

IFA 分類	中文名	English Name	學名 (斜體)	屬中文	屬名詞根 → 意義	種名詞根 → 意義	💡 記憶法	類型	主要化學成分	化學屬性
	生薑	Ginger	<i>Zingiber officinale</i>	薑屬	Zingiber ← 梵語 śrngavera (角形的) → 「角形根莖植物」	officina (藥房) → officinale (有藥用的) → 「有官方藥用記錄的」	Zingiber=ginger音源；officinale=藥房認可；凡含officinale均代表有悠久藥用史	◆ 混合	薑烯(zingiberene)、 β -倍半水芹烯	倍半萜烯

	豆蔻 (小豆蔻)	Cardamom	<i>Elettaria cardamomum</i>	小豆蔻屬	Elettaria ← 泰米爾語 ēlam (小豆蔻) · 達羅毗荼語族語源 → 「小豆蔻屬」 (南印度土著語直接音譯)	cardamomum ← 希臘語 kardamon (獨行菜/watercress) + amomon (芳香辛料) → 「辛香獨行菜」 (因種子氣味似watercress加辛料而得名)	Elettaria 直接記 · 泰米爾語 ēlam→英語 elom→cardamom ; cardamomum = kardamon (cress 水田芥) + amomon (古印度芳香草) · 希臘人最早以此描述這種異國辛料；香料之女王 · α-萜品酯乙酯帶來清新香氣	◆ 混合	α-萜品酯乙酯 (α-terpinyl acetate) 30–45%、1,8-桉油醇	酯類 + 氧化物
--	------------	----------	-----------------------------	------	--	---	--	---------	---	----------