

Sem10Synopsis

Александр Мишин, Б01-008а

МНК

$$(\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=0}^n x_i^{k+j}$$

$$f_k = \sum_{i=0}^n y_i x_i^k$$

x	-1	-0,4	0	0,5	1
y	-2	-1	0	1,2	2,05

$$B \vec{a} = \vec{c}$$

$$\vec{B} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & (\varphi_0, \varphi_2) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_2) \\ (\varphi_2, \varphi_0) & (\varphi_2, \varphi_1) & (\varphi_2, \varphi_2) \end{bmatrix}$$

$$\varphi_0 = 1, \varphi_1 = x, \varphi_2 = x^2$$

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 1 = 5$$

$$c_0 = f_0 = \sum_{i=0}^4 y_i \cdot 1 = 0.25$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 x_i = 0.1$$

$$c_1 = f_1 = \sum_{i=0}^4 y_i x_i^2 = (2 + 0.4 + 2.6 + 2.05) = 5.05$$

$$\vec{B} = \begin{bmatrix} 5 & 0.1 & 2.41 \\ 0.1 & 2.41 & 0.061 \\ 2.41 & 0.61 & 9.0881 \end{bmatrix}$$

$$\vec{c} = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 5.05 \\ 0.19 \end{bmatrix}$$

Тогда получим полином

$$P_2(x) = -0.01410 + 2.03485x + 0.0460x^2$$

Пример 1

$$P_2(x) = ax^2 + b$$
$$\{\varphi_k\} = 1; x^2$$

Найти a, b:

$$[-1; 1] \text{ к } f(x) = |x|$$

$$B \vec{a} = \vec{c}$$

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx = 2$$

$$(\varphi_1, \varphi_0) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot 1 dx = \frac{2}{3}$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot x^2 dx = \frac{2}{5}$$

$$c_1 = \int_{-1}^1 |x| \cdot x^2 dx = \frac{1}{2}$$

$$c_0 = \int_{-1}^1 |x| \cdot 1 dx = 1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2/3 \\ 2/3 & 2/5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

Тогда получим b = 3/16, a = 15/16.

Пример 2

$$P_1 = a_1 x + a_0$$

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + y = 2 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

$$Ax = f \rightarrow A^T A \vec{x} = A^T \vec{f}$$

x - элемент наилучш. среднеквадрат.

$$f = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^T f = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Всегда следует проверять $\det B \neq 0$.

Получим ответ $x = 3/11, y = 14/11$

Пример 3


$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx$$

Хочу привести численное интегрирование.

Формула Ньютона-Котеса

Вспоминаем, что $f(x) = P_m(x) + R_m(x)$ Самое первое, чем можно заменить $P_m(x)$.

Метод левых прямоугольников



$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i$$

$$|R(f)| \leq \max_{[x_0, x_n]} |f'(x)| \frac{(x_n - x_0) \cdot h}{2}$$

Метод трапеции



$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx h \left[\frac{f_0 + f_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i \right]$$

$$|R(f)| \leq \max_{[x_0, x_n]} |f''(x)| \frac{(x_n - x_0) \cdot h^2}{12}$$

Метод средних прямоугольников

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i - 1/2)$$

$$|R(f)| \leq \max_{[x_0, x_n]} |f''(x)| \frac{(x_n - x_0) \cdot h^2}{24}$$

Формула Симпсона

$$\int f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f_0 + f_n + 4 \cdot \sum_{i=1}^{n/2-1} f_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f_{2i}]$$

n - чётное число

$$|R(f)| \leq \max_{[x_0, x_n]} |f^{(4)}| \frac{x_n - x_0}{180} \cdot h^4$$

Пример 4

(Для сравнения методов)

$$\varepsilon \leq 10^{-2}$$

$$I = \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) dx$$

промежуточно вычислим $M_2 = 2/3$

$$\Delta I = \frac{M_2 h^2 (1 - (-1))}{12} = \frac{M_2 h^2}{6} \leq \varepsilon$$

$$h \leq 0.3$$

$$h = \frac{x_n - x_0}{n} \rightarrow n = \left[\frac{2}{0.3} \right] + 1 = 7$$

$$I = \frac{M_4 h^4}{30} \leq \varepsilon$$

$$M_4 = 3/10$$

$$h \leq 1.48$$

$$n = \left[\frac{2}{1.48} \right] + 1 = 2$$