

سیستم‌های صنفیق فارسی :

فازی ^{فاز} و فکهم ... Fuzzy

یکی از زیررشته‌های بسیار بزرگ صنفیق فارسی

این است که توانایی بیان عدم قطعیت دارد.

مثلاً قند سبز کردن خیلی از عبارات پرسشی

صفت‌ها روی آوردن کار بر روی اما دقیق و قطعیت

عام نمی‌کنند. حال؛ صنفیق فارسی می‌توانیم این عدم قطعیت

ها را حل بدهیم. مثلاً عدم قطعیت دیگر بارها می‌ماند

وجود دارد.

مزایای عمده استفاده از سیستم‌های فازی:

۱- بیان و توصیف عدم قطعیت‌ها

۲- این‌ها این که برای حل مشکلات که تئوری احتمال

KANDOO

برای آن راه‌های فارسی ندارد

۴- استناد به ارزش انسانی یا همان کسب

کسب انسان از یک عملیات و علم یا رضاد.

در کل معنی پیام یک بیان برای مسئله ای که عدم قطعیت

دریم بیان را شرح داشته؛ عموماً در یک هم باشد

سیستم های عصبی مثل بدن اطلاعات هم

کارایی ندارند و سیستمی بر اطلاعات هستند.

اما سیستم های مثل شبکه های عصبی از یک سیستم یا بر فرد

باید مسئله را بر اصول خود داشته اند و این تجربه

یک زبان بدن اطلاعات قبلی کار می است.

کارهای سیستم های:

(۱) ماشین لباسشویی (۱۹۹۱) (۲) زان

تولید لباس ماشین لباسشویی، نردگ کشیده و

این آب مصرف کنند و خودی هم میزن شخص باشد

KANDOO

صندوق سندایی ۱۹۹۱

مقاله دایم سیستم بهترین بهره داری داشته باشیم
یعنی سرعت بالا و بهای کمترین هزینه (یعنی ضرایب کمتری)
تا اینجا می توانیم بگوییم که با استفاده از این
مفاهیم از منطق ناسی است.

۳) حذف ارزش است از در بین سیستم بر داری

حذف

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$(1 \in A) \equiv \text{True}$$

$$(6 \in A) \equiv \text{False}$$

$$(2 \notin A) \equiv \text{False}$$

حال به جایی این که بیایم نژاده های مختلف
 رست غلظت را چپ نشد. مل عضله این
 صخره را بین می نشد.

$$I_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

یعنی هر سیم را داخل کرد بدین سیم یکی یکی
 همه اعداد

روزهای
 { صبح، ظهر، و دشت، شب }

روزهای
 { صبح، ظهر، شب }

ضرب یک سری کارها و رویاروایی داریم که
 با این مجموعه ها کار می کند و در داخل یکی از این
 دو مجموعه فرد زوج و فرد فرد می شود.

حال شما اینجا روز جمع داریم این نه زوج است
نه مزد تر از من سید تکلین چیست؟

در مناطق نازی همه چیز را ۵۰٪ از آن می دهد
یک بین و بین یعنی فاکتورهای هم تر از من دهد.
حین ضللی از بارانهای دنیای اطراف ما نشانی
هستند

حاج بیایم به یک تابع صریح تولید کنیم تا جوی تولید
کرد که بین صریح یک بازای عمل کنند.
می خواهم یک مجموعه نازی برای روزهای هفته
تشکیل دهیم:

از آنهایی
مجموعه، چهارشنبه، $\frac{1}{1}$ ، $\frac{1}{1}$ = زوج

اعداد
طبیعی
منزده = $\left\{ 1, \frac{1}{0.5}, \frac{3}{0.25}, \frac{4}{0.1} \right\}$


$\mu_A(x)$

$\mu_x: X \rightarrow [0, 1]$

$0 \leq \mu_A(x) \leq 1$

KANDOO

مثلاً قدهای مختلف در یک جامعه که فرض
 می‌کنیم میانگین جامعه‌های بین ۱۵۰-۱۸۰ است
 و مثلاً هم صفا ① که در تمام حال مواردش را هم
 می‌کنیم (بر اساس) منظم سازی



$A \rightarrow \mu_A(\cdot)$
 مجموعه $\mu_A(\cdot)$
 تابع چگالی